

ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия»

Кафедра фтизиатрии

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ

по фтизиатрии

Профессор В.Л. Сазыкин

Доцент И.Г. Сазыкина

Оренбург, 2011

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----|
| Тема 1. Теоретические основы фтизиатрии и пульмонологии (1-103) | 3 |
| Тема 2. Эпидемиология туберкулеза, организация противотуберкулезной службы, диспансерная работа (вопросы 1-132) | 35 |
| Тема 3. Клинические формы туберкулеза, диагностика, дифференциальная диагностика туберкулеза и сходной патологии (вопросы 1- 310) | 75 |
| Тема 4. Осложнения туберкулеза и его сочетание с другими болезнями (вопросы 1- 64) | 167 |
| Тема 5. Лечение туберкулеза, его осложнений и основных нетуберкулезных болезней органов дыхания (вопросы 1- 179) | 186 |

Тема 1. Теоретические основы фтизиатрии и пульмонологии

Вопрос № 1

Из каких клеток формируются клетки Пирогова-Лангханса?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Гистиоциты
Правильность = 1
 - 2) Лимфоциты
Правильность = 2
 - 3) Моноциты
Правильность = 3
 - 4) Эпителиоидные клетки
Правильность = 4
 - 5) Макрофаги
Правильность = 100
-

Вопрос № 2

Из каких клеток образуются эпителиоидные клетки?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Из эпителиальных клеток
Правильность = 1
 - 2) Из лимфоцитов и моноцитов
Правильность = 2
 - 3) Из сегментоядерных нейтрофилов
Правильность = 3
 - 4) Из гистиоцитов и макрофагов
Правильность = 100
-

Вопрос № 3

В какой фазе воспалительной реакции формируется типичный туберкулезный бугорок?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Пролиферации
Правильность = 100
 - 2) Альтерации
Правильность = 1
 - 3) Экссудации
Правильность = 2
 - 4) В любой фазе
Правильность = 3
-

Вопрос № 4

Каково типичное клеточное строение туберкулезного бугорка?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Эпителиоидные, лимфоидные клетки и клетки Пирогова-Лангханса
Правильность = 100
 - 2) Эпителиоидные клетки, моноциты, лимфоциты, клетки Пирогова-Лангханса
Правильность = 1
 - 3) Моноциты, лимфоидные и эпителиоидные элементы, гистиоциты, эозинофилы
Правильность = 2
-

Вопрос № 5

Что представляет собой вакцина БЦЖ?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Живые ослабленные микобактерии бычьего типа
Правильность = 100
 - 2) Живые ослабленные микобактерии человеческого типа
Правильность = 1
 - 3) Комплекс противотуберкулезных иммуноглобулинов
Правильность = 2
 - 4) Убитые микобактерии бычьего типа
Правильность = 3
 - 5) Убитые микобактерии птичьего типа
Правильность = 4
-

Вопрос № 6

Где расположены клетки-эффекторы клеточного противотуберкулезного иммунитета?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) В костном мозге и в периферической крови
Правильность = 1
 - 2) В тканевой жидкости и в костном мозге
Правильность = 2
 - 3) В тимусзависимых зонах селезенки и костном мозге
Правильность = 3
 - 4) В тимусзависимых зонах селезенки и лимфатических узлах
Правильность = 100
-

Вопрос № 7

Какова морфология параспецифической реакции при туберкулезе?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Ретикулярные, эндотелиальные и лимфоидные клетки
Правильность = 100
 - 2) Клетки туберкулезного бугорка с выраженным перифокальным неспецифическим воспалением
Правильность = 1
 - 3) Форменные элементы крови из-за повышенной проницаемости сосудистых стенок
Правильность = 2
-

Вопрос № 8

Какие признаки дисфункции вегетативной нервной системы наиболее характерны для активного туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Лабильность терморегуляции
Правильность = 100
 - 2) Извращенный дермографизм
Правильность = 30
 - 3) Инвертированные реакции на введение лекарственных средств
Правильность = 20
 - 4) Повышенная эмоциональная возбудимость, угнетение психики
Правильность = 1
 - 5) Нарушение подвижности и уравновешенности нервных процессов
Правильность = 2
-

Вопрос № 9

Какие патофизиологические нарушения ЦНС из перечисленных наиболее характерны для туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Нарушение подвижности и уравновешенности нервных процессов
Правильность = 100
 - 2) Лабильность терморегуляции
Правильность = 50
 - 3) Угнетение психики, сниженная эмоциональная возбудимость
Правильность = 1
 - 4) Синдром Кандинского-Клерамбо
Правильность = 2
-

Вопрос № 10

Для дисфункции каких желез (или железы) при туберкулезе характерно наличие синдрома "малого Аддисонизма"?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Щитовидной железы
Правильность = 1
 - 2) Поджелудочной железы
Правильность = 2
 - 3) Надпочечниковых желез
Правильность = 100
 - 4) Вилочковой железы
Правильность = 3
-

Вопрос № 11

Какие факторы из перечисленных в основном определяют разнообразные неспецифические нарушения и дисфункцию различных органов и систем при туберкулезе?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Интенсивность интоксикации
Правильность = 100
 - 2) Форма туберкулеза
Правильность = 30
 - 3) Возраст больного, морфологические изменения в тех или иных органах, вызванные туберкулезом
Правильность = 1
 - 4) Тип конституции пациента
Правильность = 2
-

Вопрос № 12

К какому виду изменений чаще всего относятся патофизиологические нарушения со стороны различных органов и систем у больных туберкулезом?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Неспецифическим
Правильность = 100
 - 2) Параспецифическим
Правильность = 1
 - 3) Специфическим
Правильность = 2
 - 4) К любому из перечисленных
Правильность = 3
-

Вопрос № 13

Какая симптоматика наиболее типична для болезни Аддисона?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Бронзовая окраска кожи и слизистых
Правильность = 100
 - 2) Астения
Правильность = 1
 - 3) Профузные поносы
Правильность = 2
 - 4) Кахексия
Правильность = 3
-

Вопрос № 14

Что необходимо произвести для оценки чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Флотацию мокроты
Правильность = 1
 - 2) Окраску мокроты специальным методом
Правильность = 2
 - 3) Автоклавирование взятого материала
Правильность = 3
 - 4) Назначение туберкулостатиков больному
Правильность = 4
 - 5) Посев мокроты на специализированную среду
Правильность = 100
-

Вопрос № 15

Каковы отличительные морфологические признаки микобактерий туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Высокая стабильность строения и формы
Правильность = 1
 - 2) Наличие ундулирующей мембраны и жгутиков
Правильность = 2
 - 3) Отсутствие ядра или ядерной субстанции
Правильность = 3
 - 4) Высокое сходство с вирусами
Правильность = 4
 - 5) Разнообразие нитевидных, кокковидных и зернистых форм
Правильность = 100
-

Вопрос № 16

Кем является возбудитель туберкулеза по перечисленным признакам?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Грамположительный диплококк
Правильность = 1
 - 2) Грамотрицательная кислотоупорная бактерия
Правильность = 2
 - 3) Риккетсия Провачека
Правильность = 3
 - 4) Грамположительная кислото- и щелочеупорная бактерия
Правильность = 100
-

Вопрос № 17

Как называется методика обогащения исследуемого материала для последующей бактериоскопии?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Флотация
Правильность = 100
- 2) Бакпосев
Правильность = 1

- 3) "Раздражающая" ингаляция
Правильность = 2
- 4) Люминесцентная микроскопия
Правильность = 3
-

Вопрос № 18

Какой признак используется для классификации условно-патогенных микобактерий?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Различие их кислотоупорности
Правильность = 1
- 2) Различие по процессу метаболизма декстранов
Правильность = 2
- 3) Различие строения клеточной оболочки
Правильность = 3
- 4) Различие окрашивания колоний на свету и в темноте
Правильность = 100
-

Вопрос № 19

Какие микобактерии из перечисленных вызывают туберкулез у человека?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) MYCOBACTERIUM MICROTI
Правильность = 1
- 2) MYCOBACTERIUM PARATUBERCULOSIS
Правильность = 2
- 3) MYCOBACTERIUM PHLEI
Правильность = 3
- 4) MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE
Правильность = 4
- 5) MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS
Правильность = 100
-

Вопрос № 20

Какое заболевание из перечисленных (помимо туберкулеза) вызывает представитель рода MYCOBACTERIUM семейства MYCOBACTERIACEAE порядка АСТИНОМЫЦЕТАLES?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Актиномикоз
Правильность = 1
- 2) Оспа
Правильность = 2
- 3) Брюшной тиф (легочная форма)
Правильность = 3
- 4) Холера
Правильность = 4
- 5) Проказа

Правильность = 100

Вопрос № 21

Что представляет собой вакцина БЦЖ-М?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Двойная доза стандартной вакцины БЦЖ
Правильность = 1
 - 2) Вакцина, изготовленная из штамма БЦЖ последней модификации
Правильность = 2
 - 3) Убитая вакцина БЦЖ в дозе 0,5 от стандартной
Правильность = 3
 - 4) Половинная доза стандартной вакцины БЦЖ
Правильность = 100
-

Вопрос № 22

Какой феномен обуславливает сохранение в течение некоторого времени иммунитета у человека после ликвидации микобактерий туберкулеза в организме?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Иммунологическая толерантность
Правильность = 1
 - 2) Аллергия замедленного типа
Правильность = 2
 - 3) Аллергия немедленного типа
Правильность = 3
 - 4) Иммунологическая память
Правильность = 100
-

Вопрос № 23

Какие клетки осуществляют переработку туберкулезного антигена и предъявление его иммунокомпетентным клеткам?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Тромбоциты
Правильность = 1
 - 2) Эозинофилы и моноциты
Правильность = 2
 - 3) Тучные клетки
Правильность = 3
 - 4) Клетки Пирогова-Лангханса
Правильность = 4
 - 5) Макрофаги
Правильность = 100
-

Вопрос № 24

Кем и когда была предложена противотуберкулезная вакцина?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Робертом Кохом в 1882 году
Правильность = 1
 - 2) Пирке в 1907 году
Правильность = 2
 - 3) Кальметтом и Гереном в 1919 году
Правильность = 100
-

Вопрос № 25

Как правильно характеризовать иммунитет при туберкулезе?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Клеточный, стерильный, пассивный
Правильность = 1
 - 2) Гуморальный, пассивный, нестерильный
Правильность = 2
 - 3) Гуморальный, нестерильный, активный
Правильность = 3
 - 4) Клеточный, пожизненный, пассивный
Правильность = 4
 - 5) Клеточный, нестерильный, активный
Правильность = 100
 - 6) Клеточный, нестерильный, пассивный
Правильность = 5
-

Вопрос № 26

Какие клетки являются активаторами Т-лимфоцитов при формировании противотуберкулезного иммунитета?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Макрофаги, выделяющие интерлейкин
Правильность = 100
 - 2) Плазматические клетки выделяющие интерлейкин
Правильность = 1
 - 3) Эозинофилы, выделяющие иммуноглобулины
Правильность = 2
 - 4) Тучные клетки, выделяющие гистамин
Правильность = 3
 - 5) Нейтрофилы, содержащие микобактерии
Правильность = 4
-

Вопрос № 27

Что должно образоваться на месте введения вакцины БЦЖ через 2-4 месяца при правильно выполненной методике вакцинации?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Рубчик 2-10 мм
Правильность = 100
 - 2) Незаживающая язвочка до 5 мм
Правильность = 1
 - 3) Не должно оставаться никаких следов
Правильность = 2
 - 4) Умеренная гиперемия или пигментация до 10 мм
Правильность = 3
-

Вопрос № 28

Какой вариант патогенеза туберкулеза характерен для лиц пожилого возраста?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Первичная инфекция
Правильность = 1
 - 2) Экзогенная суперинфекция
Правильность = 2
 - 3) Эндогенная суперинфекция
Правильность = 100
-

Вопрос № 29

Какой вариант патогенеза туберкулеза характерен для лиц молодого возраста?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Экзогенная суперинфекция и первичная инфекция
Правильность = 100
 - 2) Реинфекция
Правильность = 1
 - 3) Эндогенная суперинфекция
Правильность = 2
-

Вопрос № 30

Какой основной признак отличает первичный туберкулез органов дыхания от вторичного?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Гиперергическая реакция на туберкулин
Правильность = 1
- 2) Хроническая узловатая эритема, ревматизм Понсе
Правильность = 2
- 3) Наличие лимфо-гематогенной диссеминации
Правильность = 3
- 4) Детский и подростковый возраст заболевшего
Правильность = 4
- 5) Вовлечение в процесс серозных оболочек
Правильность = 5
- 6) Активные туберкулезные изменения во внутригрудных лимфоузлах
Правильность = 100

Вопрос № 31

Какой фактор из перечисленных является определяющим в возникновении инфицированности туберкулезом?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Микобактерии туберкулеза
Правильность = 100
 - 2) Восприимчивость организма
Правильность = 1
 - 3) Внешняя среда
Правильность = 2
 - 4) Ослабленность организма
Правильность = 3
 - 5) Вредные привычки
Правильность = 4
-

Вопрос № 32

Что такое бронхиальный секрет?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Совокупный продукт клеток Клара и бокаловидных клеток
Правильность = 1
 - 2) Мокрота
Правильность = 2
 - 3) Составная часть мокроты
Правильность = 3
 - 4) Сурфактант
Правильность = 4
 - 5) Суммарный продукт локальной секреции, транссудации плазмы и метаболизма вегетирующих микроорганизмов
Правильность = 100
-

Вопрос № 33

Что такое мокрота?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Смесь бронхиального секрета, слюны, различных "патологических" включений (гной, кровь, инородные тела типа известковых крошек и др.)
Правильность = 100
 - 2) Патологические выделения воздухоносных путей
Правильность = 50
 - 3) Физиологическое выделение воздухоносных путей
Правильность = 1
 - 4) Сурфактант
Правильность = 2
-

Вопрос № 34

Какие факторы являются определяющими в возникновении и развитии туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Различные штаммы микобактерий
Правильность = 1
 - 2) Наследственная сниженная устойчивость макроорганизма к МБТ
Правильность = 2
 - 3) Возрастные особенности макроорганизма
Правильность = 3
 - 4) Вредные привычки, профессиональные вредности
Правильность = 4
 - 5) Микобактерии туберкулеза и нарушение иммунитета
Правильность = 100
-

Вопрос № 35

Какова основная задача массовой туберкулинодиагностики?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Профилактика туберкулеза, определение активности туберкулеза
Правильность = 1
 - 2) Иммуностимуляция молодого организма
Правильность = 2
 - 3) Диагностика поствакцинальной аллергии
Правильность = 3
 - 4) Отбор на ревакцинацию БЦЖ, определение тубинфицирования, выявление туберкулеза
Правильность = 100
 - 5) Дифференциальная диагностика легочной патологии
Правильность = 4
-

Вопрос № 36

Чем является туберкулин с точки зрения иммунологов?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Гаптен
Правильность = 100
 - 2) Мутаген
Правильность = 1
 - 3) Фактор миграции нейтрофилов
Правильность = 2
 - 4) Полный антиген
Правильность = 3
-

Вопрос № 37

Кто первым предложил термин "туберкулез"?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Гиппократ
Правильность = 1
 - 2) Р. Лаэннек
Правильность = 100
 - 3) Р. Кох
Правильность = 2
 - 4) А. Кальмет
Правильность = 3
-

Вопрос № 38

О чем свидетельствует угасание туберкулиновой чувствительности на фоне прогрессирования туберкулезного процесса?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) О пассивной или отрицательной анергии
Правильность = 100
 - 2) О поствакцинальной реакции
Правильность = 1
 - 3) Об активной или положительной анергии
Правильность = 2
 - 4) О парадоксальной туберкулиновой чувствительности
Правильность = 3
-

Вопрос № 39

Какие морфологические варианты МБТ наблюдаются преимущественно в процессе химиотерапии при сохранении деструкции легочной ткани?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Нестабильные L-формы
Правильность = 100
 - 2) Палочковидные
Правильность = 1
 - 3) Стабильные L-формы
Правильность = 2
 - 4) Зернистые
Правильность = 3
 - 5) Фильтрующиеся
Правильность = 4
-

Вопрос № 40

Какие субпопуляции МБТ выделяют?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Бактериальные формы, L-формы, ультрамелкие МБТ
Правильность = 1
- 2) Внутриклеточные и внеклеточные микобактерии
Правильность = 2
- 3) Устойчивые и чувствительные к туберкулостатикам

Правильность = 3

4) Активно метаболизирующие, медленно размножающиеся, персистирующие

Правильность = 100

Вопрос № 41

Что называется туберкулином?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

1) Вытяжка из ослабленного штамма бульонной культуры МБТ

Правильность = 1

2) Фильтрат бульонной культуры бычьего типа МБТ

Правильность = 2

3) Вакцина, содержащая обломки и продукты МБТ бычьего типа

Правильность = 3

4) Автоклавированный фильтрат 6-8 недельной культуры МБТ

Правильность = 100

5) Гомогенизированная очищенная культура авирулентных МБТ

Правильность = 4

Вопрос № 42

Сколько сегментов, как правило, имеется в левом легком?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Восемь

Правильность = 100

2) Девять

Правильность = 1

3) Десять

Правильность = 2

4) Одиннадцать

Правильность = 3

Вопрос № 43

Сколько сегментов обычно имеется в верхней доле левого легкого?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Два

Правильность = 1

2) Три

Правильность = 2

3) Шесть

Правильность = 3

4) Семь

Правильность = 4

5) Пять

Правильность = 25

6) Четыре

Правильность = 100

Вопрос № 44

Сколько сегментов в язычковой доле?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Два

Правильность = 100

2) Три

Правильность = 1

3) Один

Правильность = 2

Вопрос № 45

Сколько сегментов в правом легком?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

1) Восемь

Правильность = 1

2) Девять

Правильность = 2

3) Десять

Правильность = 100

4) Одиннадцать

Правильность = 3

Вопрос № 46

Каково соотношение в норме клеток реснитчатого эпителия и бокаловидных клеток слизистой бронхов?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) 1:1 - 1:2

Правильность = 1

2) 1:5 - 1:4

Правильность = 2

3) 7:1 - 9:1

Правильность = 3

4) 5:1 - 4:1

Правильность = 100

Вопрос № 47

Какие наиболее частые патофизиологические нарушения со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем встречаются у больных туберкулезом легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Развитие дыхательной недостаточности

Правильность = 100

- 2) Развитие легочно-сердечной недостаточности
Правильность = 50
 - 3) Нарушение основного обмена
Правильность = 1
 - 4) Развитие сердечно-сосудистой недостаточности
Правильность = 2
 - 5) Развитие сосудистой недостаточности
Правильность = 3
-

Вопрос № 48

Какие проявления дисфункции поджелудочной железы чаще возникают у больных туберкулезом легких?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Нарушения углеводного обмена с изменением концентрации глюкозы в плазме крови
Правильность = 1
 - 2) Нарушения окислительно-восстановительных процессов в тканях с повышением содержания молочной кислоты и пировиноградной кислоты в моче
Правильность = 100
 - 3) Нарушения ферментативной функции с увеличением активности ряда ферментов в крови
Правильность = 2
-

Вопрос № 49

Какие проявления дисфункции печени чаще возникают у больных туберкулезом?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Нарушение дезинтоксикационной функции
Правильность = 100
 - 2) Ослабление способности ассимилировать белки, жиры и углеводы
Правильность = 1
 - 3) Нарушение желчевыделительной функции
Правильность = 2
 - 4) Нарушение белково-синтезирующей функции
Правильность = 3
-

Вопрос № 50

Какие отделы париетальной плевры существуют?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Междолевая, верхушечная
Правильность = 1
- 2) Все перечисленное
Правильность = 2
- 3) Медиастинальная
Правильность = 30
- 4) Диафрагмальная
Правильность = 30
- 5) Реберная

Правильность = 30

б) Реберная, медиастинальная, диафрагмальная

Правильность = 100

Вопрос № 51

Что представляет из себя плевральная полость в норме?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Полость, заполненная небольшим количеством жидкости

Правильность = 1

2) Полость, заполненная небольшим количеством воздуха

Правильность = 2

3) Потенциальное пространство между висцеральной и париетальной плеврой, заполненное "смазочной" жидкостью

Правильность = 100

Вопрос № 52

Каково среднее внутриплевральное давление в норме?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Выше атмосферного

Правильность = 1

2) Равно атмосферному

Правильность = 2

3) Ниже атмосферного

Правильность = 100

Вопрос № 53

Где в основном расположена глубокая коллекторная лимфатическая сеть легкого?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

1) В кортикальных отделах легкого и висцеральной плевре

Правильность = 1

2) В корне легкого

Правильность = 2

3) В средостении

Правильность = 3

4) В стенке бронхов, адвентиции артерий и вен

Правильность = 100

Вопрос № 54

Какую основную функцию несут бокаловидные клетки слизистой бронхов?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Эскалаторную

Правильность = 1

- 2) Инкреторную
Правильность = 2
 - 3) Все перечисленное
Правильность = 3
 - 4) Нейроэндокринную
Правильность = 4
 - 5) Медиаторную
Правильность = 5
 - 6) Секреторную
Правильность = 100
-

Вопрос № 55

Какие морфо-функциональные структуры обеспечивают мукоцилиарный клиренс бронхов?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Вегетативная нервная система и кашлевой рефлекс
Правильность = 1
 - 2) Клетки Клара, сурфактант, альвеолоциты второго порядка
Правильность = 2
 - 3) Реснитчатый эпителий, кашлевой рефлекс и сурфактант
Правильность = 3
 - 4) Бронхиальные железы, бокаловидные клетки и реснитчатый эпителий
Правильность = 100
-

Вопрос № 56

Какие анатомические структуры составляют корень легкого?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Главный бронх, легочные артерия и вена, бронхиальная артерия, лимфатические сосуды, нервные стволы
Правильность = 100
 - 2) Долевые бронхи, бронхиальные артерии и вены, ветви легочной артерии, лимфоузлы, нервные стволы
Правильность = 1
 - 3) Анатомические структуры на уровне от долевых до сегментарных бронхов
Правильность = 2
-

Вопрос № 57

На уровне какого позвонка кончается спинной мозг у человека?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 12-го грудного
Правильность = 1
- 2) 1-го поясничного
Правильность = 2
- 3) 2-го поясничного
Правильность = 100

- 4) 4-го поясничного
Правильность = 3
- 5) 5-го поясничного
Правильность = 4
-

Вопрос № 58

За какое время ультрафиолетовое облучение убивает микобактерии туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 6 часов
Правильность = 1
- 2) 1 час
Правильность = 2
- 3) 30 минут
Правильность = 3
- 4) 20 минут
Правильность = 4
- 5) 2-3 минуты
Правильность = 100
-

Вопрос № 59

Как долго сохраняют свою жизнеспособность микобактерии туберкулеза на страницах книг?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) До десяти дней
Правильность = 1
- 2) До года
Правильность = 2
- 3) 3 дня
Правильность = 3
- 4) До трех месяцев
Правильность = 100
- 5) До шести месяцев
Правильность = 4
-

Вопрос № 60

Каково среднее количество ликвора у взрослого человека в норме?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Около 50 мл
Правильность = 1
- 2) Около 150 мл
Правильность = 100
- 3) Около 350 мл
Правильность = 2
- 4) Около 400 мл
Правильность = 3

5) Около 500 мл
Правильность = 4

Вопрос № 61

Какова частота полного "обновления" ликвора у взрослого человека в норме?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) 15-20 раз в сутки
Правильность = 1
 - 2) 4-8 раз в сутки
Правильность = 100
 - 3) Один раз в сутки
Правильность = 2
 - 4) Один раз в неделю
Правильность = 3
-

Вопрос № 62

Что подразумевает биологический метод выявления микобактерий туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Заражение морской свинки исследуемым материалом
Правильность = 100
 - 2) Заражение крысы исследуемым материалом
Правильность = 1
 - 3) Посев на искусственную культуру ткани
Правильность = 2
 - 4) Пробное лечение больного и наблюдение за посевами мокроты
Правильность = 3
 - 5) Инкубация материала с донорской кровью
Правильность = 4
-

Вопрос № 63

Какая среда является стандартной питательной средой для выращивания микобактерий туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Сабуро
Правильность = 1
 - 2) Кауффмана
Правильность = 2
 - 3) Левинтала
Правильность = 3
 - 4) Борде-Жангу
Правильность = 4
 - 5) Левенштейна-Йенсена
Правильность = 100
-

Вопрос № 64

Как долго растут микобактерии туберкулеза человеческого типа при посеве на питательные среды?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) От 1 месяца до 6 месяцев
Правильность = 1
 - 2) От 2 недель до 3 недель
Правильность = 2
 - 3) От 2 дней до 7 дней
Правильность = 3
 - 4) От 2 недель до 3 месяцев
Правильность = 100
-

Вопрос № 65

Каково общее свойство L-форм микобактерий и БЦЖ-штамма микобактерий туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Вирусоподобная структура
Правильность = 1
 - 2) Наличие жгутиков
Правильность = 2
 - 3) Наличие ундулирующей мембраны
Правильность = 3
 - 4) Повышенная подвижность в жидких средах
Правильность = 4
 - 5) Сниженная вирулентность возбудителя
Правильность = 100
-

Вопрос № 66

Как выглядят микобактерии при окраске мазка по Цилю-Нильсену?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Фиолетовые микобактерии на белом фоне
Правильность = 1
 - 2) Черные микобактерии на белом фоне
Правильность = 2
 - 3) Красные микобактерии на желтом фоне
Правильность = 3
 - 4) Зеленые микобактерии на розовом фоне
Правильность = 4
 - 5) Красные микобактерии на синем фоне
Правильность = 100
-

Вопрос № 67

Какое из перечисленных животных наиболее восприимчиво к туберкулезу?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Белая мышь
Правильность = 1
 - 2) Крыса линии "Август"
Правильность = 2
 - 3) Крыса линии "Вистар"
Правильность = 3
 - 4) Собака
Правильность = 4
 - 5) Морская свинка
Правильность = 100
 - 6) Кролик
Правильность = 5
-

Вопрос № 68

Какое минимальное количество микобактерий должно содержаться в 1мл исследуемого материала, чтобы их можно было обнаружить методом микроскопии?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 10
Правильность = 1
 - 2) 100
Правильность = 2
 - 3) 1000
Правильность = 3
 - 4) 10 000
Правильность = 4
 - 5) 100 000
Правильность = 100
 - 6) 1 000 000
Правильность = 5
-

Вопрос № 69

Какова физиологическая роль секреторного иммуноглобулина А?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Образование иммунных комплексов в базальной мембране слизистой бронхов
Правильность = 1
 - 2) Усиление фагоцитирующих свойств макрофагов в бронхиальном секрете
Правильность = 2
 - 3) Предотвращение цитоадгезивного действия бактерий и вирусов на эпителий бронхов
Правильность = 100
 - 4) Инициация возникновения аутоаллергических реакций
Правильность = 3
-

Вопрос № 70

Как отразить суть учения о ранней фазе первичной тубинфекции?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Параспецифические изменения в паренхиматозных органах
Правильность = 1
 - 2) Вираз туберкулиновых проб
Правильность = 2
 - 3) Гематогенная диссеминация МБТ с места входных ворот, возникающая до формирования локальных форм первичного туберкулёза
Правильность = 100
 - 4) Преобладание функциональных расстройств над морфологическими
Правильность = 3
 - 5) Преобладание морфологических расстройств над функциональными
Правильность = 4
-

Вопрос № 71

Что является определяющим в понятии "скрытый микробизм"?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Отсутствие явных специфических изменений в тканях при обнаружении в них МБТ
Правильность = 100
 - 2) "Малые" специфические изменения в тканях
Правильность = 1
 - 3) Наличие в организме МБТ, не определяемых современными методами
Правильность = 2
 - 4) Отсутствие явных клинических проявлений при обнаружении МБТ в мокроте
Правильность = 3
-

Вопрос № 72

С какой скоростью реснички бронхиального эпителия совершают колебательные движения?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) До 1 в секунду
Правильность = 1
 - 2) До одной в минуту
Правильность = 2
 - 3) До 20 в секунду
Правильность = 100
 - 4) До 100 в секунду
Правильность = 3
-

Вопрос № 73

Сколько ворсинок в среднем содержит реснитчатая клетка слизистой бронхов?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) До 50
Правильность = 1
- 2) До 100

- Правильность = 2
3) До 200
Правильность = 100
4) До 500
Правильность = 3
5) До 1000
Правильность = 4
-

Вопрос № 74

В каких отделах бронхиального дерева отмечается наибольшая толщина мышечного слоя стенки?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) В главных бронхах
Правильность = 1
2) В сегментарных бронхах
Правильность = 2
3) В трахее
Правильность = 3
4) В бронхиолах
Правильность = 100
-

Вопрос № 75

Какие отделы бронхиального дерева лишены мерцательного эпителия

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Долевые бронхи
Правильность = 1
2) Сегментарные бронхи
Правильность = 2
3) Бронхи 3-4 порядка
Правильность = 3
4) Респираторные бронхиолы
Правильность = 100
5) Дольковые бронхи и бронхиолы
Правильность = 4
-

Вопрос № 76

Какова в среднем площадь всех альвеол человека?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 1 квадратный метр
Правильность = 1
2) 10 квадратных метров
Правильность = 2
3) 50 квадратных метров
Правильность = 3
4) 80-90 квадратных метров

Правильность = 100
5) 0,5 квадратного метра
Правильность = 4

Вопрос № 77

Чем отличаются респираторные бронхиолы от терминальных?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Имеют в своих стенках альвеолы
Правильность = 100
 - 2) Имеют в своей стенке клетки Клара
Правильность = 1
 - 3) Не имеют хрящевого каркаса
Правильность = 2
 - 4) Не имеют гладких мышечных волокон
Правильность = 3
-

Вопрос № 78

Дисфункция каких желез при туберкулезе наиболее влияет на интенсивность воспалительных реакций?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Половых желез
Правильность = 1
 - 2) Кору надпочечников
Правильность = 100
 - 3) Щитовидной железы
Правильность = 2
 - 4) Поджелудочной железы
Правильность = 3
 - 5) Гипофиза
Правильность = 4
-

Вопрос № 79

Какое давление в легочной артерии и правом предсердии считается нормальным?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) 10-15 мм.рт.ст.
Правильность = 1
 - 2) 25-30 мм.рт.ст.
Правильность = 100
 - 3) 31-50 мм.рт.ст.
Правильность = 2
 - 4) 51-75 мм.рт.ст.
Правильность = 3
 - 5) 76-100 мм.рт.ст.
Правильность = 4
-

Вопрос № 80

Для какой степени лёгочно-артериальной гипертензии по классификации Весельникова (1973) характерно повышение давления в малом круге до 76-100 мм. рт.ст.?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) 1 степень
Правильность = 1
 - 2) 2 степень.
Правильность = 2
 - 3) 3 степень
Правильность = 100
 - 4) 4 степень
Правильность = 3
-

Вопрос № 81

Какая методика из перечисленных дает наиболее полное представление о функциональном состоянии коры надпочечников?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Определение уровня 17-оксикортикостероидов в периферической крови
Правильность = 100
 - 2) Проба Квика-Пытеля
Правильность = 1
 - 3) Проба Торна
Правильность = 1
 - 4) Определение уровня 17-кетостероидов, выделяемых с мочой
Правильность = 2
 - 5) Проба Лабара
Правильность = 3
-

Вопрос № 82

Снижение концентрации каких иммунокомпетентных клеток в крови происходит в первую очередь при развитии туберкулёзного процесса?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Сегментоядерных нейтрофилов
Правильность = 1
 - 2) Эозинофилов
Правильность = 2
 - 3) Базофилов
Правильность = 3
 - 4) Т-лимфоцитов
Правильность = 100
 - 5) В-лимфоцитов
Правильность = 4
-

Вопрос № 83

Какой показатель из перечисленных характеризует функциональную активность Т-лимфоцитов?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Уровень иммуноглобулинов
Правильность = 1
 - 2) ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы)
Правильность = 2
 - 3) РБТЛ с ФГА
Правильность = 100
 - 4) Противолегочные антитела
Правильность = 3
 - 5) Титр гетероненных агглютининов
Правильность = 4
 - 6) Е-РОК
Правильность = 5
-

Вопрос № 84

Какая функциональная активность Т-лимфоцитов характерна для здорового человека (по РБТЛ с ФГА)?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) 1-2%
Правильность = 1
 - 2) 3-10%
Правильность = 2
 - 3) 11-20%
Правильность = 3
 - 4) 30-40%
Правильность = 4
 - 5) 60-70%
Правильность = 100
-

Вопрос № 85

Какая функциональная активность Т-лимфоцитов характерна для больного прогрессирующим туберкулёзом (по РБТЛ с ФГА)?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Менее 30%
Правильность = 100
 - 2) Менее 70%
Правильность = 1
 - 3) 60-70%
Правильность = 2
 - 4) Более 70%
Правильность = 3
-

Вопрос № 86

С помощью какой иммунологической реакции можно определить количество Т-лимфоцитов?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) РБТЛ ФГА
Правильность = 1
 - 2) ЦИК
Правильность = 2
 - 3) Е-РОК
Правильность = 100
 - 4) РБТЛ с ППД
Правильность = 3
-

Вопрос № 87

Как обычно изменяется показатель РБТЛ с ФГА у больных с прогрессирующим туберкулёзом?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Повышается
Правильность = 1
 - 2) Снижается
Правильность = 100
 - 3) Не меняется-
Правильность = 2
 - 4) Недостоверно колеблется
Правильность = 3
-

Вопрос № 88

Как обычно изменяется показатель Е-РОК у больных с прогрессирующим туберкулёзом?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Повышается
Правильность = 1
 - 2) Снижается
Правильность = 100
 - 3) Не меняется
Правильность = 2
 - 4) Недостоверно колеблется
Правильность = 3
-

Вопрос № 89

Какой иммуноглобулин не содержится в бронхиальном секрете в норме, то есть при отсутствии патологии бронхо-легочного аппарата?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Иммуноглобулин А
Правильность = 1

- 2) Иммуноглобулин D
Правильность = 2
 - 3) Иммуноглобулин E
Правильность = 3
 - 4) Иммуноглобулин G
Правильность = 4
 - 5) Иммуноглобулин M
Правильность = 100
-

Вопрос № 90

Какова физиологическая роль иммуноглобулина G?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Образование иммунных комплексов в базальной мембране слизистой бронхов
Правильность = 100
 - 2) Усиление фагоцитирующих свойств макрофагов в бронхиальном секрете
Правильность = 1
 - 3) Предотвращение цитоадгезивного действия бактерий и вирусов на эпителий бронхов
Правильность = 2
 - 4) Инициация возникновения аутоаллергических реакций
Правильность = 3
-

Вопрос № 91

Каким путём попадает лимфа из правого лёгкого в большой круг кровообращения?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Через нижнюю полую вену
Правильность = 1
 - 2) Через безымянную вену
Правильность = 2
 - 3) Через грудной проток
Правильность = 100
-

Вопрос № 92

В каком месте висцеральная плевра переходит в париетальную?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) У ворот корня легкого
Правильность = 100
 - 2) В междолевых щелях легкого
Правильность = 1
 - 3) В костно-диафрагмальном отделе
Правильность = 2
 - 4) На верхушке легкого
Правильность = 3
-

Вопрос № 93

Как называется четвертый сегмент правого легкого?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Передний сегмент верхней доли
Правильность = 1
 - 2) Внутренний сегмент нижней доли
Правильность = 2
 - 3) Внутренний сегмент средней доли
Правильность = 3
 - 4) Наружный сегмент средней доли
Правильность = 100
-

Вопрос № 94

Бронхами какого порядка вентилируются легочные сегменты?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Первого порядка
Правильность = 1
 - 2) Второго порядка
Правильность = 2
 - 3) Третьего порядка
Правильность = 100
 - 4) Четвертого порядка
Правильность = 3
-

Вопрос № 95

Сколько нужно иметь МБТ в 1 мл материала, чтобы обнаружить их методом бактериоскопии после флотации?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) 100 - 200
Правильность = 1
 - 2) Менее 100
Правильность = 2
 - 3) 1 тысяча - 2 тысячи
Правильность = 100
 - 4) 10 тысяч - 20 тысяч
Правильность = 3
 - 5) 25 тысяч - 50 тысяч
Правильность = 4
 - 6) 100 тысяч и более
Правильность = 5
-

Вопрос № 96

Какой метод исследования материала на МБТ используется наиболее часто?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Бактериологический (метод посева на питательные среды)
Правильность = 1
 - 2) Биологический метод
Правильность = 2
 - 3) Метод простой микроскопии
Правильность = 100
 - 4) Радиометрический метод
Правильность = 3
 - 5) Иммунологический метод
Правильность = 4
-

Вопрос № 97

В каких случаях нецелесообразно делать пробу Манту с 2 ТЕ?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Если делалась прививка БЦЖ в течение последнего года
Правильность = 1
 - 2) Инфекционное заболевание в период обострения
Правильность = 100
 - 3) Предшествующая положительная реакция на туберкулин
Правильность = 2
 - 4) Предшествующая отрицательная реакция на туберкулин
Правильность = 3
 - 5) Подозрение на туберкулезное инфицирование
Правильность = 4
-

Вопрос № 98

В каком случае можно было бы точно различать поствакцинальную положительную реакцию на туберкулин и реакцию на туберкулин при инфицировании туберкулезом?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Если штаммы используемые для БЦЖ и для туберкулина антигенно идентичны
Правильность = 1
 - 2) Если штаммы используемые для БЦЖ и для туберкулина не имели бы общих антигенов
Правильность = 100
 - 3) Если бы применялся только туберкулин Линниковой
Правильность = 2
 - 4) Если бы туберкулиновые пробы делались утром, натощак
Правильность = 3
-

Вопрос № 99

Каким методом наиболее часто определяется чувствительность МБТ к химиопрепаратам?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Химическим
Правильность = 1
- 2) Радиометрическим

- Правильность = 2
- 3) Фармакологическим
Правильность = 3
- 4) Микробиологическим
Правильность = 100
- 5) Иммунологическим
Правильность = 5
-

Вопрос № 100

Какие свойства МБТ положены в основу микроскопии?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Морфологические
Правильность = 1
- 2) Культуральные
Правильность = 2
- 3) Тинкториальные
Правильность = 100
- 4) Иммунологические
Правильность = 3
- 5) Радиоизотопные
Правильность = 4
-

Вопрос № 101

Как называется четвертый сегмент левого легкого?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Передний сегмент верхней доли
Правильность = 1
- 2) Переднебазальный сегмент
Правильность = 2
- 3) Наружный язычковый сегмент
Правильность = 3
- 4) Верхний язычковый сегмент
Правильность = 100
-

Вопрос № 102

Какие морфологические процессы преобладают в стенке полости при кавернозной форме туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Некротические
Правильность = 1
- 2) Экссудативные
Правильность = 2
- 3) Продуктивные
Правильность = 100
-

Вопрос № 103

Какие элементы корня легкого дифференцируются на рентгенограммах в норме?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Сосуды легочной артерии, внутригрудные лимфоузлы

Правильность = 1

2) Аорта, верхняя полая вена

Правильность = 2

3) Сосуды легочной артерии, крупные вены, бронхи

Правильность = 100

Тема 2. Эпидемиология туберкулеза, организация противотуберкулезной службы, диспансерная работа

Вопрос № 1

Сколько курсов химиопрофилактики необходимо провести контактирующим животноводам при выявлении туберкулеза у скота?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Один

Правильность = 1

2) Два

Правильность = 100

3) Три

Правильность = 2

4) Четыре

Правильность = 3

Вопрос № 2

В течении какого времени проводится наблюдение за контактирующими после смерти бактериовыделителя?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Один год

Правильность = 1

2) Два года

Правильность = 100

3) Три года

Правильность = 2

4) 6 месяцев

Правильность = 3

Вопрос № 3

В какой группе диспансерного учета наблюдаются дети с гиперергическими реакциями на туберкулин?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) В VIA

Правильность = 1

2) В VIБ

Правильность = 100

3) В VIВ

Правильность = 2

4) В I

Правильность = 3

Вопрос № 4

По какой схеме целесообразно проводить химиопрофилактику лицам IV группы диспансерного учета?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 3 месяца 1 раз в год
Правильность = 1
 - 2) 1 месяц 2 раза в год
Правильность = 2
 - 3) 3 месяца 2 раза в год
Правильность = 100
-

Вопрос № 5

Какие пути передачи тубинфекции выделяют?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Капельный, пылевой, контактный, внутриутробный
Правильность = 1
 - 2) Капельный, пылевой, алиментарный, контактный
Правильность = 2
 - 3) Воздушно-пылевой, контактный, через околоплодные воды
Правильность = 3
 - 4) Аэрогенный, алиментарный, контактный, внутриутробный
Правильность = 100
-

Вопрос № 6

Чем отличается заключительная дезинфекция в тубочаге от текущей?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Объемом дезинфекционных мероприятий
Правильность = 1
 - 2) Использованием сильнодействующих средств
Правильность = 3
 - 3) Периодичностью проведения
Правильность = 2
 - 4) Проводится дезстанцией
Правильность = 100
-

Вопрос № 7

Какие факторы являются наиболее существенными в возникновении рецидива туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Неполноценные противорецидивные курсы химиотерапии
Правильность = 1
- 2) Сопутствующие заболевания, курение
Правильность = 2
- 3) Неблагоприятные условия внешней среды, труда и быта

Правильность = 3

4) Неполюценный основной курс АБТ, большие остаточные изменения

Правильность = 100

Вопрос № 8

Какой препарат из перечисленных является наиболее предпочтительным для проведения химиопрофилактики туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Изониазид

Правильность = 100

2) Рифампицин

Правильность = 1

3) Метазид

Правильность = 2

4) Тизамид

Правильность = 3

5) Этамбутол

Правильность = 4

Вопрос № 9

Как предпочтительнее принимать суточную дозу изониазида при проведении химиопрофилактики?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) В один прием

Правильность = 100

2) В два приема

Правильность = 1

3) В три приема

Правильность = 2

4) Не имеет значения

Правильность = 3

Вопрос № 10

Какой должна быть доза изониазида для проведения химиопрофилактики взрослым?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) 0,3 г в сутки

Правильность = 1

2) 0,45 г в сутки

Правильность = 2

3) 0,9 г в сутки

Правильность = 3

4) 0,6 г в сутки

Правильность = 100

Вопрос № 11

На какой максимальный срок выдается изониазид при проведении химиопрофилактики на дому?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) 2 дня

Правильность = 1

2) 10 дней

Правильность = 2

3) 14 дней

Правильность = 3

4) 7 дней

Правильность = 100

Вопрос № 12

Какой должна быть тактика врача при сохранении у ребенка гиперергической реакции к туберкулину в течение года?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

1) Курс химиопрофилактики повторяется два раза в год

Правильность = 1

2) Курс химиопрофилактики повторяется однократно в течение месяца

Правильность = 2

3) Курс химиопрофилактики повторяется однократно в течение трех месяцев

Правильность = 100

Вопрос № 13

В какой группе диспансерного учета наблюдаются дети с "выражом" туберкулиновой пробы?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) В VI-A

Правильность = 100

2) В VI-B

Правильность = 1

3) В VI-B

Правильность = 2

4) В I

Правильность = 3

5) В III-A

Правильность = 0

Вопрос № 14

Как должна проводиться химиопрофилактика детям и подросткам с "выражом" туберкулиновой реакции?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Три месяца одним курсом
Правильность = 100
 - 2) По одному месяцу 2 раза в год
Правильность = 1
 - 3) Один месяц одним курсом
Правильность = 2
 - 4) По два месяца 2 раза в год весной и осенью
Правильность = 3
-

Вопрос № 15

Каков наиболее частый механизм развития туберкулеза у взрослых в странах с высокой инфицированностью?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Экзогенная суперинфекция
Правильность = 1
 - 2) Экзогенная инфекция
Правильность = 2
 - 3) Эндогенная реактивация инфекции
Правильность = 100
-

Вопрос № 16

Сколько новых больных туберкулезом ежегодно выявляется во всем мире?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Около 25-30 миллионов человек
Правильность = 1
 - 2) Около 10 миллионов человек
Правильность = 100
 - 3) Около 5-6 миллионов человек
Правильность = 2
 - 4) Около 150 - 200 тысяч человек
Правильность = 3
-

Вопрос № 17

Что подразумевается под очагом туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Место жительства больного туберкулезом легких
Правильность = 1
 - 2) Регион с высокой заболеваемостью туберкулезом
Правильность = 2
 - 3) Регион с ростом заболеваемости туберкулезом
Правильность = 3
 - 4) Место жительства или работы больного туберкулезом бацилловыделителя
Правильность = 100
-

Вопрос № 18

Кто проводит текущую дезинфекцию в очаге туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Родственники пациента или он сам
Правильность = 100
 - 2) Сотрудники районной поликлиники
Правильность = 1
 - 3) Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы
Правильность = 2
 - 4) Сотрудники коммунальных служб города
Правильность = 3
 - 5) Сотрудники противотуберкулезного диспансера
Правильность = 4
 - 6) Сотрудники дезстанции по заявке тубдиспансера
Правильность = 5
-

Вопрос № 19

Какие группы показателей из перечисленных в наибольшей мере отражают эпидобстановку по туберкулезу?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Заболеваемость туберкулезом, смертность от туберкулеза, процент закрытия полостей распада у вновь выявленных больных
Правильность = 1
 - 2) Болезненность туберкулезом, смертность от туберкулеза, доля выявленных при профосмотрах, обеспеченность тубкойками
Правильность = 2
 - 3) Заболеваемость, болезненность туберкулезом, смертность от туберкулеза, инфицированность туберкулезом
Правильность = 100
-

Вопрос № 20

Кому принадлежит ведущая роль в организации фтизиатрической помощи в республике, крае, области?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Городским и районным тубдиспансерам
Правильность = 1
- 2) Туберкулезным отделениям больниц
Правильность = 2
- 3) Республиканской (областной, краевой) клинической больнице
Правильность = 3
- 4) Кафедрам туберкулеза и НИИ туберкулеза
Правильность = 4
- 5) Республиканским (областным, краевым) отделам (управлениям) здравоохранения
Правильность = 5
- 6) Противотуберкулезному областному (краевому, республиканскому) диспансеру

Правильность = 100

Вопрос № 21

Какой метод раннего выявления туберкулеза у взрослых является основным в России?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Массовая туберкулинодиагностика (проба Манту с 2 ТЕ)

Правильность = 1

2) Всеобщая диспансеризация населения

Правильность = 2

3) Массовое бактериологическое обследование

Правильность = 3

4) Массовая флюорография и флюорография декретированных групп

Правильность = 100

Вопрос № 22

Каков максимальный срок выдачи больничного листа врачом-фтизиатром впервые выявленному больному туберкулезом?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) 6 месяцев

Правильность = 1

2) 8 месяцев

Правильность = 2

3) 10 месяцев

Правильность = 3

4) 12 месяцев

Правильность = 100

5) 14 месяцев

Правильность = 4

Вопрос № 23

Почему в предупреждении заболевания туберкулезом велика роль общеоздоровительных и санитарно-гигиенических мероприятий?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Развитие и течение туберкулеза определяется общим состоянием организма и влиянием на него факторов внешней среды

Правильность = 1

2) Общеоздоровительные и санитарно-гигиенические мероприятия важны для предупреждения всех заболеваний

Правильность = 2

3) Туберкулез является общим заболеванием организма, поэтому общеоздоровительные и санитарно-гигиенические мероприятия имеют большое значение

Правильность = 100

Вопрос № 24

Что подразумевает показатель "Заболеваемость туберкулезом"?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Количество заболевших туберкулезом в данном году на определенной территории

Правильность = 1

2) Количество заболевших туберкулезом, распределенных по возрасту, полу и месту жительства

Правильность = 2

3) Общее количество заболевших туберкулезом и рецидивов в данном году на 100 тыс. населения

Правильность = 3

4) Количество впервые выявленных больных в данном году на определенной территории в пересчете на 100 тыс. населения

Правильность = 100

Вопрос № 25

Какой из перечисленных признаков не является определяющим при установлении III группы инвалидности больным туберкулезом?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Форма туберкулеза

Правильность = 1

2) Остаточные явления

Правильность = 2

3) Функциональные показатели

Правильность = 3

4) Возраст пациента

Правильность = 100

Вопрос № 26

Какой метод раннего выявления туберкулеза у детей и подростков является основным?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Ежегодная флюорография

Правильность = 1

2) Ежегодный осмотр педиатра

Правильность = 2

3) Поликлиническое лабораторное обследование

Правильность = 3

4) Иммуно-ферментный анализ сыворотки крови

Правильность = 4

5) Ежегодное проведение туберкулинодиагностики

Правильность = 100

Вопрос № 27

Чем достигается высокая эффективность выявления патологии и предупреждение ошибочных заключений при проведении флюорографии?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Дополнительным проведением бактериологического исследования
Правильность = 1
 - 2) Повторным проведением флюорографии в течение года
Правильность = 2
 - 3) Тем, что рулон снимков долго хранится
Правильность = 3
 - 4) Тем, что рулон снимков просматривается дважды разными врачами
Правильность = 100
-

Вопрос № 28

Какие критерии из перечисленных учитываются при установлении инвалидности II группы больным туберкулезом?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Ограниченная трудоспособность, необходимость изменения профессии
Правильность = 100
 - 2) Эпидпоказания, форма туберкулеза
Правильность = 1
 - 3) Нарушение функционального состояния, выраженные остаточные изменения
Правильность = 2
-

Вопрос № 29

Какая отчетность предусмотрена в настоящее время только для противотуберкулезного диспансера?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Отчетная форма N 33, форма N 30, форма N 14
Правильность = 1
 - 2) Отчетная форма N 33, список больных туберкулезом
Правильность = 2
 - 3) Форма N 14, форма N 30
Правильность = 3
 - 4) Форма N 14, список больных туберкулезом, формы N 30, N 33, N 8
Правильность = 4
 - 5) Отчетная форма N 33, форма N 8
Правильность = 100
-

Вопрос № 30

Какой показатель (коэффициент) целесообразно использовать для анализа распределения тубкоек по городам региона?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Экстенсивный
Правильность = 1
- 2) Интенсивный

- Правильность = 2
- 3) Коэффициент наглядности
Правильность = 3
- 4) Коэффициент соотношения
Правильность = 100
-

Вопрос № 31

Какой показатель (коэффициент) целесообразно использовать для отражения динамики заболеваемости на данной территории?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Экстенсивный
Правильность = 1
- 2) Интенсивный
Правильность = 2
- 3) Коэффициент наглядности
Правильность = 100
- 4) Коэффициент соотношения
Правильность = 3
-

Вопрос № 32

Может ли составляться контрольная карта диспансерного наблюдения (форма У-30-4) на здорового человека?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Да
Правильность = 100
- 2) Нет
Правильность = 1
- 3) В исключительных случаях
Правильность = 2
- 4) Может на лиц из групп повышенного риска заболевания туберкулезом
Правильность = 3
-

Вопрос № 33

Предупреждает ли вакцинация БЦЖ заболевание туберкулезом?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Предупреждает
Правильность = 1
- 2) Не предупреждает
Правильность = 100
- 3) Предупреждает только повторная вакцинация
Правильность = 2
-

Вопрос № 34

Составляется ли патологоанатомом или судебным экспертом извещение по форме N 058у в случае посмертной диагностики активного туберкулеза с наличием МБТ?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Нет
Правильность = 1
 - 2) Составляется только по согласованию с СЭС
Правильность = 2
 - 3) Да
Правильность = 100
-

Вопрос № 35

Составляется ли "извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза" по форме N 089у на больных туберкулезом, выявленных при массовых профосмотрах населения?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Да
Правильность = 1
 - 2) По усмотрению фтизиатра
Правильность = 2
 - 3) Нет
Правильность = 3
 - 4) Да, после подтверждения диагноза на ЦВКК
Правильность = 100
-

Вопрос № 36

В какой возрастной группе лиц мужского пола отмечается наиболее высокая заболеваемость туберкулезом?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Среди детей
Правильность = 1
 - 2) Среди подростков
Правильность = 2
 - 3) Среди взрослых до 30 лет
Правильность = 3
 - 4) Среди взрослых зрелого возраста от 30 до 50 лет
Правильность = 100
 - 5) Среди пожилых от 60 до 75 лет
Правильность = 4
 - 6) Среди лиц старческого возраста (после 75 лет)
Правильность = 5
-

Вопрос № 37

На сколько коек во фтизиатрических отделениях для взрослых следует планировать одну ставку врача-ординатора?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) На 7-10 коек
Правильность = 1
 - 2) На 10-15 коек
Правильность = 2
 - 3) На 15-20 коек
Правильность = 3
 - 4) На 25-30 коек
Правильность = 100
-

Вопрос № 38

Какие группы больных подлежат централизованному контролю (через ЦВКК) головными региональными (областными, краевыми, республиканскими) тубдиспансерами?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Все больные активным туберкулезом
Правильность = 1
 - 2) Больные IA группы диспансерного наблюдения
Правильность = 2
 - 3) Все группы диспансерного наблюдения
Правильность = 3
 - 4) Впервые выявленные больные туберкулезом легких, с рецидивом, больные фиброзно-кавернозным туберкулезом, нулевой группы учета
Правильность = 4
 - 5) Впервые выявленные больные туберкулезом, с рецидивом, сложные в отношении диагностики и лечения случаи
Правильность = 100
-

Вопрос № 39

Каков удельный вес туберкулеза органов дыхания в общей структуре заболеваемости туберкулезом в России?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 65-70%
Правильность = 1
 - 2) 75-80%
Правильность = 2
 - 3) 85-90%
Правильность = 100
-

Вопрос № 40

Какие показатели (коэффициенты) из перечисленных в наибольшей степени отражают качество работы по раннему выявлению туберкулеза?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Экстенсивные

Правильность = 100

2) Интенсивные

Правильность = 1

3) Коэффициенты наглядности

Правильность = 2

4) Коэффициенты соотношения

Правильность = 3

Вопрос № 41

Какие показатели (коэффициенты) из перечисленных в наибольшей степени отражают эпидобстановку по туберкулезу?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

1) Экстенсивные

Правильность = 1

2) Интенсивные

Правильность = 100

3) Коэффициенты наглядности

Правильность = 2

4) Коэффициенты соотношения

Правильность = 3

Вопрос № 42

Что подразумевает показатель "Смертность от туберкулеза"?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Число умерших от туберкулеза за истекший год

Правильность = 1

2) Количество умерших от активного туберкулеза в данном стационаре за отчетный год

Правильность = 2

3) Число умерших от активного туберкулеза за год на данной территории в пересчете на 100 тыс. населения

Правильность = 100

Вопрос № 43

Какой должна быть температура хранения вакцины БЦЖ?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) От +2 до +4 град. С

Правильность = 100

2) От -4 до 0 град. С

Правильность = 1

3) От +5 до +6 град. С

Правильность = 3

Вопрос № 44

В какой группе наблюдаются дети с осложнениями БЦЖ?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) VI-A
Правильность = 1
 - 2) VI-B
Правильность = 2
 - 3) I
Правильность = 3
 - 4) VI-B
Правильность = 4
 - 5) V
Правильность = 100
-

Вопрос № 45

В какой группе диспансерного учета наблюдаются дети с туберкулезом внутригрудных лимфоузлов в фазе кальцинации?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) В I группе
Правильность = 1
 - 2) Во II группе
Правильность = 2
 - 3) В III группе
Правильность = 100
 - 4) В I группе при обнаружении признаков активности процесса
Правильность = 3
-

Вопрос № 46

Какой должна быть температура хранения туберкулина?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) От +1 до +4 град. С
Правильность = 100
 - 2) От -2 до +2 град.
Правильность = 1
 - 3) От -4 до +4 град. С
Правильность = 2
 - 4) От 0 до +8 град. С
Правильность = 3
-

Вопрос № 47

Какой должна быть доза изониазида для проведения химиопрофилактики у детей?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 8-10 мг/кг, но не более 0,5г в сутки
Правильность = 100
- 2) 5 мг/кг

- Правильность = 1
3) 0,3г в сутки
Правильность = 2
-

Вопрос № 48

Какова оптимальная длительность курса химиопрофилактики туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 1 месяц
Правильность = 1
2) 4 месяца
Правильность = 2
3) 5 месяцев
Правильность = 3
4) 6 месяцев
Правильность = 4
5) 2 месяца
Правильность = 5
6) 3 месяца
Правильность = 100
-

Вопрос № 49

Каким должен быть интервал между пробой Манту с 2 ТЕ и вакцинацией БЦЖ?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 3 - 14 дней
Правильность = 100
2) 48 часов
Правильность = 1
3) до 30 дней
Правильность = 2
-

Вопрос № 50

В течение какого срока сохраняется иммунитет после вакцинации БЦЖ?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 1-2 года
Правильность = 1
2) 3-4 года
Правильность = 2
3) 10 лет
Правильность = 3
4) 5-7 лет
Правильность = 100
-

Вопрос № 51

Через какой срок после вакцинации БЦЖ формируется достаточно выраженный противотуберкулезный иммунитет?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 2-3 недели
Правильность = 1
 - 2) 4 недели
Правильность = 2
 - 3) 12-14 недель
Правильность = 3
 - 4) В течение года
Правильность = 4
 - 5) 6-8 недель
Правильность = 100
 - 6) 5-7 дней
Правильность = 5
-

Вопрос № 52

На какой день после рождения ребенка проводится вакцинация БЦЖ?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 3-7
Правильность = 100
 - 2) 8-10
Правильность = 1
 - 3) 1-2
Правильность = 2
-

Вопрос № 53

Как должна вводиться вакцина БЦЖ?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Внутривенно
Правильность = 100
 - 2) Подкожно
Правильность = 1
 - 3) Накожно
Правильность = 2
 - 4) Внутримышечно
Правильность = 3
-

Вопрос № 54

Какова типичная динамика местной прививочной реакции БЦЖ?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Пятно, папула, пустула, корочка, рубчик
Правильность = 100

- 2) Гиперемия, папула, корочка, рубчик, пустула
Правильность = 1
 - 3) Гиперемия, инфильтрат, корочка, рубчик
Правильность = 2
 - 4) Папула, корочка, пустула, пигментация
Правильность = 3
-

Вопрос № 55

Какие противопоказания для вакцинации БЦЖ являются абсолютными?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Иммунодефицит, ферментопатии, генерализованная инфекция БЦЖ у других детей в семье
Правильность = 100
 - 2) Гемолитическая болезнь новорожденных, нарушения гемоликвородинамики
Правильность = 1
 - 3) Перинатальная энцефалопатия, асфиксия новорожденных
Правильность = 2
-

Вопрос № 56

Какое население данной территории должно браться в расчет при вычислении показателя "Заболеваемость туберкулезом" в отчетном году?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) На начало отчетного года
Правильность = 1
 - 2) На конец отчетного года
Правильность = 2
 - 3) Полусумма численности на начало и конец отчетного года
Правильность = 100
-

Вопрос № 57

Что может произойти, если вакцина БЦЖ будет введена подкожно?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Разовьется иммунитет к человеческому типу микобактерий
Правильность = 1
 - 2) Возможно развитие местной и общей токсической реакции
Правильность = 2
 - 3) Возникает риск развития первичной устойчивости к препаратам
Правильность = 3
 - 4) Возникает риск формирования холодного абсцесса
Правильность = 100
-

Вопрос № 58

Какая причина из перечисленных является противопоказанием для вакцинации новорожденных?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Отсутствие штатного фтизиатра в роддоме
Правильность = 1
 - 2) Положительная проба Манту
Правильность = 2
 - 3) Указание на то, что один из родителей болен туберкулезом
Правильность = 3
 - 4) Недоношенность с массой тела менее 2,5 кг
Правильность = 100
-

Вопрос № 59

Какое население данной территории должно браться в расчет при вычислении показателя "Болезненность туберкулезом" в отчетном году?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) На начало отчетного года
Правильность = 1
 - 2) Полусумма численности на начало и конец отчетного года
Правильность = 2
 - 3) На конец отчетного года
Правильность = 100
-

Вопрос № 60

В каком варианте ответа приведен приемлемый способ мытья полов в противотуберкулезном учреждении?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Сначала обработать полы 1% раствором хлорной извести и через 15 минут смыть теплой водой
Правильность = 1
 - 2) Полы следует мыть 2% мыльно-содовым раствором (на 10 литров горячей воды 200 г кальцинированной соды и 50 г хозяйственного мыла)
Правильность = 100
 - 3) Полы обеззараживаются 5% раствором хлорамина и затем моются горячей водой
Правильность = 2
-

Вопрос № 61

В каком варианте ответа приведена правильная методика обработки посуды с остатками пищи в противотуберкулезных учреждениях?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Замачивание в 2% растворе гипохлорита на 45 минут
Правильность = 1
- 2) Кипячение в 2% растворе пищевой соды 15 минут с момента закипания
Правильность = 100
- 3) Замачивание в 5% растворе хлорамина на 30 минут
Правильность = 2

Вопрос № 62

Какое население данной территории должно браться в расчет при вычислении показателя "Смертность от туберкулеза" в отчетном году?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) На начало отчетного года
Правильность = 1
 - 2) На конец отчетного года
Правильность = 2
 - 3) Полусумма численности на начало и конец отчетного года
Правильность = 100
-

Вопрос № 63

Что необходимо обязательно учитывать при сопоставлении заболеваемости туберкулезом в разных странах?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Социально-политический строй
Правильность = 1
 - 2) Национальную структуру населения
Правильность = 2
 - 3) Географические и климатические особенности стран
Правильность = 3
 - 4) Долю населения, живущую "за чертой бедности"
Правильность = 4
 - 5) Основные методы и критерии выявления
Правильность = 100
-

Вопрос № 64

Какие впервые выявленные больные туберкулезом учитываются при расчете заболеваемости туберкулезом?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) При наличии бацилловыделения
Правильность = 1
 - 2) Трудоспособного возраста
Правильность = 2
 - 3) С наличием деструкции легочной ткани
Правильность = 3
 - 4) С подтвержденным любым способом диагнозом
Правильность = 100
-

Вопрос № 65

Какие изменения в эпидемиологии туберкулеза характерны во время войн и социальных катаклизмов?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Бессимптомное течение, возрастание хронических форм туберкулеза
Правильность = 1
 - 2) Преобладание внелегочных форм туберкулеза
Правильность = 2
 - 3) Смещение заболеваемости в старшие возрастные группы
Правильность = 3
 - 4) Возрастание заболеваемости, неблагоприятное течение
Правильность = 100
-

Вопрос № 66

В каком случае из перечисленных не проводится ревакцинация БЦЖ?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Отрицательная реакция на 2 ТЕ PPD-Л
Правильность = 1
 - 2) Отрицательная реакция на 100 ТЕ АТК
Правильность = 2
 - 3) Положительная проба Квейма
Правильность = 3
 - 4) Положительная проба Кацони
Правильность = 4
 - 5) Положительная реакция на 2 ТЕ PPD-Л
Правильность = 100
-

Вопрос № 67

Какой метод является методом активной специфической профилактики туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Вторичная химиопрофилактика
Правильность = 1
 - 2) Массовая туберкулинодиагностика
Правильность = 2
 - 3) Туберкулинотерапия
Правильность = 3
 - 4) Массовая флюорография
Правильность = 4
 - 5) Вакцинация БЦЖ
Правильность = 100
-

Вопрос № 68

Через какой срок после введения вакцины БЦЖ можно назначать другие профилактические прививки?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 1 год
Правильность = 1

- 2) 4 месяца
Правильность = 2
 - 3) 6 месяцев
Правильность = 3
 - 4) 2 года
Правильность = 4
 - 5) 1 месяц
Правильность = 100
-

Вопрос № 69

Какой способ дезинфекции следует рекомендовать больным туберкулезом для обработки книг и мягких игрушек из очага?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Орошение аэрозолем 3% хлорамина
Правильность = 1
 - 2) Облучение ультрафиолетовыми лучами (бактерицидной лампы)
Правильность = 2
 - 3) Камерная дезинфекция
Правильность = 100
-

Вопрос № 70

Каково допустимое время хранения рабочих растворов химических дезинфектантов с момента их приготовления?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 12 часов
Правильность = 1
 - 2) 24 часа
Правильность = 100
 - 3) 48 часов
Правильность = 2
 - 4) 72 часа
Правильность = 3
-

Вопрос № 71

Сколько раз можно использовать рабочие растворы хлорсодержащих дезинфектантов для обеззараживания?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) До изменения их окраски
Правильность = 1
 - 2) Только один раз
Правильность = 100
 - 3) Повторно в течение не более 24 часов
Правильность = 2
-

Вопрос № 72

Кто должен осуществлять контролируемые химиопрофилактику и амбулаторное лечение больных туберкулезом в сельской местности?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Уполномоченные организации Красного Креста и Красного Полумесяца
Правильность = 1
 - 2) Родственники пациентов
Правильность = 2
 - 3) Специально выделенные патронажные средние медработники ЦРБ
Правильность = 3
 - 4) Фельдшер ФАПа, райфтизиатр
Правильность = 100
-

Вопрос № 73

Где должен проводиться основной курс химиотерапии у детей и подростков I группы диспансерного учета?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) В санаториях, садах и школах санаторного типа
Правильность = 1
 - 2) Амбулаторно или в санатории
Правильность = 2
 - 3) Только в тубстационаре
Правильность = 3
 - 4) В тубстационарах, затем в санатории
Правильность = 100
-

Вопрос № 74

В каком случае из перечисленных диагнозов у взрослого пациента III группы учета сформулирован правильно?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Очаговый туберкулез легких в фазе уплотнения, БК-
Правильность = 1
 - 2) Метатуберкулезный цирроз правой верхней доли правого легкого
Правильность = 2
 - 3) Цирротический туберкулез правого легкого с санированной полостью
Правильность = 3
 - 4) Большие остаточные изменения в виде плотных очагов и фиброза верхней доли левого легкого после клинического излечения диссеминированного туберкулеза
Правильность = 4
 - 5) Клиническое излечение диссеминированного туберкулеза легких с исходом в цирроз верхних долей
Правильность = 100
-

Вопрос № 75

Какие больные туберкулезом включаются в I A группу диспансерного учета?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Больные с рецидивом туберкулеза и фиброзно-кавернозным туберкулезом
Правильность = 1
 - 2) Все больные с активным туберкулезом независимо от срока наблюдения
Правильность = 2
 - 3) Больные с впервые установленным туберкулезным процессом
Правильность = 100
-

Вопрос № 76

Как формулируется диагноз у лиц "0-A" группы диспансерного учета?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Туберкулез легких в фазе уплотнения
Правильность = 1
 - 2) Остаточные туберкулезные очаги
Правильность = 2
 - 3) Диагноз туберкулеза не указывается до выяснения активности процесса, а вписывается "заболевание легких"
Правильность = 3
 - 4) Туберкулез легких неясной активности
Правильность = 100
-

Вопрос № 77

Всегда ли однократное обнаружение МБТ в мокроте пациента методом бактериоскопии подтверждает активность туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Да
Правильность = 1
 - 2) Нет
Правильность = 100
 - 3) Да, если бактериоскопия сделана с использованием метода флотации
Правильность = 2
-

Вопрос № 78

Когда допустимо снятие больных с учета бактериовыделителей (кроме хронических форм)?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Не ранее, чем через 12 месяцев после прекращения бактериовыделения, наступившего в результате эффективно проведенного основного курса химиотерапии
Правильность = 100
- 2) Через 6 месяцев после прекращения бактериовыделения, заживления полости распада и успешного окончания основного курса химиотерапии
Правильность = 1

- 3) Не ранее, чем через 2 года с момента прекращения бактериовыделения
Правильность = 2
- 4) Решается индивидуально
Правильность = 3
-

Вопрос № 79

Как долго наблюдаются взрослые пациенты без остаточных изменений в III группе диспансерного учета?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Один год
Правильность = 100
- 2) Два года
Правильность = 1
- 3) Три года
Правильность = 2
- 4) До пяти лет
Правильность = 3
-

Вопрос № 80

Как часто должны посещать диспансер больные III группы учета?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Ежемесячно
Правильность = 1
- 2) Не реже одого раза в три месяца
Правильность = 2
- 3) Не реже одного раза в полугодие
Правильность = 100
- 4) Не реже одного раза в год
Правильность = 3
-

Вопрос № 81

Какие мероприятия проводятся среди контингентов I-A группы диспансерного учета?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Мероприятия по социально-трудовой реабилитации и трудоустройству больных
Правильность = 1
- 2) Санитарно-оздоровительные мероприятия
Правильность = 2
- 3) Профилактические мероприятия в тубочагах
Правильность = 3
- 4) Основной курс лечения
Правильность = 50
- 5) Все приведенные мероприятия
Правильность = 100
-

Вопрос № 82

В каком случае из перечисленных туберкулез органов дыхания выявлен своевременно?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Первичный тубкомплекс в фазе распада, БК-
Правильность = 1
 - 2) Цирротический туберкулез первого сегмента правой верхней доли, БК-
Правильность = 2
 - 3) Туберкулема в фазе распада, БК-
Правильность = 3
 - 4) Инфильтративный туберкулез верхней доли правого легкого, БК-
Правильность = 100
-

Вопрос № 83

С какого возраста должны проводиться массовые флюорографические профосмотры населения в благополучных по туберкулезу регионах?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) С семилетнего возраста
Правильность = 1
 - 2) С десятилетнего возраста
Правильность = 2
 - 3) С двенадцатилетнего возраста
Правильность = 3
 - 4) С пятнадцатилетнего возраста
Правильность = 100
-

Вопрос № 84

С какого возраста должны проводиться массовые флюорографические профосмотры населения?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) С семилетнего возраста
Правильность = 1
 - 2) С десятилетнего возраста
Правильность = 2
 - 3) С двенадцатилетнего возраста
Правильность = 3
 - 4) С пятнадцатилетнего возраста
Правильность = 100
-

Вопрос № 85

Какие основные задачи ставятся перед санаториями-профилакториями, входящими в состав тубдиспансеров?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Проведение основного курса химиотерапии

- Правильность = 1
- 2) Санитарно-гигиеническое воспитание лиц с повышенным риском заболевания туберкулезом
Правильность = 2
- 3) Проведение профилактических курсов химиотерапии рентгеноположительным
Правильность = 3
- 4) Определение активности туберкулеза, "изоляция" контактных по туберкулезу
Правильность = 4
- 5) Химиопрофилактика туберкулеза, противорецидивное лечение, окончание основного курса лечения
Правильность = 100
-

Вопрос № 86

Какие методы приняты для массового профосмотра с целью своевременного выявления туберкулеза среди населения?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Флюорографический, иммунологический, термометрия
Правильность = 1
- 2) Туберкулинодиагностика, исследование мокроты на МБТ методом флотации и посева
Правильность = 2
- 3) Клинический, рентгеноскопический и рентгенографический
Правильность = 3
- 4) Флюорографический, туберкулинодиагностика
Правильность = 100
-

Вопрос № 87

Какие санитарные нормативы площади приняты на одну тубкойку в палате туберкулезного отделения?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) 5 кв. метров
Правильность = 1
- 2) 10 кв. метров
Правильность = 2
- 3) 3,5 кв. метров
Правильность = 3
- 4) 7,5 кв. метров
Правильность = 100
-

Вопрос № 88

Кого в приведенных случаях можно допускать к работе в родильных домах и в детских дошкольных учреждениях?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) При переводе больных туберкулезом во II группу учета
Правильность = 1
- 2) Пациентов III группы диспансерного учета
Правильность = 2

- 3) Больных туберкулезной волчанкой лица и рук
Правильность = 3
- 4) Лиц с остаточными петрифицированными очагами в легких, ранее не состоящих на диспансерном учете
Правильность = 4
- 5) Никто из приведенных случаев не может быть допущен
Правильность = 100
-

Вопрос № 89

Сколько групп учета (включая нулевую) выделено для взрослых пациентов в диспансерной группировке контингентов?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Четыре
Правильность = 1
- 2) Пять
Правильность = 100
- 3) Шесть
Правильность = 2
- 4) Семь
Правильность = 3
- 5) Восемь
Правильность = 4
- 6) Девять
Правильность = 5
-

Вопрос № 90

С какой целью выделена "0" (нулевая) группа диспансерного учета у взрослых?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Для уточнения активности туберкулеза органов дыхания среди лиц, ранее не состоящих на диспансерном учете
Правильность = 50
- 2) Для уточнения активности туберкулеза у пациентов разных групп учета
Правильность = 1
- 3) С целью уточнения активности туберкулеза любой локализации, а также с целью дифференциальной диагностики туберкулеза
Правильность = 100
- 4) С целью дифференциальной диагностики и определения активности туберкулеза у впервые выявленных больных и состоящих в III и IV группах учета
Правильность = 2
-

Вопрос № 91

Кем должна осуществляться организация динамического наблюдения за "рентгенположительными" лицами?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Противотуберкулезными учреждениями

- Правильность = 1
- 2) Сотрудниками рентгенотделений территориальных поликлиник
Правильность = 2
- 3) Участковыми фтизиатрами
Правильность = 3
- 4) Участковыми терапевтами
Правильность = 100
-

Вопрос № 92

Какие контингенты населения из перечисленных составляют группу повышенного риска заболевания туберкулезом легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Лица с остаточными изменениями в легких, плевре и внутригрудных лимфоузлах
Правильность = 1
- 2) Больные сахарным диабетом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, длительно леченные глюкокортикоидными гормонами, пациенты с болезнью оперированного желудка
Правильность = 100
- 3) Курильщики, алкоголики, наркоманы
Правильность = 2
- 4) Лица длительное время работавшие на вредном производстве
Правильность = 3
- 5) Все приведенные контингенты
Правильность = 4
-

Вопрос № 93

Какова периодичность флюорографических профосмотров для большинства обязательных контингентов и групп повышенного риска заболевания туберкулезом и раком легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Не реже одного раза в год
Правильность = 100
- 2) Не реже двух раз в год
Правильность = 1
- 3) Не реже одного раза в два года
Правильность = 2
- 4) Один раз в три года
Правильность = 3
-

Вопрос № 94

Кто из перечисленных контингентов относится к "неорганизованному населению", подлежащему профилактическим флюороосмотрам?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Работники мелких предприятий, куда не выезжают передвижные флюорографические установки
Правильность = 1

- 2) Учащиеся высших и средних учебных заведений
Правильность = 2
- 3) Работающие и учащиеся, не входящие в перечень подлежащих обязательным флюороосмотрам, определенных приказами Минздрава РФ
Правильность = 3
- 4) Неработающие, пенсионеры, инвалиды, иждивенцы
Правильность = 100
-

Вопрос № 95

Какая форма туберкулеза наиболее опасна в эпидемиологическом отношении?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Казеозная пневмония
Правильность = 1
- 2) Милиарный туберкулез
Правильность = 2
- 3) Цирротический туберкулез
Правильность = 3
- 4) Кавернозный туберкулез
Правильность = 4
- 5) Фиброзно-кавернозный туберкулез
Правильность = 100
-

Вопрос № 96

Какие факторы играют наибольшую роль в эпидемиологии туберкулеза в экономически развитых странах?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Иммунологические факторы, "аллергизация" населения
Правильность = 1
- 2) Социальные факторы
Правильность = 100
- 3) Генетические факторы
Правильность = 2
- 4) Степень вирулентности микобактерий туберкулеза
Правильность = 3
-

Вопрос № 97

Какие мероприятия проводятся среди взрослых лиц IV группы диспансерного учета?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Химиопрофилактика
Правильность = 25
- 2) Ревакцинация БЦЖ неинфицированных
Правильность = 25
- 3) Оздоровление очага туберкулезной инфекции
Правильность = 25
- 4) Оздоровление контактных

Правильность = 25

5) Все перечисленные мероприятия

Правильность = 100

Вопрос № 98

В какой группе диспансерного учета наблюдаются больные с внелегочной локализацией туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) В IV

Правильность = 1

2) В VI

Правильность = 2

3) В III

Правильность = 3

4) В V

Правильность = 4

5) В I

Правильность = 100

Вопрос № 99

В какой группе диспансерного учета наблюдаются контактирующие с больными туберкулезом?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) II

Правильность = 1

2) VI

Правильность = 2

3) Взрослые наблюдаются в IV, дети и подростки - в VI группе учета

Правильность = 3

4) IV

Правильность = 100

Вопрос № 100

Кто наблюдается в III группе диспансерного учета взрослых?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Больные с затихающим туберкулезом органов дыхания

Правильность = 1

2) Лица с остаточными изменениями после излечения туберкулеза органов дыхания с повышенным риском его реактивации

Правильность = 2

3) Лица с клиническим излечением туберкулеза органов дыхания

Правильность = 100

Вопрос № 101

Каковы контрольные сроки клинико-рентгенологического и лабораторного обследования в III группе учета взрослых?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Один раз в два месяца
Правильность = 1
 - 2) Один раз в три месяца
Правильность = 2
 - 3) Один раз в полугодие
Правильность = 100
 - 4) Один раз в год
Правильность = 3
-

Вопрос № 102

Какой резервуар инфекции играет основную роль в эпидемиологии туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Больной туберкулезом мелкий рогатый скот
Правильность = 1
 - 2) Больной туберкулезом крупный рогатый скот
Правильность = 2
 - 3) Больные туберкулезом люди
Правильность = 100
 - 4) Больные туберкулезом кошки и собаки
Правильность = 3
-

Вопрос № 103

Сколько в среднем человек за год (по данным ВОЗ) инфицирует один больной открытой формой туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 1-2 человека
Правильность = 1
 - 2) 4-5 человек
Правильность = 100
 - 3) 15-20 человек
Правильность = 2
 - 4) 20-25 человек
Правильность = 3
-

Вопрос № 104

На какой возрастной группе в первую очередь отражаются отрицательные сдвиги в эпидемиологии туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Дети
Правильность = 100

- 2) Подростки
Правильность = 1
- 3) Взрослые
Правильность = 2
- 4) Старики
Правильность = 3
-

Вопрос № 105

В какой стране из перечисленных наиболее высокая заболеваемость туберкулезом?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) В России
Правильность = 1
- 2) В США
Правильность = 2
- 3) В Бразилии
Правильность = 100
- 4) В Нидерландах
Правильность = 3
- 5) В Финляндии
Правильность = 4
-

Вопрос № 106

В какой стране из перечисленных самая низкая заболеваемость туберкулезом?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) В России
Правильность = 1
- 2) В США
Правильность = 2
- 3) В Бразилии
Правильность = 3
- 4) В Нидерландах
Правильность = 100
- 5) В Финляндии
Правильность = 4
-

Вопрос № 107

В какую группу диспансерного учета должен быть взят больной с впервые выявленным фиброзно-кавернозным туберкулезом?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) В IА группу диспансерного наблюдения
Правильность = 100
- 2) В IБ группу диспансерного наблюдения
Правильность = 1
- 3) С распространенным процессом - в I-Б группу учета, а с ограниченным процессом - в I-А группу учета

- Правильность = 2
4) Во II группу учета
Правильность = 3
-

Вопрос № 108

Каков удельный вес фиброзно-кавернозного туберкулеза в структуре контингентов больных туберкулезом органов дыхания?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 1- 2%
Правильность = 1
2) 3- 5%
Правильность = 2
3) 25-30%
Правильность = 3
4) 10-20%
Правильность = 100
5) 0,1-0,5%
Правильность = 4
-

Вопрос № 109

Каков удельный вес фиброзно-кавернозного туберкулеза в структуре заболеваемости туберкулезом легких в России?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Около 0,1-0,5%
Правильность = 1
2) Около 2-3%
Правильность = 100
3) Около 5-6%
Правильность = 2
4) 7-10%
Правильность = 3
5) 11-20%
Правильность = 4
-

Вопрос № 110

В какой диспансерной группе должны наблюдаться дети с ранней тубинтоксикацией?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) В первой группе
Правильность = 100
2) В нулевой
Правильность = 1
3) Во II группе
Правильность = 2
4) В III группе
Правильность = 3

Вопрос № 111

Какова доля диссеминированного туберкулеза среди впервые выявленных больных?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) 1 - 2%

Правильность = 1

2) 10 - 12%

Правильность = 100

3) 15 - 25%

Правильность = 2

4) 30 - 40%

Правильность = 3

Вопрос № 112

Какие фазы процесса в клинической классификации туберкулеза характеризуют затихание активного туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Рассасывание, уплотнение, рубцевание, обызвествление

Правильность = 100

2) Рубцевание, уплотнение, обызвествление, кальцинация

Правильность = 1

3) Инфильтрация, рассасывание, рубцевание, обызвествление

Правильность = 2

Вопрос № 113

Какова доля диссеминированного туберкулеза среди контингентов, состоящих на диспансерном учете?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) 1% - 2%

Правильность = 1

2) 8% - 10%

Правильность = 2

3) 15% - 18%

Правильность = 100

4) 25% - 35%

Правильность = 3

Вопрос № 114

С какой профессией больной фиброзно-кавернозным туберкулезом может быть допущен к прежней работе?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Преподаватель в ПТУ

- Правильность = 1
- 2) Преподаватель кафедры усовершенствования врачей
Правильность = 100
- 3) Стоматолог в туберкулезной больнице
Правильность = 2
- 4) Водитель такси
Правильность = 3
- 5) Экспедитор по заготовке сельхозпродуктов
Правильность = 4
- 6) Со всеми перечисленными профессиями
Правильность = 5
-

Вопрос № 115

Каков срок годности туберкулина с 2 ТЕ?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 1 год
Правильность = 100
- 2) 2 года
Правильность = 1
- 3) 6 месяцев
Правильность = 2
- 4) 1 месяц
Правильность = 3
-

Вопрос № 116

В какую группу учета из I группы переводятся дети и подростки после окончания основного курса лечения по поводу тубинтоксикации?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) В III-A
Правильность = 1
- 2) В III-B
Правильность = 100
- 3) Во II
Правильность = 2
- 4) В VI-A
Правильность = 3
- 5) В VI-B
Правильность = 4
-

Вопрос № 117

Каковы основные критерии оценки эффективности работы с контингентами четвертой группы учета?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Отсутствие случаев заболевания туберкулезом
Правильность = 100

- 2) Процент охвата ревакцинацией БЦЖ
Правильность = 1
 - 3) Полнота охвата химиопрофилактикой
Правильность = 2
 - 4) Отсутствие случаев рецидива туберкулеза
Правильность = 3
-

Вопрос № 118

Кто из перечисленных профессий может быть допущен к прежней работе после успешного лечения туберкулеза и перевода в III группу учета?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Медперсонал домов отдыха и санаториев для взрослых
Правильность = 1
 - 2) Преподаватели профтехучилища
Правильность = 2
 - 3) Работники спортивных школ
Правильность = 3
 - 4) Все перечисленные работники
Правильность = 100
-

Вопрос № 119

О чем в основном свидетельствует высокий интенсивный показатель умерших от активного туберкулеза до одного года учета в тубдиспансере?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) О патоморфозе туберкулеза в современных условиях
Правильность = 1
 - 2) О неудовлетворительной работе по раннему выявлению туберкулеза
Правильность = 100
 - 3) О низком охвате населения флюорографическими профосмотрами
Правильность = 2
 - 4) О низкой эффективности стационарного лечения больных туберкулезом
Правильность = 3
-

Вопрос № 120

Какой продолжительности должна быть изоляция новорожденного ребенка из очага тубинфекции после проведения ему вакцинации БЦЖ?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 4-7 дней
Правильность = 1
- 2) 1 месяц
Правильность = 2
- 3) 2,5-3 месяца
Правильность = 3
- 4) 1,5-2 месяца
Правильность = 100

5) 3-4 месяца
Правильность = 4

Вопрос № 121

В какой группе учета должен наблюдаться больной с рецидивом фиброзно-кавернозного туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) В I-A группе
Правильность = 1
 - 2) Во II группе
Правильность = 2
 - 3) В III группе
Правильность = 3
 - 4) В I-B группе
Правильность = 100
-

Вопрос № 122

На сколько коек в отделении для лечения больных костно-суставным туберкулезом должна планироваться 1 ставка врача-ординатора (ортопеда)?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) На 12
Правильность = 1
 - 2) На 15
Правильность = 2
 - 3) На 25-30
Правильность = 3
 - 4) На 40
Правильность = 100
-

Вопрос № 123

На сколько коек в отделении для лечения больных урогенитальным туберкулезом должна планироваться 1 ставка врача-ординатора (уролог, гинеколог)?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) 25-30
Правильность = 1
 - 2) 12
Правильность = 2
 - 3) 40
Правильность = 3
 - 4) 20
Правильность = 100
-

Вопрос № 124

На сколько коек в легочно-хирургическом отделении должна планироваться 1 ставка врача-ординатора (фтизиохирурга)?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) 5-7
Правильность = 1
 - 2) 12
Правильность = 100
 - 3) 20
Правильность = 2
 - 4) 25-30
Правильность = 3
 - 5) 40
Правильность = 4
-

Вопрос № 125

В каком объеме должен выполнять работу по непосредственному ведению больных зав. фтизиатерапевтическим отделением на 79 коек

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Должен быть освобожденный заведующий
Правильность = 1
 - 2) 100%
Правильность = 2
 - 3) 75%
Правильность = 100
 - 4) 50%
Правильность = 3
 - 5) 25%
Правильность = 4
-

Вопрос № 126

В каком объеме должен выполнять работу по непосредственному ведению больных зав. физиотерапевтическим отделением на 80 коек

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Должен быть освобожденный заведующий
Правильность = 1
 - 2) 100%
Правильность = 2
 - 3) 75%
Правильность = 3
 - 4) 50%
Правильность = 4
 - 5) 25%
Правильность = 100
-

Вопрос № 127

На какой срок выдается доплатной больничный лист?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Не более 10 дней
Правильность = 1
 - 2) Не более 1 месяца
Правильность = 2
 - 3) Не более 2 месяцев
Правильность = 100
 - 4) Не более 3 месяцев
Правильность = 3
-

Вопрос № 128

На каком этапе обработки изделий медицинского назначения используется дезсредство сайдезим?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Дезинфекция
Правильность = 1
 - 2) Предстерилизационная очистка
Правильность = 100
 - 3) Стерилизация
Правильность = 2
-

Вопрос № 129

Какое из перечисленных средств совмещает два этапа обработки: дезинфекцию и предстерилизационную очистку изделий медицинского назначения?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Лизафин
Правильность = 100
 - 2) Пюржавель
Правильность = 1
 - 3) Амоцид
Правильность = 2
 - 4) Гипохлорид кальция
Правильность = 3
 - 5) Все перечисленные
Правильность = 4
-

Вопрос № 130

Какое средство из перечисленных применяется одновременно для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Лизафин
Правильность = 1

- 2) Велтолен
Правильность = 2
 - 3) Амоцид
Правильность = 3
 - 4) Делансаль
Правильность = 100
-

Вопрос № 131

Какие больные должны наблюдаться в I-Б группе диспансерного учета?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Больные активным туберкулезом органов дыхания
Правильность = 1
 - 2) Больные с хроническим течением туберкулеза
Правильность = 2
 - 3) Больные с рецидивами туберкулеза
Правильность = 100
 - 4) Лица с большими остаточными изменениями после перенесенного туберкулеза
Правильность = 3
-

Вопрос № 132

Какие больные должны наблюдаться во II группе диспансерного учета?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Больные с туберкулезом затихающей активности
Правильность = 1
 - 2) Больные с рецидивами туберкулеза
Правильность = 2
 - 3) Больные с хроническим течением туберкулеза
Правильность = 100
-

Тема 3. Клинические формы туберкулеза, диагностика, дифференциальная диагностика туберкулеза и сходной патологии

Вопрос № 1

Как можно подразделить туберкулезный плеврит по патогенезу поражения плевры?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Аллергический, перифокальный и туберкулез плевры
Правильность = 100
 - 2) Сухой и экссудативный
Правильность = 1
 - 3) Травматический и идиопатический
Правильность = 2
 - 4) Лекарственный и инфекционный
Правильность = 3
 - 5) Наддиафрагмальный, междолевой и перикостальный
Правильность = 4
-

Вопрос № 2

Признаки какого синдрома выявляются чаще при исследовании функции внешнего дыхания у больных экссудативным плевритом?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Обструктивного
Правильность = 1
 - 2) Обструктивного с явлениями бронхоспазма
Правильность = 2
 - 3) Смешанного с преобладанием спастического
Правильность = 3
 - 4) Синдрома обструкции дистальных бронхов
Правильность = 4
 - 5) Рестриктивного
Правильность = 100
-

Вопрос № 3

Как называется прозрачный, светло-желтого цвета с нитями фибрина экссудат?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Гнойный
Правильность = 1
- 2) Геморрагический
Правильность = 2
- 3) Хилезный
Правильность = 3
- 4) Гнойно-геморрагический
Правильность = 4
- 5) Серозный
Правильность = 100

Вопрос № 4

Как называется гематогенное распространение микобактерий в плевру с образованием на ее поверхности бугорковых высыпаний и экссудата в плевральной полости?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Эмпиемой плевры
Правильность = 1
 - 2) Туберкулезом плевры
Правильность = 100
 - 3) Плевральными спайками
Правильность = 2
 - 4) Гидропневмотораксом
Правильность = 3
 - 5) Аллергическим плевритом
Правильность = 4
-

Вопрос № 5

Какой слой каверны наиболее выражен при фиброзно-кавернозном туберкулезе?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Казеозно-некротический
Правильность = 1
 - 2) Грануляционный
Правильность = 2
 - 3) Фиброзный
Правильность = 100
-

Вопрос № 6

Какой клинико-рентгенологический вариант инфильтративного туберкулёза лёгких встречается наиболее часто?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Облаковидный инфильтрат
Правильность = 1
 - 2) Бронхолюбулярный инфильтрат
Правильность = 100
 - 3) Перисциссурит
Правильность = 2
 - 4) Лобит
Правильность = 3
 - 5) Округлый инфильтрат
Правильность = 4
-

Вопрос № 7

При какой болезни частота присоединения туберкулеза достигает 70-80%?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Саркоидоз I стадии
Правильность = 1
 - 2) Силикоз I стадии
Правильность = 2
 - 3) Саркоидоз III стадии
Правильность = 3
 - 4) Силикоз II стадии
Правильность = 20
 - 5) Силикоз III стадии
Правильность = 100
-

Вопрос № 8

Как называется звук разлипания альвеол на высоте вдоха?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Влажные мелкопузырчатые хрипы
Правильность = 1
 - 2) Шум трения плевры
Правильность = 2
 - 3) Бронхофония
Правильность = 3
 - 4) Крупнопузырчатые хрипы
Правильность = 4
 - 5) Крепитация
Правильность = 100
-

Вопрос № 9

Как называется регистрация легочных объемов?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Тонометрия
Правильность = 1
 - 2) Зонография
Правильность = 2
 - 3) Пневмотахометрия
Правильность = 3
 - 4) Спирография
Правильность = 100
-

Вопрос № 10

Что подразумевается под симптомом Воробьева-Поттенджера?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Онемение пальцев рук, особенно в холодную погоду
Правильность = 1
- 2) Телеангиоэктазии на передней поверхности грудной клетки

- Правильность = 2
- 3) Выслушивание свистящих хрипов на выдохе
Правильность = 3
- 4) Амфорическое дыхание
Правильность = 4
- 5) Ригидность и болезненность мышц верхнего плечевого пояса
Правильность = 100
-

Вопрос № 11

Какой метод обеспечивает изображение поперечных слоев человеческого тела?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Крупнокадровая флюорография
Правильность = 1
- 2) Фибробронхоскопия
Правильность = 2
- 3) Селективная бронхография
Правильность = 3
- 4) Компьютерная томография
Правильность = 100
-

Вопрос № 12

Какие симптомы характерны для туберкулезной интоксикации?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Иктеричность склер, кожный зуд, бесцветный стул
Правильность = 1
- 2) Отеки и пастозность лица, анурия, боли в пояснице
Правильность = 2
- 3) Катастрофическое похудание, боль в груди, диаррея
Правильность = 3
- 4) Отечность, сонливость, снижение памяти, апатия
Правильность = 4
- 5) Слабость, потливость, похудание, возбудимость, астения
Правильность = 100
-

Вопрос № 13

Как называется контрастное рентгеновское изображение бронхов?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Томограммой
Правильность = 1
- 2) Зонограммой
Правильность = 2
- 3) Сцинтиграммой
Правильность = 3
- 4) Реограммой
Правильность = 4

5) Бронхограммой
Правильность = 100

Вопрос № 14

С помощью какого метода может быть получено рентгеновское изображение на бумаге?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Электрорентгенографии
Правильность = 100
 - 2) Бронхографии
Правильность = 1
 - 3) Компьютерной томографии
Правильность = 2
 - 4) Зонографии
Правильность = 3
 - 5) Реопульмонографии
Правильность = 4
-

Вопрос № 15

С какой целью проводится индивидуальная туберкулинодиагностика?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Отбор на ревакцинацию БЦЖ
Правильность = 1
 - 2) Определение риска инфицирования туберкулезом
Правильность = 2
 - 3) Создание специфического иммунитета против туберкулеза
Правильность = 3
 - 4) Определение активности туберкулеза, дифференциальная диагностика
Правильность = 100
-

Вопрос № 16

Какая проба используется для массовой туберкулинодиагностики в России?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Проба Коха с 10 ТЕ ППД-Л
Правильность = 1
 - 2) Проба Квейма
Правильность = 2
 - 3) Проба Пирке в модификации Карпиловского-Гринчара
Правильность = 3
 - 4) Проба Манту в 2 ТЕ ППД-Л
Правильность = 100
 - 5) Проба Манту со вторым разведением АТК
Правильность = 4
-

Вопрос № 17

Какие разведения или концентрации туберкулина используют для проведения градуированной пробы Пирке?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Первое, пятое и десятое разведения
Правильность = 1
 - 2) Пятое, десятое и пятидесятое разведения
Правильность = 2
 - 3) 50%, 10% и 5%
Правильность = 3
 - 4) 100%, 25% 5% и 1%
Правильность = 100
-

Вопрос № 18

Какая реакция на пробу Манту с 2 ТЕ у взрослых считается положительной?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Папула диаметром 5-21 мм
Правильность = 100
 - 2) Папула диаметром 3-25 мм
Правильность = 1
 - 3) Гиперемия диаметром более 5 мм
Правильность = 2
 - 4) Гиперемия диаметром более 21 мм
Правильность = 3
 - 5) Папула диаметром до 5 мм
Правильность = 4
-

Вопрос № 19

Чем обычно отличается физикальная картина легочного туберкулеза от неспецифического воспаления легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Скудностью феноменов
Правильность = 100
 - 2) Яркой выраженностью феноменов
Правильность = 1
 - 3) Быстрой динамикой феноменов
Правильность = 2
 - 4) Полным отсутствием феноменов
Правильность = 3
 - 5) Быстрой сменой локализации феноменов
Правильность = 4
-

Вопрос № 20

Чем обычно характеризуется лейкоформула крови у больных активным туберкулезом легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Нормальными соотношениями лейкоцитов
Правильность = 1
 - 2) Моноцитопенией, лимфоцитозом, эозинофилией и базофилией
Правильность = 2
 - 3) Палочкоядерным сдвигом, лимфоцитозом, эозинофилией
Правильность = 3
 - 4) Моноцитозом, эозинопенией, лимфоцитозом, базофилией
Правильность = 4
 - 5) Лимфопенией, палочкоядерным сдвигом и моноцитозом
Правильность = 100
-

Вопрос № 21

Как принято оценивать жесткость рентгенограммы органов грудной клетки в прямой проекции?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) По тени купола диафрагмы
Правильность = 1
 - 2) По тени трахеи на фоне тени грудины
Правильность = 2
 - 3) По теням лопаток на фоне мягких тканей
Правильность = 3
 - 4) По теням мягких тканей
Правильность = 4
 - 5) По теням позвонков на фоне сердечно-сосудистого пучка
Правильность = 100
-

Вопрос № 22

Что подразумевается под ревматоидом Понсе?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Туберкулезное поражение крупных суставов
Правильность = 1
 - 2) Туберкулезное поражение мелких суставов
Правильность = 2
 - 3) Скрыто протекающий ревматизм у больного туберкулезом
Правильность = 3
 - 4) Токсико-аллергический артрит, вызванный туберкулоэпителиомами
Правильность = 4
 - 5) Суставная параспецифическая реакция тубэтиологии
Правильность = 100
-

Вопрос № 23

Как называется симптом притупления перкуторного звука ниже первого грудного позвонка при перкуссии по позвоночнику ребенка?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Симптом Воробьева-Поттенджера
Правильность = 1
 - 2) Симптом Брудзинского
Правильность = 2
 - 3) Симптом Кернига
Правильность = 3
 - 4) Симптом Бехтерева
Правильность = 4
 - 5) Симптом Корани
Правильность = 100
-

Вопрос № 24

При какой форме коллагеноза чаще развивается гипертензия в малом круге кровообращения?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Склеродермия
Правильность = 1
 - 2) Системная красная волчанка
Правильность = 2
 - 3) Дерматомиозит
Правильность = 3
 - 4) Узелковый периартериит
Правильность = 100
-

Вопрос № 25

Что кроме анамнеза является определяющим в постановке диагноза туберкулезной интоксикации у детей и подростков?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Бактериологическое исследование мокроты
Правильность = 1
 - 2) Тщательное физикальное обследование
Правильность = 2
 - 3) Развернутое функциональное исследование дыхания
Правильность = 2
 - 4) Радиоизотопное исследование легких
Правильность = 3
 - 5) Результаты туберкулинодиагностики
Правильность = 100
-

Вопрос № 26

Какова доля туберкулезного плеврита среди впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 10 - 15%

- Правильность = 1
2) 1 - 2%
Правильность = 2
3) 20 - 25%
Правильность = 3
4) 3 - 7%
Правильность = 100
-

Вопрос № 27

Какой рентгенологический признак является наиболее важным симптомом фиброзно-кавернозного туберкулеза помимо признаков каверны?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Симптом "аркад"
Правильность = 1
2) Наличие плевральных спаек
Правильность = 2
3) Выбухание и уплотнение дуги аорты
Правильность = 3
4) Свежие бронхогенные очаги отсевов
Правильность = 4
5) Уменьшение пораженного легкого в объеме
Правильность = 100
-

Вопрос № 28

Как называется рентгенологическое исследование легочной артерии и ее ветвей?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Спирографией
Правильность = 1
2) Фистулографией
Правильность = 2
3) Реопульмонографией
Правильность = 3
4) Ангиопульмонографией
Правильность = 100
-

Вопрос № 29

Какой метод лучевой диагностики является наиболее информативным для диагностики очаговых теней в легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Флюорография
Правильность = 1
2) Рентгеноскопия
Правильность = 2
3) Электрорентгенография
Правильность = 3

- 4) Латерография
Правильность = 4
- 5) Рентгенография с томографией
Правильность = 100
-

Вопрос № 30

В каких сегментах легких наиболее часто локализуется туберкулез у взрослых?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) В 3, 7 и 10 сегментах
Правильность = 1
- 2) В язычковых сегментах
Правильность = 2
- 3) В базальных сегментах
Правильность = 3
- 4) В 3, 7 и 9 сегментах
Правильность = 4
- 5) В 1, 2 и 6 сегментах
Правильность = 100
-

Вопрос № 31

С помощью какого метода можно увидеть и измерить размеры камер сердца и оценить состояние клапанов сердца?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Электрокардиография
Правильность = 1
- 2) Пневмовентрикулография
Правильность = 2
- 3) Реокардиография
Правильность = 3
- 4) Кинетокардиография
Правильность = 4
- 5) Эхокардиография
Правильность = 100
-

Вопрос № 32

Какая форма первичного туберкулеза самая ранняя?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Первичный туберкулезный комплекс
Правильность = 1
- 2) Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов
Правильность = 2
- 3) Диссеминированный острый милиарный туберкулез
Правильность = 3
- 4) Туберкулезный менингоэнцефалит
Правильность = 4

5) Туберкулезная интоксикация детей и подростков
Правильность = 100

Вопрос № 33

Какое суждение о роли хирургических методов в лечении первичных форм туберкулеза органов дыхания является наиболее правильным?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Малоприемлемы, так как дают высокий процент реактиваций
Правильность = 100
 - 2) Перспективны с момента постановки диагноза
Правильность = 1
 - 3) Возможны только через 3-4 месяца интенсивной химиотерапии
Правильность = 2
 - 4) Являются альтернативой длительной химиотерапии
Правильность = 3
 - 5) Рациональны под защитой преднизолона
Правильность = 4
-

Вопрос № 34

Какие изменения электрокардиограммы наиболее часто выявляются у больных туберкулезом второй группы учета?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Признаки гипертрофии левых отделов сердца
Правильность = 1
 - 2) Блокада левой ножки пучка Гиса
Правильность = 2
 - 3) Пароксизмальная тахикардия
Правильность = 3
 - 4) Признаки гипертрофии правых отделов сердца
Правильность = 100
-

Вопрос № 35

Где чаще локализуется туберкулез бронха у больных деструктивным туберкулезом?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) В верхнедолевом бронхе справа
Правильность = 1
 - 2) В сегментарных бронхах левой верхней доли
Правильность = 2
 - 3) В промежуточном бронхе и в области бифуркации трахеи
Правильность = 3
 - 4) В нижнедолевых бронхах с обеих сторон
Правильность = 4
 - 5) На стороне прогрессирующей каверны
Правильность = 100
-

Вопрос № 36

Какой рентгенологический признак патогномичен для туберкулеза бронхов?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Выбухание стенки бронха
Правильность = 1
 - 2) Наличие лимфожелезистой каверны
Правильность = 2
 - 3) Прерывистость внутреннего контура бронха на отдельных участках
Правильность = 50
 - 4) Изменение толщины стенок бронха и ширины его просвета
Правильность = 100
-

Вопрос № 37

Возможно ли формирование кавернозного туберкулеза из фиброзно-кавернозного?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Возможно
Правильность = 1
 - 2) Невозможно
Правильность = 100
 - 3) Возможно только у больных молодого возраста
Правильность = 2
-

Вопрос № 38

Какой вид туберкулезных свищей чаще выявляется бронхоскопически?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Бронхоплевральный
Правильность = 1
 - 2) Лимфобронхиальный
Правильность = 100
 - 3) Оба вида одинаково часто
Правильность = 2
-

Вопрос № 39

При каких формах туберкулеза органов дыхания наиболее часто развивается туберкулез трахеи и бронхов?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Инфильтративный туберкулез
Правильность = 1
- 2) Очаговый туберкулез
Правильность = 2
- 3) Кавернозный туберкулез, туберкулема
Правильность = 3

- 4) Диссеминированный туберкулез
Правильность = 4
- 5) Первичные формы туберкулеза
Правильность = 100
-

Вопрос № 40

Какова частота туберкулеза трахеи и бронхов среди больных I и II групп учета?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) 0,1-0,5%
Правильность = 1
- 2) 15-25%
Правильность = 2
- 3) 5-10%
Правильность = 100
-

Вопрос № 41

Из какой формы не может сформироваться кавернозный туберкулез легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Из первичного туберкулезного комплекса
Правильность = 1
- 2) Из инфильтративного туберкулеза
Правильность = 2
- 3) Из туберкулемы
Правильность = 3
- 4) Из очагового туберкулеза
Правильность = 4
- 5) Из цирротического туберкулеза легких
Правильность = 100
-

Вопрос № 42

Какая клиническая форма туберкулеза органов дыхания чаще осложняется свищевой формой туберкулеза бронха?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Цирротическая
Правильность = 1
- 2) Инфильтративная
Правильность = 2
- 3) Диссеминированная
Правильность = 3
- 4) Фиброзно-кавернозная
Правильность = 50
- 5) Туберкулез внутригрудных лимфоузлов
Правильность = 100
-

Вопрос № 43

Каков удельный вес кавернозного туберкулеза легких в структуре заболеваемости туберкулезом?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) 3-5%

Правильность = 1

2) 7-15%

Правильность = 2

3) 30-40%

Правильность = 3

4) До 1%

Правильность = 100

Вопрос № 44

Какой клинический синдром преобладает у больных туберкулезом бронхов?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

1) Интоксикационный

Правильность = 1

2) Оба синдрома одинаково выражены

Правильность = 2

3) Бронхо-легочно-плевральный

Правильность = 100

Вопрос № 45

Какова основная причина развития кавернозного туберкулеза легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Несвоевременное выявление

Правильность = 1

2) Неполноценное лечение больных с рецидивом туберкулеза

Правильность = 2

3) Лекарственная устойчивость

Правильность = 3

4) Неэффективное лечение больных с впервые выявленным туберкулезом в фазе распада

Правильность = 100

Вопрос № 46

Какой симптом наиболее патогномичен для туберкулеза бронхов?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Откашливание петрификатов

Правильность = 1

2) Выделение гнойной мокроты по утрам "полным ртом"

Правильность = 2

- 3) Раздутая каверна
Правильность = 3
- 4) Боли в груди, одышка
Правильность = 4
- 5) Кашель
Правильность = 100
-

Вопрос № 47

Из какой формы туберкулеза чаще развивается кавернозный туберкулез легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Очаговый туберкулез легких
Правильность = 1
- 2) Диссеминированный туберкулез в фазе распада
Правильность = 2
- 3) Туберкулема в фазе распада
Правильность = 3
- 4) Первичный туберкулезный комплекс в фазе распада
Правильность = 4
- 5) Инфильтративный туберкулез в фазе распада
Правильность = 100
-

Вопрос № 48

В каких сегментах легких наиболее часто локализуется туберкулёз?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 1,2,3
Правильность = 1
- 2) 2,3,10
Правильность = 2
- 3) Базальные сегменты
Правильность = 3
- 4) 1,2,6
Правильность = 100
- 5) 2,3,5
Правильность = 4
-

Вопрос № 49

Как часто выявляется туберкулез верхних дыхательных путей у больных туберкулезом органов дыхания?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) 3- 5%
Правильность = 1
- 2) 6-10%
Правильность = 2
- 3) До 1%
Правильность = 100

Вопрос № 50

Какой способ рентгенологического исследования подтверждает наличие свободной жидкости в плевральной полости?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Обзорная рентгенограмма в боковой проекции
Правильность = 1
 - 2) Исследование больного на трохоскопе
Правильность = 2
 - 3) Обзорная рентгенограмма грудной клетки в прямой проекции
Правильность = 3
 - 4) Рентгенограмма в латеропозиции
Правильность = 100
-

Вопрос № 51

Какова степень выраженности бронхо-плевро-легочного синдрома у больных кавернозным туберкулезом?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Резко выраженная
Правильность = 1
 - 2) Выявленная всегда
Правильность = 2
 - 3) Отсутствует всегда
Правильность = 3
 - 4) Слабо выраженная
Правильность = 100
-

Вопрос № 52

Наиболее часто встречающийся симптом бронхо-плевро-легочного синдрома?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Незначительный малопродуктивный кашель
Правильность = 1
 - 2) Кровохарканье
Правильность = 2
 - 3) Слабость
Правильность = 3
 - 4) Снижение аппетита
Правильность = 4
 - 5) Боли в грудной клетке, кашель
Правильность = 100
-

Вопрос № 53

Какова отличительная особенность патогенеза инфильтративного туберкулёза легких от других вторичных форм туберкулёза?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Заболевание развивается на фоне гиперчувствительности ткани легкого к возбудителю
Правильность = 100
 - 2) Заболевание развивается на фоне лейкоцитоза и анемии
Правильность = 1
 - 3) Заболевание развивается на фоне гипосенсибилизации ткани легкого к возбудителю
Правильность = 2
 - 4) Заболевание развивается на фоне общей гиперсенсибилизации
Правильность = 3
-

Вопрос № 54

Где чаще образуются очаги отсева при локализации инфильтративного туберкулёза с распадом в С1-2 левого легкого?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) С6-10 слева
Правильность = 1
 - 2) Базальные сегменты слева
Правильность = 2
 - 3) С4-5 слева
Правильность = 100
 - 4) Базальные сегменты справа
Правильность = 3
 - 5) С4-5 справа
Правильность = 4
-

Вопрос № 55

Какие патологические признаки обычно выявляются при внешнем осмотре больного кавернозным туберкулезом легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Уплотнение грудной клетки на стороне поражения
Правильность = 1
 - 2) Отставание грудной клетки на стороне поражения
Правильность = 2
 - 3) Обычно не выявляются
Правильность = 100
-

Вопрос № 56

Какое дополнительное исследование необходимо в первую очередь произвести при выявлении туберкулеза гортани?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Туберкулиновые пробы Манту и Коха
Правильность = 1
- 2) Томографию гортани

- Правильность = 2
- 3) Фибробронхоскопию для исключения туберкулеза бронхов
Правильность = 3
- 4) Бактериологическое исследование на МБТ материала с гортани
Правильность = 30
- 5) Рентгенографию органов грудной клетки
Правильность = 100
-

Вопрос № 57

В каких сегментах легких чаще локализуется легочный компонент при первичном туберкулезном комплексе?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Первый и второй сегменты
Правильность = 1
- 2) Шестой сегмент
Правильность = 2
- 3) Третий сегмент
Правильность = 100
- 4) Базальные сегменты
Правильность = 3
-

Вопрос № 58

Где чаще образуются очаги отсева при локализации инфильтративного туберкулёза с распадом в С1-2 правого легкого?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Базальные сегменты слева
Правильность = 100
- 2) С6-10 справа
Правильность = 1
- 3) Базальные сегменты справа
Правильность = 2
- 4) С4-5 слева
Правильность = 3
- 5) С4-5 справа
Правильность = 4
- 6) С1-2 слева
Правильность = 5
-

Вопрос № 59

Наиболее частая локализация туберкулеза верхних дыхательных путей?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Туберкулез носа
Правильность = 1
- 2) Туберкулез небной занавески
Правильность = 2

- 3) Туберкулез носоглотки
Правильность = 3
- 4) Туберкулез гортани
Правильность = 100
-

Вопрос № 60

Какова степень выраженности интоксикационного синдрома у больных кавернозным туберкулезом легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Отсутствует всегда
Правильность = 1
- 2) Выраженная
Правильность = 2
- 3) Резко выраженная
Правильность = 3
- 4) Слабо выраженная
Правильность = 100
-

Вопрос № 61

Какой синдром преобладает у больных с кавернозной формой туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Интоксикационный
Правильность = 1
- 2) Выражены в одинаковой степени
Правильность = 2
- 3) Бронхо-плевро-легочный
Правильность = 100
-

Вопрос № 62

Возможно ли бессимптомное течение туберкулеза гортани в современных условиях?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Да
Правильность = 1
- 2) Нет
Правильность = 100
-

Вопрос № 63

Какое количество клеток умноженное на 10 в шестой степени в 1 литре ликвора у здоровых людей?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) от 20 до 100 клеток
Правильность = 1

- 2) от 100 до 500 клеток
Правильность = 2
- 3) от 1 до 5 клеток
Правильность = 20
- 4) от 5 до 12 клеток
Правильность = 100
-

Вопрос № 64

Какое давление ликвора чаще бывает при тубменингите?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Неустойчивое
Правильность = 3
- 2) Сниженное
Правильность = 1
- 3) В пределах нормы
Правильность = 2
- 4) Повышенное
Правильность = 100
-

Вопрос № 65

Какие формы туберкулезного менингита выделяют?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Серозный, базальный, менингоэнцефалит, спинальная форма
Правильность = 1
- 2) Серозный конвекситальный, менингоэнцефаломенингит
Правильность = 2
- 3) Конвекситальный, хронический, менингоэнцефаломиелит
Правильность = 3
- 4) Базальный, менингоэнцефалит, менингоэнцефаломиелит
Правильность = 100
-

Вопрос № 66

Какое количество клеток умноженное на 10 в шестой степени в 1 литре ликвора характерно для больных тубменингитом?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) от 1 до 5 клеток
Правильность = 1
- 2) от 5 до 12 клеток
Правильность = 2
- 3) от 500 до 2000 клеток
Правильность = 3
- 4) Одинаково вероятен любой ответ
Правильность = 4
- 5) от 20 до сотен клеток
Правильность = 100

Вопрос № 67

К какому этапу эволюции туберкулезной полости можно отнести кавернозную форму туберкулеза легких?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Предкаверне
Правильность = 1
 - 2) Заключительному
Правильность = 2
 - 3) Промежуточному
Правильность = 100
-

Вопрос № 68

Какое определение кавернозного туберкулеза легких наиболее полное и правильное?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Несвоевременно выявленный деструктивный туберкулез легких, ограниченной протяженности, без выраженной инфильтрации и плевральных наслоений
Правильность = 1
 - 2) Фаза распада без выраженной инфильтрации, очагов и без явных признаков предыдущей формы туберкулеза, протяженностью не более трех сегментов
Правильность = 2
 - 3) Деструктивная форма туберкулеза легких, при которой отсутствуют признаки исходной формы туберкулеза и очаги бронхогенного обсеменения
Правильность = 3
 - 4) Форма ограниченной протяженности, характеризующаяся наличием относительно стабильной сформированной каверны без выраженной инфильтрации очагов и фиброза в окружающей легочной ткани
Правильность = 100
-

Вопрос № 69

Какая форма туберкулеза чаще всего предшествует тубменингиту у взрослых людей?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Очаговый туберкулез
Правильность = 1
 - 2) Инфильтративный туберкулез
Правильность = 2
 - 3) Диссеминированный туберкулез
Правильность = 100
 - 4) Внелегочные формы
Правильность = 3
 - 5) Кавернозный туберкулез
Правильность = 4
-

Вопрос № 70

Какой вид клеток в ликворе обычно преобладает в первые дни остро развившегося тубменингита у детей раннего возраста?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Лимфоциты
Правильность = 1
 - 2) Моноциты
Правильность = 2
 - 3) Макрофаги
Правильность = 3
 - 4) Клетки Пирогова-Лангханса
Правильность = 4
 - 5) Нейтрофилы
Правильность = 100
-

Вопрос № 71

Какая концентрация сахара и хлоридов в спинномозговой жидкости наиболее характерна для тубменингита?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Нормальное содержание сахара и хлоридов
Правильность = 1
 - 2) Повышенное содержание сахара и хлоридов
Правильность = 2
 - 3) Пониженное содержание сахара и повышение концентрации хлоридов
Правильность = 3
 - 4) Повышение концентрации сахара и понижение хлоридов
Правильность = 4
 - 5) Пониженное содержание сахара и реже хлоридов
Правильность = 100
-

Вопрос № 72

Какова концентрация белка в спинномозговой жидкости у здоровых людей?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) до 0,1 г/л
Правильность = 1
 - 2) 0,1-0,4 г/л
Правильность = 100
 - 3) 0,5-0,6 г/л
Правильность = 2
 - 4) 0,6-0,9 г/л
Правильность = 3
-

Вопрос № 73

Какое количество клеток в 1 литре ликвора умноженное на 10 в шестой степени характерно для стафилококкового лептоменингита?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) от 20 до 100 клеток
Правильность = 1
 - 2) от 100 до 500 клеток
Правильность = 2
 - 3) от 500 до 1000 клеток
Правильность = 3
 - 4) от тысяч до десятков тысяч клеток
Правильность = 100
-

Вопрос № 74

При какой патологии чаще увеличиваются поперечные размеры одного корня легкого?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Застой в малом круге кровообращения любой этиологии
Правильность = 1
 - 2) Аденопатия системная
Правильность = 2
 - 3) Центральный венозный застой
Правильность = 3
 - 4) Туберкулез
Правильность = 100
 - 5) Саркоидоз
Правильность = 4
 - 6) Метастатический периферический рак
Правильность = 5
-

Вопрос № 75

Какие рентгенологические признаки синдрома патологически измененного корня наиболее важные?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Увеличение размеров корня, деформация его тени, повышение ее интенсивности и нарушение структуры корня
Правильность = 100
 - 2) Расширение ветвей легочной артерии
Правильность = 1
 - 3) Асимметричность корней, воспалительная или опухолевая инфильтрация клетчатки, сужение проекции главного бронха
Правильность = 2
 - 4) Увеличение размеров сосудов и лимфатических узлов, перибронхит, лимфангоит
Правильность = 3
-

Вопрос № 76

Что используется в качестве эталона при отнесении пятнистых теней к очагам максимальной интенсивности (кальцинатам)?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Поперечное сечение сосудов
Правильность = 50
 - 2) Продольное сечение сосудов
Правильность = 2
 - 3) Тени грудины и лопатки
Правильность = 3
 - 4) Кортикальный слой близлежащего ребра
Правильность = 100
-

Вопрос № 77

При какой патологии чаще наблюдаются нечеткие контуры корня легкого?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Туберкулез внутригрудных лимфоузлов
Правильность = 100
 - 2) Хроническая пневмония
Правильность = 1
 - 3) Силикоз
Правильность = 2
 - 4) Врожденные пороки сердца
Правильность = 3
 - 5) Центральный рак
Правильность = 4
-

Вопрос № 78

Как правильно описать локализацию патологического процесса в легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Относительно расположения передних отделов ребер
Правильность = 1
 - 2) Относительно расположения задних отделов ребер
Правильность = 2
 - 3) По межреберьям
Правильность = 3
 - 4) По долям и, если возможно, по сегментам
Правильность = 100
-

Вопрос № 79

Какие основные критерии учитываются при характеристике рентгенологических симптомов при легочной патологии?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Локализация, количество, форма, размеры, интенсивность, структура, контуры
Правильность = 100
- 2) Отношение к соседним анатомическим образованиям, множественность, величина, плотность, распространенность, четкость контуров
Правильность = 1

3) Расположение, величина, плотность, количество
Правильность = 2

Вопрос № 80

Каково обычное расположение верхней границы корня правого легкого на обзорной прямой рентгенограмме?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Первое межреберье
Правильность = 1
 - 2) На уровне правого атриовазального угла тени средостения
Правильность = 2
 - 3) Передний отрезок третьего ребра или второе межреберье
Правильность = 100
-

Вопрос № 81

С какой целью назначается проба Коха?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Диагностика туберкулеза
Правильность = 1
 - 2) Дифференциальная диагностика туберкулеза и сходной патологии
Правильность = 50
 - 3) Определение возможности назначения туберкулинотерапии
Правильность = 2
 - 4) Дифференциальная диагностика туберкулеза и определение активности тубпроцесса
Правильность = 100
-

Вопрос № 82

Как вводится туберкулин при пробе Коха?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Накожно
Правильность = 1
 - 2) Внутривожно
Правильность = 2
 - 3) Подкожно
Правильность = 100
 - 4) Внутримышечно
Правильность = 3
-

Вопрос № 83

Что учитывается при оценке реакции Манту с 2 ТЕ?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Поперечный размер папулы, везикулы

- Правильность = 100
- 2) Размер папулы и гиперемия
Правильность = 1
- 3) Гиперемия и везикулы
Правильность = 2
- 4) Продольный размер папулы, везикулы
Правильность = 3
-

Вопрос № 84

Какие изменения в гемограмме из перечисленных, позволяют считать гемотуберкулиновую пробу положительной?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Увеличение лейкоцитов на 1 тыс. Г/л и более, увеличение палочкоядерных нейтрофилов на 6% и более, уменьшение лимфоцитов на 10% и более, увеличение СОЭ на 3 мм и более
Правильность = 100
- 2) Увеличение лимфоцитов на 10% и более, увеличение лейкоцитов на 1 тыс. Г/л, увеличение СОЭ на 3 мм и более
Правильность = 1
- 3) Увеличение лейкоцитов на 2 тыс. Г/л, увеличение лимфоцитов на 10% и более, увеличение СОЭ на 5 мм, снижение тромбоцитов на 20% и более
Правильность = 2
-

Вопрос № 85

Что используется в качестве эталона при отнесении пятнистых теней к очагам большой интенсивности?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Поперечное сечение сосудов
Правильность = 100
- 2) Продольное сечение сосудов
Правильность = 1
- 3) Тени ключицы и задние отрезки ребер
Правильность = 2
- 4) Мягкие ткани и легочный рисунок
Правильность = 3
-

Вопрос № 86

Что используется в качестве эталона при отнесении пятнистых теней к мягким очагам низкой интенсивности?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Поперечное сечение сосудов
Правильность = 1
- 2) Продольное сечение сосудов
Правильность = 100
- 3) Тени ключицы и задние отрезки ребер
Правильность = 2

4) Мягкие ткани и легочный рисунок

Правильность = 3

Вопрос № 87

В каком ответе можно считать белково-туберкулиновую пробу положительной?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Снижение альбуминов на 10% и более, повышение альфа2- и гамма-глобулинов на 10%

Правильность = 100

2) Повышение альбуминов на 10% и более, повышение всех фракций гамма-глобулинов на 10% и более

Правильность = 1

3) Снижение альбуминов на 10% и снижение глобулинов на 20%

Правильность = 2

4) Снижение альбуминов на 10% и повышение бета-глобулинов на 20%

Правильность = 3

Вопрос № 88

Какие размеры позволяют отнести тенеобразования к дольковым очаговым теням?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

1) 2 - 3 мм

Правильность = 1

2) 4 - 6 мм

Правильность = 2

3) 11 - 20 мм

Правильность = 3

4) 7 - 10 мм

Правильность = 100

Вопрос № 89

Как отличить очаговую тень от фокуса затемнения?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) По форме

Правильность = 1

2) По интенсивности

Правильность = 2

3) Правильны все ответы

Правильность = 3

4) По размерам

Правильность = 100

Вопрос № 90

Какие термины правильно использовать для характеристики формы патологических теней?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Округлые, овальные, треугольные, неправильные, линейные
Правильность = 100
 - 2) Очаги, фокусы, инфильтраты, полости
Правильность = 1
 - 3) Очагоподобные образования, участок затенения
Правильность = 2
 - 4) Затемнение сравнивается с различными фруктами (грушевидная и др.)
Правильность = 3
-

Вопрос № 91

Какие размеры позволяют отнести фокусы затенения к мелким?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) До 10 мм
Правильность = 1
 - 2) 2 - 4 см
Правильность = 2
 - 3) Сегментарные
Правильность = 3
 - 4) Долевые
Правильность = 4
 - 5) 1,5 - 2 см
Правильность = 100
-

Вопрос № 92

При каком варианте диссеминированного туберкулеза легких не дифференцируется легочной рисунок?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Милиарный
Правильность = 100
 - 2) Подострый гематогенный
Правильность = 30
 - 3) Хронический диссеминированный
Правильность = 1
 - 4) Бронхогенный
Правильность = 2
-

Вопрос № 93

Какие размеры фокусов позволяют отнести их к средним?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 1,5 - 2 см
Правильность = 1
- 2) 1 - 1,5 см
Правильность = 2

- 3) 4 - 6 см
Правильность = 3
- 4) 2 - 4 см
Правильность = 100
-

Вопрос № 94

Какие размеры фокусов позволяют отнести их к крупным?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 2 - 4 см
Правильность = 1
- 2) Свыше 6 см
Правильность = 2
- 3) Свыше 8 см
Правильность = 3
- 4) Свыше 4 см
Правильность = 100
-

Вопрос № 95

Какому процессу из перечисленных свойственны толстые стенки внутрилегочной полости?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Эмфизематозной булле
Правильность = 1
- 2) Воздушной кисте
Правильность = 2
- 3) Туберкулезной каверне
Правильность = 100
-

Вопрос № 96

Какое определение рентгенологического синдрома полостного образования легких наиболее правильное?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Округлое просветление, окруженное замкнутой кольцевидной тенью
Правильность = 100
- 2) Деструкция легочной ткани
Правильность = 1
- 3) Объемное образование, содержащее воздух
Правильность = 2
- 4) Кольцевидная тень, соединенная дорожкой с корнем легкого
Правильность = 3
-

Вопрос № 97

При каких процессах наиболее вероятна стабильность полостей рентгенологически свыше 6-8 месяцев?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Туберкулез
Правильность = 1
 - 2) Острый абсцесс легкого
Правильность = 2
 - 3) Злокачественные опухоли
Правильность = 3
 - 4) Во всех перечисленных случаях
Правильность = 4
 - 5) Кисты
Правильность = 100
-

Вопрос № 98

При каком патологическом процессе, из перечисленных, внутренние и внешние контуры полости обычно неконгруэнтны?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) При туберкулезе
Правильность = 100
 - 2) При эмфизематозной булле
Правильность = 1
 - 3) При воздушной кисте
Правильность = 2
 - 4) При всех перечисленных процессах
Правильность = 3
-

Вопрос № 99

Какое количество патологических теней в легких определяется как "множественные" или многочисленные?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Более 2-3
Правильность = 1
 - 2) Более 50
Правильность = 2
 - 3) Более 5
Правильность = 30
 - 4) Более 10
Правильность = 100
-

Вопрос № 100

Какое количество пятнистых теней в легких можно определить как единичные?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Только одна тень
Правильность = 1

2) 3 - 5

Правильность = 100

3) До 10

Правильность = 2

4) Во всех перечисленных случаях

Правильность = 3

Вопрос № 101

При каком патологическом процессе внутренние контуры полости гладкие и закруглены в верхнем и нижних отделах?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) При туберкулезе

Правильность = 1

2) При остром абсцессе легкого

Правильность = 2

3) При воздушной кисте

Правильность = 100

4) При хроническом абсцессе легкого

Правильность = 4

Вопрос № 102

Каковы абсолютные противопоказания к фибробронхоскопии?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Профузное кровотечение, выраженная дыхательная недостаточность, инородные тела, стенозы гортани и трахеи, непереносимость местной анестезии

Правильность = 100

2) Инфаркт миокарда в анамнезе, искривление носовой перегородки, непереносимость бронхолитиков

Правильность = 1

3) Гормонозависимая бронхиальная астма

Правильность = 2

Вопрос № 103

Каковы местные противопоказания к проведению ригидной бронхоскопии?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Повреждения и анкилозы нижней челюсти, шеи, смещение трахеи, острый тонзиллит, ларингит, туберкулез гортани

Правильность = 100

2) Непереносимость местной анестезии, пожилой возраст, кариес, короткая шея

Правильность = 1

3) Во всех перечисленных случаях

Правильность = 2

Вопрос № 104

Является ли возраст больного старше 60 лет противопоказанием к проведению бронхоскопии?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Да
Правильность = 1
 - 2) Нет
Правильность = 100
 - 3) Только к поднаркозной бронхоскопии
Правильность = 2
-

Вопрос № 105

В каких случаях показана трансторакальная игловая аспирационная биопсия легкого?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) При патологических процессах, расположенных в кортикальных слоях легких
Правильность = 100
 - 2) При патологических процессах, расположенных на уровне бронхов третьего порядка
Правильность = 1
 - 3) При патологических процессах в прикорневых отделах легкого
Правильность = 2
-

Вопрос № 106

Какие осложнения медиастиноскопии из перечисленных наиболее частые и значимые?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Трахеит, глоссит, воздушная эмболия
Правильность = 1
 - 2) Пневмония, парез диафрагмального нерва, бронхоспазм, спонтанный пневмоторакс
Правильность = 2
 - 3) Плеврит, ларингит, перикардит, парез диафрагмального нерва
Правильность = 3
 - 4) Пневмоторакс, медиастинит, кровотечения, парез возвратного нерва
Правильность = 100
-

Вопрос № 107

Через какой доступ проводится медиастиноскопия?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) В шейной области слева
Правильность = 1
- 2) В шейной области справа
Правильность = 2
- 3) В шейной области спереди

Правильность = 100

Вопрос № 108

Является ли высокий экссудативный плеврит неясной этиологии противопоказанием к биопсии плевры?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

1) Да

Правильность = 1

2) Нет

Правильность = 100

3) Является, если он отягощен симптомами дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности

Правильность = 2

Вопрос № 109

Где обычно располагается верхняя граница корня левого легкого в норме на обзорной прямой рентгенограмме?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

1) На одном уровне с правым корнем

Правильность = 1

2) На уровне дуги аорты

Правильность = 2

3) Передний отрезок второго ребра или на уровне второго межреберья

Правильность = 100

Вопрос № 110

Каковы наиболее важные преимущества гибких бронхоскопов перед ригидными (жесткими) бронхоскопами?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

1) Увеличение обзора, преодоление ряда противопоказаний к ригидной бронхоскопии

Правильность = 100

2) Возможность использования у реанимационных больных и во время операции, лучшая переносимость у детей

Правильность = 1

3) Можно проводить исследования в амбулаторных условиях, можно проводить детям

Правильность = 2

4) Возможность для выполнения трансбронхиальной биопсии легкого и лимфоузлов, уменьшение осложнений, возможность применения у детей

Правильность = 3

Вопрос № 111

Обязательно ли исследовать функцию внешнего дыхания и ЭКГ перед проведением плановой бронхоскопии?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Нет
Правильность = 1
 - 2) По показаниям
Правильность = 2
 - 3) Решается индивидуально
Правильность = 3
 - 4) Да
Правильность = 100
-

Вопрос № 112

Всегда ли необходимо применять премедикацию перед проведением бронхоскопии?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Всегда
Правильность = 100
 - 2) Не всегда
Правильность = 1
 - 3) По показаниям
Правильность = 2
-

Вопрос № 113

Обязательно ли проводить пробу на переносимость анестетика при проведении местной анестезии слизистой дыхательных путей?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Обязательно
Правильность = 100
 - 2) Не обязательно
Правильность = 1
 - 3) По показаниям
Правильность = 2
 - 4) Если в анализе есть указания на аллергическую непереносимость любых медикаментов
Правильность = 3
-

Вопрос № 114

В каких случаях, из перечисленных, бронхоскопия проводится по жизненным показаниям?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) При прорыве и опорожнении в бронхи содержимого гигантских кист, абсцессов, каверн, лимфоузлов с угрозой асфиксии
Правильность = 25
- 2) При попадании инородных тел, профузных легочных кровотечениях, при которых может быть выполнена операция по жизненным показаниям
Правильность = 25

3) Ателектазе или разрыве бронха, развившихся во время операции, гиповентиляции единственного легкого в послеоперационном периоде

Правильность = 25

4) При реканализации культи бронха в послеоперационном периоде

Правильность = 25

5) Во всех приведенных случаях

Правильность = 100

Вопрос № 115

Какой антидот необходимо ввести, если у больного во время бронхоскопии под анестезией дикаином возникли токсические побочные явления?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

1) Кордиамин

Правильность = 1

2) Кофеин

Правильность = 100

3) Эуфиллин

Правильность = 2

4) Глюкокортикоиды

Правильность = 3

5) Хлористый кальций

Правильность = 4

Вопрос № 116

Каково количество туберкулина для постановки пробы Манту с 2 ТЕ?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) 0,1 мл

Правильность = 100

2) 0,2 мл

Правильность = 1

3) 0,5 мл

Правильность = 2

4) 1,0 мл

Правильность = 3

Вопрос № 117

Как делается проба Гринчар-Карпиловского?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

1) Накожно

Правильность = 100

2) Подкожно

Правильность = 1

3) Внутривенно

Правильность = 2

Вопрос № 118

Какие виды реакции на введение туберкулина человеку (проба Коха) различают?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Общая, местная, извращенная
Правильность = 1
 - 2) Общая, очаговая, гиперэргическая
Правильность = 2
 - 3) Общая, местная, очаговая
Правильность = 100
 - 4) Местная, очаговая и аллергическая
Правильность = 3
-

Вопрос № 119

В чем выражается положительная глазная туберкулиновая проба?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Расширение сосудов на глазном дне, гиперемия диска и ступенчатость его границ
Правильность = 100
 - 2) Сужение сосудов глазного дна и ступенчатость границ диска
Правильность = 1
 - 3) Гиперемия диска, ступенчатость его границ, сужение зрачков через 48 часов после постановки пробы
Правильность = 2
-

Вопрос № 120

Какой вид аллергии выявляет проба Манту с 2 ТЕ?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Инфекционную аллергию
Правильность = 50
 - 2) Поствакцинальную аллергию
Правильность = 50
 - 3) Инфекционную и поствакцинальную аллергию
Правильность = 100
 - 4) Аллергию замедленного типа
Правильность = 1
 - 5) Аллергию немедленного типа
Правильность = 2
-

Вопрос № 121

Какой пневмокониоз относится к силикатозам?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Каолиноз
Правильность = 100

- 2) Силикоз
Правильность = 1
- 3) Антракоз
Правильность = 2
- 4) Станиоз
Правильность = 3
-

Вопрос № 122

Является ли проба Манту дифференциально-диагностической пробой?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Да
Правильность = 1
- 2) Является при подозрении на туберкулез органов дыхания
Правильность = 2
- 3) Нет
Правильность = 100
-

Вопрос № 123

Какое количество пятнистых теней в легких характеризуется как немногочисленные?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) До 3
Правильность = 1
- 2) 11 - 20
Правильность = 2
- 3) 3 - 5
Правильность = 50
- 4) 5 - 10
Правильность = 100
-

Вопрос № 124

Какая реакция на пробу Манту с 2 ТЕ у взрослых считается гиперэргической?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Папула 17 мм и более или любых размеров с пустулой
Правильность = 1
- 2) Папула 15 мм и более
Правильность = 2
- 3) Папула любых размеров с везикулой или пустулой
Правильность = 3
- 4) Папула 21 мм и более или любых размеров с везикулой
Правильность = 100
-

Вопрос № 125

Как изменяют чувствительность человека к туберкулину ревматизм, тонзиллит и бронхиальная астма?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Снижают чувствительность
Правильность = 1
 - 2) Повышают чувствительность
Правильность = 100
 - 3) Не изменяют чувствительность
Правильность = 2
-

Вопрос № 126

Как изменяют чувствительность человека к туберкулину по пробе Манту такие вирусные инфекции, как корь, коклюш и скарлатина?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Снижают чувствительность
Правильность = 100
 - 2) Увеличивают чувствительность
Правильность = 1
 - 3) Как правило не изменяют чувствительность
Правильность = 2
-

Вопрос № 127

Что называется виражем туберкулиновой пробы?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Появление впервые положительной реакции на пробу Манту с 2 ТЕ не связанной с прививкой БЦЖ и обусловленной заражением туберкулезом
Правильность = 100
 - 2) Появление впервые положительной реакции Манту, связанной с прививкой БЦЖ
Правильность = 1
 - 3) Нарастание пробы Манту с 2 ТЕ на 6мм и более с образованием папулы более 17 мм или папулы любого размера с везикулами
Правильность = 2
 - 4) Появление впервые положительной реакции Манту, нарастание реакции с образованием папулы 12 мм и более
Правильность = 50
-

Вопрос № 128

Какой пневмокониоз относится к пневмокониозам растительного происхождения?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Силикоз
Правильность = 1
- 2) Каолиноз
Правильность = 2
- 3) Антракоз
Правильность = 3

- 4) Бисиноз
Правильность = 100
- 5) Станиоз
Правильность = 4
-

Вопрос № 129

Какая теория патогенеза силикоза наиболее признана?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Иммунобиологическая
Правильность = 100
- 2) Физикохимическая
Правильность = 1
- 3) Механическая
Правильность = 2
- 4) Экологическая
Правильность = 3
-

Вопрос № 130

Какой из компонентов легочного дыхания наиболее часто и в большей мере страдает при идиопатическом фиброзирующем альвеолите Хаммена-Рича?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Диффузия
Правильность = 100
- 2) Перфузия
Правильность = 1
- 3) Вентиляция
Правильность = 2
- 4) Страдают все компоненты
Правильность = 3
-

Вопрос № 131

Какой материал исследуется наиболее часто для обнаружения МБТ?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Пунктаты из полостей легких
Правильность = 1
- 2) Промывные воды бронхов
Правильность = 2
- 3) Промывные воды желудка
Правильность = 3
- 4) Мазок из гортани
Правильность = 4
- 5) Мокрота
Правильность = 100
-

Вопрос № 132

Сколько нужно иметь МБТ в 1 мл материала, чтобы обнаружить их методом бактериоскопии после флотации?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 100 - 200
Правильность = 1
 - 2) 10 тысяч - 20 тысяч
Правильность = 2
 - 3) 1 тысяча - 2 тысячи
Правильность = 100
 - 4) 20 тысяч - 50 тысяч
Правильность = 3
 - 5) Менее 100
Правильность = 4
-

Вопрос № 133

На что указывают элементы тетрады Эрлиха в мокроте?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Обсеменение
Правильность = 1
 - 2) Распад легочной ткани
Правильность = 2
 - 3) Раковая опухоль
Правильность = 3
 - 4) Обострение старых тубочагов
Правильность = 100
 - 5) Бронхоэктазы
Правильность = 4
 - 6) Аллергия
Правильность = 5
-

Вопрос № 134

О чем свидетельствует "шум писка", устойчиво определяемый над туберкулёзной полостью?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) О вероятном нарушении бронхиальной проходимости в дренирующей каверну бронхе
Правильность = 100
 - 2) Об осложнении кавернозного туберкулеза туберкулезом бронха
Правильность = 1
 - 3) О вязком секрете в дренирующей каверну бронхе
Правильность = 2
 - 4) О сопутствующем обструктивном ограниченном бронхите
Правильность = 3
 - 5) О наличии у больного гигантской каверны
Правильность = 4
-

Вопрос № 135

Какие функциональные пробы, применяемые для выявления скрытых форм дыхательной недостаточности наиболее физиологичны?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) С применением различных фармакологических средств
Правильность = 1
 - 2) Искусственное затруднение дыхания
Правильность = 2
 - 3) Пробы с задержкой дыхания на выдохе и на вдохе (Генча-Саабразе и Штанге)
Правильность = 3
 - 4) Дозированная физическая нагрузка
Правильность = 100
-

Вопрос № 136

Какие области грудной клетки при заболевании туберкулезом рекомендованы Штернбергом к выслушиванию как "зоны тревоги"?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Подключичные
Правильность = 1
 - 2) Межлопаточные на уровне гребня лопатки
Правильность = 2
 - 3) Подмышечные
Правильность = 100
-

Вопрос № 137

Какие области грудной клетки при заболевании туберкулезом рекомендованы Яновским Ф.Г. к выслушиванию как "зоны тревоги"?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Подключичные области
Правильность = 100
 - 2) Подмышечные
Правильность = 1
 - 3) Межлопаточные на уровне гребня лопатки
Правильность = 2
-

Вопрос № 138

Какие показатели ЖЕЛ в процентах от должной считаются нормальными?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 70% и более
Правильность = 1
- 2) 80% и более
Правильность = 100

- 3) 90% и более
Правильность = 2
- 4) 95% и более
Правильность = 3
-

Вопрос № 139

Изменения каких спирографических показателей в наибольшей мере свидетельствуют о наличии обструктивных изменений в легких и бронхах?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Минутный объем дыхания (МОД)
Правильность = 1
- 2) ЖЕЛ
Правильность = 2
- 3) Максимальная вентиляция легких (МВЛ)
Правильность = 3
- 4) Форсированная ЖЕЛ, индекс Тиффно
Правильность = 100
-

Вопрос № 140

Изменения каких спирографических показателей в большей мере свидетельствуют о наличии рестриктивных изменений в легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Форсированная ЖЕЛ
Правильность = 1
- 2) МОД
Правильность = 2
- 3) Индекс Тиффно
Правильность = 3
- 4) ЖЕЛ
Правильность = 100
-

Вопрос № 141

Какие показатели индекса Тиффно в процентах от должного принимаются за норму?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) 70% и более
Правильность = 100
- 2) 80% и более
Правильность = 1
- 3) 90% и более
Правильность = 2
- 4) 95% и более
Правильность = 3
-

Вопрос № 142

В каких случаях нецелесообразно делать пробу Манту с 2 ТЕ?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Наличие прививки БЦЖ в течение последнего года
Правильность = 1
 - 2) Инфекционное заболевание в период обострения
Правильность = 100
 - 3) Предшествующая положительная реакция на туберкулин
Правильность = 2
 - 4) Предшествующая отрицательная реакция на туберкулин
Правильность = 3
 - 5) Подозрение на туберкулезное инфицирование
Правильность = 4
-

Вопрос № 143

Какая методика обнаружения МБТ в экссудате при туберкулезном плеврите наиболее информативна?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Флотация с микроскопией
Правильность = 1
 - 2) Простая микроскопия
Правильность = 2
 - 3) Люминесцентная микроскопия
Правильность = 3
 - 4) Бактериологическая методика
Правильность = 100
 - 5) Радиометрическая
Правильность = 30
-

Вопрос № 144

Как обычно соотносится концентрация сахара в плевральном экссудате с концентрацией сахара в крови у больных туберкулезным плевритом?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Выше, чем в крови
Правильность = 1
 - 2) Ниже, чем в крови
Правильность = 100
 - 3) Соответствует уровню сахара в крови
Правильность = 2
 - 4) В 2 раза выше, чем в крови
Правильность = 3
-

Вопрос № 145

Какое из нижеперечисленных заболеваний или состояний имеет наиболее сходную с силикозом второй стадии клинко-рентгенологическую картину?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Милиарный туберкулез легких
Правильность = 1
 - 2) Силикаты (асбестоз, цементоз, талькоз)
Правильность = 100
 - 3) Саркоидоз II стадии
Правильность = 2
 - 4) Возрастной (старческий) пневмофиброз
Правильность = 3
-

Вопрос № 146

Какая методика индивидуальной туберкулинодиагностики наиболее информативна для дифференциальной диагностики туберкулеза и сходной патологии?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Проба Манту в динамике
Правильность = 1
 - 2) Проба Пирке
Правильность = 2
 - 3) Проба Коха
Правильность = 100
-

Вопрос № 147

Какой из перечисленных рентгенологических симптомов наиболее характерен для силикоза второй стадии?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Вид "пчелиных сот"
Правильность = 1
 - 2) "Мраморное" легкое
Правильность = 2
 - 3) Симптом аркад
Правильность = 3
 - 4) Симптом "снежной бури"
Правильность = 100
-

Вопрос № 148

Какой иммунологический тест наиболее информативен для дифференциальной диагностики туберкулеза и саркоидоза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Содержание Т-лимфоцитов в периферической крови
Правильность = 1
- 2) Содержание естественных антител в крови
Правильность = 2
- 3) Уровень циркулирующих иммунных комплексов
Правильность = 3

- 4) Содержание противолёгочных антител
Правильность = 4
- 5) Туберкулиновые реакции
Правильность = 100
- 6) Показатель повреждаемости нейтрофилов
Правильность = 5
-

Вопрос № 149

Какой формой туберкулеза бронхов чаще осложняется кавернозный туберкулез легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Свищевой
Правильность = 1
- 2) Инфильтративной
Правильность = 100
- 3) Язвенной
Правильность = 2
- 4) Любой из перечисленных
Правильность = 3
-

Вопрос № 150

Какой патогенетический механизм развития туберкулеза бронхов у больных кавернозным туберкулезом легких является основным?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Контактный
Правильность = 1
- 2) Лимфогенный
Правильность = 2
- 3) Спυтогенный
Правильность = 100
- 4) Гематогенный
Правильность = 3
- 5) Любой из перечисленных
Правильность = 4
-

Вопрос № 151

Какой внутренний контур полости при кавернозном туберкулезе является наиболее типичным?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Неровный с возможным наличием секвестров
Правильность = 1
- 2) Четкий, ровный
Правильность = 100
- 3) Бухтообразный
Правильность = 2
- 4) Размытый, нечеткий

Правильность = 3

Вопрос № 152

Какие заболевания из перечисленных чаще всего являются причиной экссудативного плеврита у людей молодого возраста?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Злокачественные опухоли
Правильность = 1
 - 2) Ревматизм
Правильность = 2
 - 3) Туберкулез
Правильность = 100
 - 4) Заболевания сердечно-сосудистой системы
Правильность = 3
 - 5) Саркоидоз
Правильность = 4
-

Вопрос № 153

Каким наиболее часто бывает плевральный экссудат по преобладающему клеточному составу при туберкулезной этиологии плеврита?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Нейтрофильным
Правильность = 1
 - 2) Эозинофильным
Правильность = 2
 - 3) Лимфоцитарным
Правильность = 100
 - 4) Мезотелиальным
Правильность = 3
 - 5) Геморрагическим
Правильность = 4
 - 6) Моноцитарным
Правильность = 5
-

Вопрос № 154

Какой экссудат наиболее характерен для туберкулезного плеврита?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Фибринозный
Правильность = 1
- 2) Гнойный
Правильность = 2
- 3) Серозно-геморрагический
Правильность = 3
- 4) Серозный
Правильность = 100

5) Холестериновый
Правильность = 4

Вопрос № 155

К какому синдрому относятся следующие симптомы туберкулеза легких: повышение температуры, слабость, отливость, исхудание, плохой сон?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Интоксикационному
Правильность = 100
 - 2) Диэнцефальному
Правильность = 60
 - 3) Бронхо-легочно-плевральному
Правильность = 1
-

Вопрос № 156

Какие субъективные факторы (по Р. Хэгглину) могут вести к постановке неправильного диагноза?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Недостаточное мышление и ошибки в суждении врача
Правильность = 100
 - 2) Неполное обследование из-за недостаточных возможностей медучреждения или из-за недисциплинированности больного
Правильность = 1
 - 3) Ограниченные возможности диагностической аппаратуры
Правильность = 2
-

Вопрос № 157

Какие объективные факторы (по Р. Хэгглину) могут вести к постановке неправильного диагноза?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Недостаточное обследование из-за недисциплинированности, тяжести состояния больного, из-за недостаточных возможностей медучреждения
Правильность = 100
 - 2) Ошибки в суждении врача или предвзятости мнения о больном
Правильность = 1
 - 3) Редко встречающаяся болезнь, отсутствие реактивов в лаборатории
Правильность = 2
-

Вопрос № 158

К какому синдрому относятся такие симптомы как кашель, выделение мокроты, боли в грудной клетке?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Интоксикационному
Правильность = 1
 - 2) Диэнцефальному
Правильность = 2
 - 3) Бронхо-легочно-плевральному
Правильность = 100
-

Вопрос № 159

Какому заболеванию больше соответствует субфебрилитет после приема пищи?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Хроническому тонзиллиту
Правильность = 1
 - 2) Хроническому гепатохолециститу
Правильность = 100
 - 3) Заболеванию туберкулезом
Правильность = 2
-

Вопрос № 160

Какой субфебрилитет более характерен для туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Длительное повышение температуры в пределах 37,5 градусов Цельсия постоянно по вечерам
Правильность = 100
 - 2) Периодическое повышение температуры до 37,5 градусов Цельсия по утрам
Правильность = 1
 - 3) Периодический субфебрилитет после приема пищи
Правильность = 2
-

Вопрос № 161

Какое повышение температуры тела в градусах Цельсия относится к малому субфебрилитету?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 37,1 - 37,5
Правильность = 100
 - 2) 37,6 - 38,0
Правильность = 1
 - 3) 37,0 - 38,0
Правильность = 2
-

Вопрос № 162

Какой метод исследования в диагностике туберкулеза наиболее информативный?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Клинический
Правильность = 1
 - 2) Лабораторный
Правильность = 2
 - 3) Рентгенологический
Правильность = 100
 - 4) Инструментальный
Правильность = 3
 - 5) Функциональный
Правильность = 4
-

Вопрос № 163

При какой патологии синдром округлой или кольцевидной тени обычно сопровождается пятнистыми тенями в окружающей легочной ткани?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Туберкулез
Правильность = 100
 - 2) Абсцесс
Правильность = 30
 - 3) Ретенционная киста
Правильность = 1
 - 4) Эхинококковая киста
Правильность = 2
 - 5) Междолевой плеврит
Правильность = 3
-

Вопрос № 164

Какой патологии свойственно сочетание множественных очагов в средних и нижних отделах легких с расширением тени корней легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Туберкулез
Правильность = 1
 - 2) Очаговая пневмония
Правильность = 2
 - 3) Пневмокониоз
Правильность = 3
 - 4) Коллагеноз
Правильность = 4
 - 5) Застойное легкое
Правильность = 100
-

Вопрос № 165

Какие основные составные клинического метода исследования?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Опрос жалоб, анамнез, физикальное исследование

Правильность = 100

2) Выполнение клинического минимума исследований и проведение туберкулиновых проб (Манту, Коха)

Правильность = 1

3) Клинический анализ крови, физикальные исследования

Правильность = 2

Вопрос № 166

Какие методы во фтизиатрии составляют дополнительные методы исследования второй очереди, проводящиеся отдельным больным по определенным показаниям?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

1) Клиническое исследование, рентгенография органов грудной клетки

Правильность = 1

2) Бронхоскопия

Правильность = 2

3) Прицельная рентгенография и томография

Правильность = 3

4) Инструментальные методы с биопсиями последующего патогенетического и цитологического исследований

Правильность = 100

Вопрос № 167

Какие методы во фтизиатрии составляют группу дополнительных диагностических методов первой очереди?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

1) Проба Коха, бронхоскопия, определение белков плазмы крови

Правильность = 100

2) Анамнез, жалобы, физикальные данные

Правильность = 1

3) Томография, посев мокроты на БК, общий анализ крови и мочи

Правильность = 2

Вопрос № 168

Какие методы исследования составляют обязательный диагностический минимум?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Клиническое исследование, рентгенография грудной клетки

Правильность = 100

2) Клинические анализы крови, мочи, микроскопия и посев мокроты на БК и вторичную флору

Правильность = 1

3) Проба Коха, определение белков крови, бронхоскопия

Правильность = 2

Вопрос № 169

Какая толщина стенки полости наиболее характерна для кавернозной формы туберкулеза легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Неравномернотолстая
Правильность = 1
 - 2) Тонкая
Правильность = 2
 - 3) Толстая
Правильность = 3
 - 4) Неравномернотонкая
Правильность = 100
-

Вопрос № 170

Какие внутренние и наружные контуры полости наиболее характерны для кавернозной формы туберкулеза легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Внутренний и наружный контуры нечеткие
Правильность = 1
 - 2) Внутренний и наружный контуры четкие
Правильность = 2
 - 3) Внутренний контур четкий, наружный контур неравномерночеткий-
Правильность = 100
 - 4) Внутренний контур четкий, бухтообразный, наружный контур без четких границ
Правильность = 3
-

Вопрос № 171

Какая причина рецидивов у больных, перенесших кавернозный туберкулез легких является основной?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Неполноценно проведенный основной курс химиотерапии
Правильность = 100
 - 2) Сопутствующие заболевания
Правильность = 1
 - 3) Большие остаточные изменения
Правильность = 2
 - 4) Неполноценно проводимые противорецидивные курсы химиотерапии
Правильность = 3
 - 5) Правильны все ответы
Правильность = 4
-

Вопрос № 172

В каком возрасте возможен диагноз "туберкулезная интоксикация"?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) В любом возрасте
Правильность = 1
 - 2) До 30 лет
Правильность = 2
 - 3) Только в детском возрасте
Правильность = 3
 - 4) В детском и подростковом возрасте
Правильность = 100
-

Вопрос № 173

Для каких патологических изменений в легких и плевре характерно ослабление голосового дрожания?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Бронхо-легочное поражение при первичном туберкулезе
Правильность = 1
 - 2) Очаговая сливная пневмония
Правильность = 2
 - 3) Цирротический туберкулез
Правильность = 3
 - 4) Ателектаз легкого
Правильность = 100
-

Вопрос № 174

Для каких патологических изменений в легких характерно усиление голосового дрожания?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Цирроз доли легкого
Правильность = 100
 - 2) Облаковидный инфильтрат
Правильность = 1
 - 3) Ателектаз
Правильность = 2
 - 4) Эмфизема легких
Правильность = 3
-

Вопрос № 175

При каком патологическом процессе в легких определяется перкуторный звук с коробочным оттенком?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) При эмфиземе
Правильность = 100
- 2) При наличии большой каверны
Правильность = 1
- 3) При открытом пневмотораксе
Правильность = 2

4) При обширной сливной пневмонии
Правильность = 3

Вопрос № 176

Всегда ли зависит выраженность болевого симптома от распространенности и тяжести туберкулезного процесса?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Всегда
Правильность = 1
 - 2) Не всегда
Правильность = 100
-

Вопрос № 177

Какая температурная кривая более характерна для фазы распада при туберкулезе?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Тип континуа
Правильность = 1
 - 2) Гектический тип
Правильность = 2
 - 3) Ремиттирующий тип
Правильность = 100
-

Вопрос № 178

Какой субфебрилитет более характерен для хронического тонзиллита?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Периодическое повышение температуры до 37,5гр. по утрам
Правильность = 100
 - 2) Повышение температуры после приема пищи
Правильность = 1
 - 3) Субфебрильная температура по вечерам
Правильность = 2
-

Вопрос № 179

Какой кашель более характерен для туберкулезного процесса в легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Сухой
Правильность = 10
- 2) Продуктивный
Правильность = 100
- 3) Сухой, приступообразный
Правильность = 1
- 4) Продуктивный по утрам и сухой по вечерам

Правильность = 2

Вопрос № 180

Для какого заболевания более характерно выделение большого количества (около 1л) жидкой, водянистой мокроты?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Аденоматоз легких
Правильность = 100
 - 2) Хронический абсцесс
Правильность = 1
 - 3) Цирротический туберкулез
Правильность = 2
 - 4) Бронхоэктатическая болезнь
Правильность = 3
-

Вопрос № 181

Для какого заболевания более характерно выделение мокроты при положении больного на боку с опущенной вниз головой?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Деструктивный туберкулез легких
Правильность = 1
 - 2) Бронхоэктатическая болезнь
Правильность = 2
 - 3) Эмпиема с бронхиальным свищем
Правильность = 100
-

Вопрос № 182

Для какого заболевания, из перечисленных, более характерно выделение около 200мл мокроты в сутки с неприятным запахом?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Туберкулез легких в фазе распада
Правильность = 1
 - 2) Бронхоэктатическая болезнь
Правильность = 2
 - 3) Абсцедирующая пневмония
Правильность = 100
-

Вопрос № 183

Когда правильнее проводить инструментальные методы диагностики патологии бронхов и легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) До обязательных методов обследования больного

- Правильность = 1
- 2) В комплексе с обязательными методами исследования
Правильность = 2
- 3) После проведения обязательных методов исследования
Правильность = 100
-

Вопрос № 184

В какое время суток характерна гипертермия у больных с диагнозом туберкулезная интоксикация?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) В утренние часы
Правильность = 1
- 2) В течение всего дня
Правильность = 2
- 3) Нет закономерности
Правильность = 3
- 4) В вечернее время
Правильность = 100
-

Вопрос № 185

Какой дополнительный метод диагностики из перечисленных обязателен при осложненном течении первичного туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Бронхоскопия
Правильность = 100
- 2) Бактериологический
Правильность = 1
- 3) Определение туберкулинового титра
Правильность = 3
- 4) ФВД и ЭКГ
Правильность = 4
-

Вопрос № 186

С каким заболеванием наиболее часто приходится дифференцировать первичный туберкулезный комплекс?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Пневмонией
Правильность = 100
- 2) Саркоидозом
Правильность = 1
- 3) Лимфогрануломатозом
Правильность = 2
- 4) Опухолями
Правильность = 3
-

Вопрос № 187

Могут ли нормализоваться ликворологические данные при тубменингите через 3-4 недели от начала болезни?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Да

Правильность = 1

2) Могут только при рациональной терапии с первых дней заболевания

Правильность = 2

3) Нет

Правильность = 100

Вопрос № 188

Исходом каких форм туберкулеза могут быть очаговые изменения в легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Туберкулемы, кавернозной, инфильтративной, диссеминированной

Правильность = 100

2) Инфильтративной, диссеминированной, фиброзно-кавернозной

Правильность = 1

3) Инфильтративной, диссеминированной, цирротической

Правильность = 2

4) Туберкулеза внутригрудных лимфоузлов с осложненным течением

Правильность = 3

Вопрос № 189

В каких сегментах легких чаще локализуются туберкулезные очаги?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) В 1, 2, 6

Правильность = 100

2) В верхнедолевых и базальных

Правильность = 1

3) В верхнедолевых и язычковых

Правильность = 2

4) В 1, 2, 3 и 10

Правильность = 3

5) В верхнем, аксилярном, заднебазальном

Правильность = 4

Вопрос № 190

Какие препараты используются в первую очередь при дифференциальной диагностике очагового туберкулеза и очаговой пневмонии?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Антибиотики широкого спектра действия, обладающие и противотуберкулезной активностью

Правильность = 1

2) Препараты, обладающие только противотуберкулезным действием

Правильность = 2

3) Антибиотики широкого спектра действия

Правильность = 100

Вопрос № 191

Какой контингент детей имеет наибольший риск заболевания туберкулезной интоксикацией?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Контактные с больными туберкулезом

Правильность = 100

2) Больные ХНЗЛ

Правильность = 1

3) Больные диабетом

Правильность = 2

4) Дети с "виражом" туберкулиновых проб

Правильность = 60

Вопрос № 192

Обязательно ли проведение томографии трахеобронхиального дерева при туберкулезной интоксикации?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Да

Правильность = 100

2) Нет

Правильность = 1

3) Только при подозрении на туберкулез органов дыхания

Правильность = 2

Вопрос № 193

Какая гемограмма характерна для туберкулезной интоксикации?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Лимфопения, гипохромная анемия, в остальном норма

Правильность = 40

2) Лимфоцитоз, эозинофилия

Правильность = 1

3) Анемия, лейкоцитоз, сдвиг формулы влево, увеличенное СОЭ

Правильность = 100

4) Гемограмма нормальная

Правильность = 2

Вопрос № 194

Каковы основные компоненты первичного тубкомплекса при рентгенографии?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Фокус в легком, отводящая дорожка к корню и реакция со стороны корня
Правильность = 100
 - 2) Фокус в легком и увеличенные в корне лимфатические узлы
Правильность = 60
 - 3) Множественные фокусы в легких и лимфангоит
Правильность = 1
 - 4) Двухстороннее увеличение лимфоузлов, фокус затемнения в легочной ткани и реакция со стороны плевры
Правильность = 2
-

Вопрос № 195

Какие размеры легочного аффекта бывают при первичном тубкомплексе?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) От 0,5 см до доли
Правильность = 100
 - 2) От 0,5 см до 1 см
Правильность = 1
 - 3) От 0,5 см до сегмента
Правильность = 2
 - 4) От 1 см до 5 см
Правильность = 3
-

Вопрос № 196

Какие реакции на туберкулин характерны для детей, больных первичным туберкулезным комплексом?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Отрицательные
Правильность = 1
 - 2) Положительные
Правильность = 60
 - 3) Гиперергические
Правильность = 40
 - 4) Слабоположительные
Правильность = 2
 - 5) Положительные и гиперергические
Правильность = 100
-

Вопрос № 197

Какие осложнения первичного туберкулезного комплекса наиболее часты?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Ателектаз, распад легочной ткани
Правильность = 100
 - 2) Обсеменение легких
Правильность = 1
 - 3) Внелегочные очаги-отсевы, генерализация туберкулезного процесса
Правильность = 2
 - 4) Кровохарканье, легочное кровотечение
Правильность = 3
-

Вопрос № 198

Какая форма первичного туберкулеза у детей встречается наиболее часто?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Туберкулезная интоксикация
Правильность = 1
 - 2) Первичный туберкулезный комплекс
Правильность = 2
 - 3) Плеврит
Правильность = 3
 - 4) Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов
Правильность = 100
-

Вопрос № 199

Какие параспецифические реакции наиболее часты при первичном туберкулеза?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Кератоконъюнктивит, узловатая эритема, полисерозит
Правильность = 100
 - 2) Ревматоидный артрит Понсе
Правильность = 1
 - 3) Миокардит, нефрит
Правильность = 2
 - 4) Плеврит
Правильность = 3
-

Вопрос № 200

Какая форма туберкулеза чаще предшествует фиброзно-кавернозному туберкулезу?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Диссеминированная
Правильность = 40
 - 2) Кавернозная
Правильность = 1
 - 3) Инфильтративная
Правильность = 100
 - 4) Плеврит
Правильность = 2
-

Вопрос № 201

Ателектаз каких сегментов чаще развивается при туберкулезе внутригрудных лимфоузлов?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) С3, С4, С5 справа
Правильность = 100
 - 2) С1, С2 справа
Правильность = 1
 - 3) С1, С2 слева
Правильность = 2
 - 4) Базальных сегментов
Правильность = 3
-

Вопрос № 202

В каком средостении чаще локализуется туберкулез внутригрудных лимфоузлов?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) В переднем
Правильность = 1
 - 2) В заднем
Правильность = 2
 - 3) В центральном
Правильность = 100
 - 4) В любом
Правильность = 3
-

Вопрос № 203

Для какого патологического образования наиболее характерна скорлупоподобная кальцинация?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Эхинококковая киста
Правильность = 100
 - 2) Тератома
Правильность = 1
 - 3) Гемангиома
Правильность = 2
 - 4) Казеозноизмененный лимфоузел
Правильность = 3
-

Вопрос № 204

Какие варианты течения туберкулеза внутригрудных лимфоузлов встречаются чаще?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Туморозная

- Правильность = 1
- 2) Инфильтративная
Правильность = 60
- 3) Малая
Правильность = 40
- 4) Инфильтративная и туморозная
Правильность = 2
- 5) Инфильтративная и фиброзная
Правильность = 3
- 6) Инфильтративная и малая
Правильность = 100
-

Вопрос № 205

Каких варианты туберкулеза внутригрудных лимфоузлов различают?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Туморозная, инфильтративная, малая
Правильность = 100
- 2) Инфильтративная, малая, рубцовая
Правильность = 1
- 3) Инфильтративная, туморозная, в фазе кальцинации
Правильность = 2
- 4) Инфильтративная, туморозная, фиброзная
Правильность = 3
-

Вопрос № 206

Какой из вариантов клинического течения более свойственен больным мягкоочаговым туберкулезом?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Острое
Правильность = 1
- 2) Подострое
Правильность = 2
- 3) Хроническое
Правильность = 3
- 4) "Волнообразное"
Правильность = 4
- 5) Бессимптомное
Правильность = 100
-

Вопрос № 207

При каком варианте туберкулеза внутригрудных лимфоузлов бывает наиболее выраженная клиническая картина?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) При инфильтративной форме
Правильность = 30

- 2) При малой форме
Правильность = 1
- 3) При туморозной форме
Правильность = 100
-

Вопрос № 208

С какими заболеваниями приходится чаще дифференцировать туберкулез внутригрудных лимфоузлов?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Саркоидозом, лимфогрануломатозом, неспецифическим лимфаденитом
Правильность = 100
- 2) Невриномами, тератомами, лимфогрануломатозом
Правильность = 1
- 3) Лимфосаркомой, лимфогрануломатозом, пороками развития
Правильность = 2
-

Вопрос № 209

Какое осложнение первичного туберкулеза наиболее частое?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Ателектаз сегмента или доли
Правильность = 50
- 2) Диссеминация
Правильность = 1
- 3) Туберкулез бронхов
Правильность = 40
- 4) Бронхо-легочное поражение
Правильность = 100
- 5) Распад
Правильность = 2
-

Вопрос № 210

Какие рентгенологические критерии увеличенных внутригрудных лимфоузлов выделяют?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Увеличение размеров тени корня легкого, изменение его формы, размытость границ, потускнение проекции бронхов
Правильность = 100
- 2) Расширение тени средостения, тяжистый характер корня и изменение его формы
Правильность = 1
- 3) Изменение соотношения размеров легочной артерии и бронха, избыточность легочного рисунка в прикорневой зоне, увеличение поперечных размеров тени корня легкого
Правильность = 2
-

Вопрос № 211

При каком заболевании наиболее часто наблюдается поражение паратрахеальных и трахеобронхиальных лимфоузлов?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Лимфолейкоз
Правильность = 1
 - 2) Саркоидоз
Правильность = 2
 - 3) Туберкулез
Правильность = 3
 - 4) Лимфогрануломатоз
Правильность = 100
-

Вопрос № 212

В каких сегментах левого легкого чаще всего находятся бронхогенные отсевы при локализации каверны в верхней доле правого легкого?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 1-2 и 6
Правильность = 1
 - 2) 3 и 10
Правильность = 2
 - 3) 4 и 5
Правильность = 100
-

Вопрос № 213

Какое осложнение наиболее часто встречается у больных кавернозным туберкулезом легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Амилоидоз
Правильность = 1
 - 2) Легочно-сердечная недостаточность
Правильность = 2
 - 3) Хронический обструктивный бронхит
Правильность = 3
 - 4) Бронхоэктатическая болезнь
Правильность = 4
 - 5) Кровохаркание
Правильность = 100
-

Вопрос № 214

Может ли туберкулезный менингит протекать с нормальным количеством клеток в ликворе?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Нет

Правильность = 100

2) Да

Правильность = 1

3) Может только при рациональной терапии с первых дней заболевания

Правильность = 2

Вопрос № 215

Для каких патологических процессов наиболее характерно наличие пневмониогенной полости?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Кавернозный туберкулез, порок развития легкого

Правильность = 1

2) Хронический абсцесс, распадающаяся опухоль

Правильность = 2

3) Абсцедирующая пневмония, инфильтративный туберкулез

Правильность = 100

Вопрос № 216

Какие морфологические реакции преобладают у больных фиброзно-кавернозным туберкулезом?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Неспецифические

Правильность = 1

2) Специфические

Правильность = 100

3) Параспецифические

Правильность = 2

Вопрос № 217

Какие клинико-рентгенологические типы инфильтративного туберкулеза выделяют?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Инфильтративно-пневмонический, округлый, облаковидный, прикорневой, лобит, казеозная пневмония

Правильность = 1

2) Округлый, лобулярный, облаковидный, перисциссурит, лобит, ложно-опухолевый

Правильность = 2

3) Ограниченный, округлый, облаковидный, прикорневой, ложно-опухолевый, казеозная пневмония

Правильность = 3

4) Шаровидный, ограниченный, облаковидный, перисциссурит, лобит, казеозная пневмония

Правильность = 4

5) Лобулярный, перисциссурит, лобит, облаковидный, округлый

Правильность = 100

Вопрос № 218

Какой рентгенологический признак является косвенным для подтверждения каверны в легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Замкнутая кольцевидная тень, видимая в двух проекциях
Правильность = 1
 - 2) Внутренний контур кольцевидной тени не повторяет очертания наружного
Правильность = 2
 - 3) Полоска "дренирующего" бронха
Правильность = 100
-

Вопрос № 219

При какой каверне можно определить амфорическое дыхание?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) У больных с фазой распада при наличии полости свыше 6 см в диаметре
Правильность = 1
 - 2) У больных с полостями до 4 см в диаметре, сообщающимися с бронхом
Правильность = 2
 - 3) При каверне свыше 6 см в диаметре с гладкими стенками, с заблокированным дренирующим бронхом
Правильность = 3
 - 4) При каверне свыше 6 см в диаметре с гладкими внутренними стенками и удовлетворительным бронхиальным дренажом
Правильность = 100
-

Вопрос № 220

Из сколько рентгеноморфологических элементов состоит типичный первичный туберкулезный комплекс?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Из одного
Правильность = 1
 - 2) Из двух
Правильность = 2
 - 3) Из трех
Правильность = 100
 - 4) Из четырех
Правильность = 3
 - 5) Из пяти
Правильность = 4
-

Вопрос № 221

Какие осложнения чаще встречаются у больных инфильтративным туберкулезом в фазе распада?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Легочное кровотечение, тубменингит
Правильность = 1
 - 2) Бронхогенное обсеменение, поражение гортани, туберкулез кишечника
Правильность = 2
 - 3) Кровохарканье, бронхогенное обсеменение, аспирационная пневмония
Правильность = 3
 - 4) Кровохарканье, спонтанный пневмоторакс, бронхогенное обсеменение
Правильность = 100
-

Вопрос № 222

Может ли полость при фиброзно-кавернозном туберкулезе быть блокированной?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Нет
Правильность = 1
 - 2) Только при сочетании с туберкулезом бронхов
Правильность = 2
 - 3) Да
Правильность = 100
-

Вопрос № 223

В какой фазе первичного тубкомплекса чаще отмечается симптом Редекера?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) На любой стадии развития первичного тубкомплекса
Правильность = 1
 - 2) В фазе кальцинации
Правильность = 2
 - 3) В фазе рассасывания и уплотнения
Правильность = 100
-

Вопрос № 224

Какой метод искусственного получения мокроты для анализа у больных кавернозным туберкулезом легких наиболее рационален?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Назначение отхаркивающих средств
Правильность = 1
 - 2) Сбор промывных вод желудка
Правильность = 2
 - 3) Раздражающие ингаляции
Правильность = 40
 - 4) Получение промывных вод бронхов
Правильность = 100
-

Вопрос № 225

Какое течение характерно для первичного туберкулезного комплекса у детей?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Острое и подострое
Правильность = 100
 - 2) Малосимптомное
Правильность = 1
 - 3) Бессимптомное
Правильность = 2
 - 4) Нет характерного течения
Правильность = 3
-

Вопрос № 226

В каких случаях целесообразно изменить диагноз кавернозной формы туберкулеза на фиброзно-кавернозную?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) При переводе больных из I-A во II группу диспансерного учета
Правильность = 1
 - 2) После неэффективно оконченного основного курса химиотерапии
Правильность = 2
 - 3) При появлении критериев, определяющих фиброзно-кавернозную форму
Правильность = 100
 - 4) Когда каверна становится фиброзной
Правильность = 3
-

Вопрос № 227

С какими заболеваниями наиболее часто приходится дифференцировать первичный туберкулезный комплекс?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Саркоидоз
Правильность = 1
 - 2) Опухоли
Правильность = 2
 - 3) Лимфогрануломатоз
Правильность = 3
 - 4) Затяжная пневмония
Правильность = 100
-

Вопрос № 228

Какие симптомы туберкулезной интоксикации у детей встречаются чаще?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Бронхо-легочно-плевральные
Правильность = 1
- 2) Слабость, тошнота, высокая температура тела

Правильность = 2

3) Симптомы интоксикации

Правильность = 40

4) Отставание в развитии, гиперергическая чувствительность к туберкулину

Правильность = 100

Вопрос № 229

Какова патоморфология лимфоузлов при туберкулезной интоксикации?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

1) Эпителиоидные бугорки

Правильность = 1

2) Лимфоидные бугорки

Правильность = 2

3) Нормальная картина

Правильность = 3

4) Гранулемы из лимфоидных, эпителиоидных клеток и клеток Пирогова-Ланханса

Правильность = 100

5) Картина неспецифического воспаления

Правильность = 4

Вопрос № 230

Какие туберкулиновые реакции чаще бывают при тубинтоксикации у детей?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Отрицательные

Правильность = 1

2) Отрицательные или положительные

Правильность = 2

3) Гиперергические

Правильность = 40

4) Положительные

Правильность = 60

5) Положительные или гиперергические

Правильность = 100

Вопрос № 231

Какая чувствительность к туберкулину характерна для больных первичным туберкулезным комплексом?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Отрицательная

Правильность = 1

2) Положительная

Правильность = 60

3) Положительная и гиперергическая

Правильность = 100

4) Гиперэрргическая

Правильность = 40

5) Любая

Правильность = 2

Вопрос № 232

Какие морфологические элементы характерны для туберкулеза мезентериальных лимфоузлов?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

1) Казеозный некроз

Правильность = 1

2) Обызвествление

Правильность = 2

3) Туберкулезные бугорки

Правильность = 100

4) Разрастание соединительной ткани

Правильность = 3

Вопрос № 233

При какой форме туберкулеза внутригрудных лимфоузлов чаще выявляется поражение бронхов?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) При инфильтративной форме

Правильность = 1

2) При малой форме

Правильность = 2

3) При туморозной форме

Правильность = 100

Вопрос № 234

Как часто встречается фаза распада при инфильтративном туберкулезе по типу перисциссурита?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) 5% - 10%

Правильность = 1

2) 20% - 30%

Правильность = 2

3) 50%

Правильность = 3

4) 80% - 90%

Правильность = 100

Вопрос № 235

Какие пары черепномозговых нервов чаще всего поражаются при базилярной локализации тубменингита?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) III, VI
Правильность = 100
 - 2) VII, XII
Правильность = 40
 - 3) I, II и IV
Правильность = 1
 - 4) II, VIII и IX
Правильность = 2
-

Вопрос № 236

Что первично поражается при очаговой пневмонии?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Альвеолы
Правильность = 1
 - 2) Бронхи
Правильность = 100
 - 3) Альвеолы, а затем бронхи
Правильность = 2
 - 4) Межуточная ткань
Правильность = 3
-

Вопрос № 237

Какое определение пневмокониоза наиболее правильно?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Заболевание, обусловленное длительным вдыханием минеральной пыли
Правильность = 1
 - 2) Профессиональное заболевание легких, вызванное длительным вдыханием производственной пыли
Правильность = 2
 - 3) Заболевание, обусловленное длительным вдыханием пыли минерального, металлического, растительного или животного происхождения, характеризующееся развитием диффузного пневмофиброза в легких
Правильность = 100
-

Вопрос № 238

Целесообразно ли менять в диагнозе инфильтративную форму на кавернозную при медленной положительной динамике (уменьшение полости) в течении 8-9 месяцев лечения?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Да
Правильность = 1
- 2) Нет

Правильность = 100

3) Целелесообразно, если каверна больших размеров

Правильность = 2

Вопрос № 239

Могут ли у больных диссеминированным туберкулезом одновременно отмечаться признаки гематогенной и диссеминации?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Да

Правильность = 100

2) Нет

Правильность = 1

3) Только в исключительных случаях

Правильность = 2

Вопрос № 240

Какую форму туберкулеза приходится дифференцировать наиболее часто с силикозом второй стадии?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Очаговую

Правильность = 1

2) Диссеминированную

Правильность = 100

3) Инфильтративную

Правильность = 2

4) Туберкулез внутригрудных лимфоузлов

Правильность = 3

Вопрос № 241

Какие физикальные данные более характерны для силикоза второй и третьей стадий?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Бочкообразная форма грудной клетки

Правильность = 100

2) Бронхиальные хрипы

Правильность = 1

3) Симптом Яновского (мозаичность перкуторного звука, акроцианоз)

Правильность = 2

Вопрос № 242

Какое из определений характеризует цирроз легкого как морфологическое понятие?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

1) Рубцовые изменения линейной (тяжистой) или очаговой формы ограниченной протяженности с потерей воздушности легочной ткани

Правильность = 1

2) Преимущественно интерстициальное разрастание соединительной ткани при сохранении воздушности легочной паренхимы

Правильность = 2

3) Массивное разрастание соединительной ткани с грубым нарушением структуры органа и потерей воздушности ткани

Правильность = 100

Вопрос № 243

Какое из определений характеризует фиброз в легком как морфологическое понятие?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

1) Рубцовые изменения линейной (тяжистой) или очаговой формы ограниченной протяженности с потерей воздушности легочной ткани

Правильность = 100

2) Преимущественно интерстициальное разрастание соединительной ткани при сохранении воздушности легочной паренхимы

Правильность = 1

3) Массивное разрастание соединительной ткани с грубым нарушением структуры органа и потерей воздушности ткани

Правильность = 2

Вопрос № 244

Какое из определений характеризует пневмосклероз как морфологическое понятие?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

1) Рубцовые изменения линейной (тяжистой) или очаговой формы ограниченной протяженности с потерей воздушности легочной ткани

Правильность = 1

2) Преимущественно интерстициальное разрастание соединительной ткани при сохранении воздушности легочной паренхимы-

Правильность = 100

3) Массивное разрастание соединительной ткани с грубым нарушением структуры органа и потерей воздушности ткани

Правильность = 2

Вопрос № 245

Какова частота внелегочных поражений при диссеминированном туберкулезе легких?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

1) 3% - 5%

Правильность = 100

2) 0,5% - 1%

Правильность = 1

3) 10% - 15%

Правильность = 2

4) 15% - 20%

Правильность = 3

Вопрос № 246

Какие из перечисленных рентгенологических признаков наиболее характерны для пневмофиброза в исходе милиарного туберкулеза?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

1) Симптом "метелки"

Правильность = 1

2) "Оголение" контуров позвоночника

Правильность = 2

3) Симптом "звездного неба"

Правильность = 100

4) Сужение легочных полей

Правильность = 3

5) Буллезная дистрофия

Правильность = 4

Вопрос № 247

Какой вид МБТ чаще вызывает первичный мезаденит?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

1) Человеческий

Правильность = 1

2) Бычий

Правильность = 100

3) Птичий

Правильность = 2

4) Атипические МБТ

Правильность = 3

Вопрос № 248

Какие отделы глаза поражаются туберкулезом в первую очередь?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

1) Склера

Правильность = 1

2) Радужная оболочка

Правильность = 100

3) Сетчатая оболочка

Правильность = 2

4) Хрусталик

Правильность = 3

5) Роговица

Правильность = 4

Вопрос № 249

Какое клиническое течение чаще бывает у больных цирротическим туберкулезом легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Острое
Правильность = 1
 - 2) Подострое
Правильность = 2
 - 3) Хроническое
Правильность = 40
 - 4) "Волнообразное"
Правильность = 100
 - 5) Бессимптомное
Правильность = 3
-

Вопрос № 250

Какие жалобы характерны для больных силикозом?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Одышка, сухой кашель, боли в груди
Правильность = 100
 - 2) Слабость, быстрая утомляемость, субфебрильная температура
Правильность = 1
 - 3) Пониженный аппетит, боли в подложечной области, тошнота, изжога
Правильность = 2
-

Вопрос № 251

Какой метод исследования наиболее приемлем для раннего диагноза силикотического процесса?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Клинико-рентгенологический
Правильность = 100
 - 2) Функциональный
Правильность = 1
 - 3) Лабораторный
Правильность = 2
 - 4) Цито-гистологический
Правильность = 3
-

Вопрос № 252

Какой критерий из нижеприведенных является определяющим в дифференциации цирротического туберкулеза и цирроза легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Клинические проявления интоксикации

- Правильность = 30
- 2) Обнаружение МБТ в мокроте
Правильность = 100
- 3) Анамнестические сведения
Правильность = 1
- 4) Рентгенологическая положительная динамика под влиянием пробной химиотерапии
Правильность = 2
-

Вопрос № 253

Какие физикальные признаки характерны для ателектаза доли легкого?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Тимпанит, влажные хрипы, жесткое дыхание
Правильность = 1
- 2) Усиленное везикулярное дыхание, сухие хрипы, перкуторный звук не изменен
Правильность = 2
- 3) Притупление перкуторного звука, ослабленное дыхание
Правильность = 100
-

Вопрос № 254

Какой путь распространения инфекции является ведущим в патогенезе туберкулезного менингита?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Гематогенный
Правильность = 100
- 2) Лимфогенный
Правильность = 1
- 3) Ликворогенный
Правильность = 2
- 4) Контактный
Правильность = 3
- 5) Гемато-ликворогенный
Правильность = 4
-

Вопрос № 255

Какой показатель свидетельствует о повышении давления в спинномозговой жидкости при тубменингите?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) 10-15 капель в минуту
Правильность = 1
- 2) 30-39 капель в минуту
Правильность = 2
- 3) 70-80 капель в 1 минуту
Правильность = 100
- 4) 50-59 капель в 1 минуту
Правильность = 3

Вопрос № 256

Какому заболеванию ЦНС наиболее характерны следующие лабораторные показатели ликвора: цитоз-сотни клеток в 1 мкл, белок-0,66-3,0 г/л, сахар 1,0-1,5 ммоль/л, хлориды-100-110 ммоль/л?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Опухоль
Правильность = 1
 - 2) Абсцесс
Правильность = 2
 - 3) Гнойный менингит
Правильность = 3
 - 4) Серозный (вирусный) менингит
Правильность = 4
 - 5) Туберкулезный менингит
Правильность = 100
-

Вопрос № 257

Какому заболеванию ЦНС наиболее характерны следующие данные: постепенное начало, головная боль, поражение VII, VIII пары черепно-мозговых нервов, парезы, картина застоя на глазном дне, в ликворе-белково-клеточная диссоциация, небольшое снижение сахара?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Опухоль
Правильность = 100
 - 2) Абсцесс
Правильность = 1
 - 3) Гнойный менингит
Правильность = 2
 - 4) Серозный (вирусный) менингит
Правильность = 3
 - 5) Туберкулезный менингит
Правильность = 4
 - 6) Инсульт
Правильность = 5
-

Вопрос № 258

Какие характеристики туберкулезного процесса включает клиническая классификация туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Фазу процесса, локализацию, бактериовыделение, остаточные изменения
Правильность = 1
- 2) Протяженность, локализацию, фазу процесса, бактериовыделение
Правильность = 2
- 3) Локализацию, фазу процесса, бактериовыделение, сопутствующие болезни

Правильность = 3

4) Форму, локализацию, фазу процесса, бактериовыделение, осложнения

Правильность = 100

Вопрос № 259

Какому заболеванию ЦНС наиболее характерны следующие данные: постепенное начало, фебрильная температура, головная боль, рвота, менингеальные симптомы, поражение черепно-мозговых нервов, в ликворе-нейтрофильный цитоз, грубая фибриновая пленка?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

1) Опухоль

Правильность = 1

2) Абсцесс

Правильность = 100

3) Туберкулезный менингит

Правильность = 2

4) Вирусный менингит

Правильность = 3

5) Инсульт

Правильность = 4

Вопрос № 260

Для какой патологии в легких характерны множественные круглые тени (фокусы и очаги)?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Опухоли доброкачественные

Правильность = 1

2) Злокачественные опухоли

Правильность = 2

3) Метастазы

Правильность = 100

4) Блокированные туберкулезные каверны

Правильность = 3

5) Инфаркт легкого

Правильность = 4

6) Эхинококковая киста

Правильность = 5

Вопрос № 261

Какие клинико-рентгенологические варианты диссеминированного туберкулеза легких выделяют?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Острый, подострый, туберкулезный сепсис

Правильность = 1

2) Острый, хронический, милиарный

Правильность = 2

3) Острый, подострый, хронический
Правильность = 100

Вопрос № 262

Для какого патологического процесса в легких не характерен рентгенологический синдром круглой тени?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Очаговая пневмония
Правильность = 1
 - 2) Злокачественные опухоли
Правильность = 2
 - 3) Коллагеноз
Правильность = 100
 - 4) Силикоз
Правильность = 3
 - 5) Сосудистые образования
Правильность = 4
-

Вопрос № 263

Для какой патологии в легких патогномично наличие тонкой серповидной полоски газа по верхнему краю круглой тени в виде воздушной шапочки?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Гемангиома
Правильность = 1
 - 2) Гамартохондрома
Правильность = 2
 - 3) Эхинококк
Правильность = 100
 - 4) Туберкулома
Правильность = 3
 - 5) Аспергилема
Правильность = 4
 - 6) Блокированная каверна
Правильность = 5
-

Вопрос № 264

Для какой патологии в легких патогномичны множественные костные включения в круглой тени?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Остеохондрома
Правильность = 100
- 2) Гемангиома
Правильность = 1
- 3) Гамартохондрома
Правильность = 2

- 4) Эхинококк
Правильность = 3
- 5) Туберкулома
Правильность = 4
- 6) Аспергилема
Правильность = 5
-

Вопрос № 265

Для какой патологии в легких патогномично перемещение округлой тени внутри полости при изменении положения тела?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Гемангиома
Правильность = 1
- 2) Гамартохондрома
Правильность = 2
- 3) Эхинококк
Правильность = 3
- 4) Туберкулома
Правильность = 4
- 5) Аспергилема
Правильность = 100
- 6) Распадающийся периферический рак
Правильность = 5
-

Вопрос № 266

Какие клинические симптомы наиболее типичны для пневмоторакса?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Боль в груди, одышка, цианоз
Правильность = 100
- 2) Одышка, кашель при перемене положения тела, акроцианоз
Правильность = 1
- 3) Боль в груди во время физического напряжения, кашель, одышка при небольшой физической нагрузке
Правильность = 40
-

Вопрос № 267

При какой патологии вполне возможно сохранение неизмененного просвета бронхов на всем их протяжении на фоне увеличенных внутригрудных лимфоузлов?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Туберкулез
Правильность = 1
- 2) Центральный рак
Правильность = 2
- 3) Лимфогрануломатоз
Правильность = 3

- 4) Саркоидоз
Правильность = 100
- 5) Пневмокониоз
Правильность = 4
- 6) Лимфосаркома
Правильность = 5
-

Вопрос № 268

Для какой патологии характерно субкапсулярное обызвествление лимфатических узлов корня легкого?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Силикотуберкулез
Правильность = 100
- 2) Первичный туберкулезный комплекс
Правильность = 1
- 3) Остеохондрома
Правильность = 2
- 4) Саркоидоз
Правильность = 3
- 5) Гистоплазмоз
Правильность = 4
-

Вопрос № 269

Наиболее значимый признак из перечисленных, отличающий фиброзно-кавернозную форму от кавернозной?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Наличие признаков исходной формы туберкулеза
Правильность = 1
- 2) Наличие фиброзной каверны, туберкулеза бронхов
Правильность = 2
- 3) Неоднократное бронхогенное обсеменение
Правильность = 100
-

Вопрос № 270

Какие симптомы являются наиболее типичными для начального периода тубменингита (первая неделя заболевания)?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Повышение температуры тела, головная боль, рвота, менингеальные знаки
Правильность = 100
- 2) Менингеальные симптомы, расстройство сознания, резкое снижение зрения
Правильность = 1
- 3) Тошнота, рвота при нормальной или субфебрильной температуре, расстройство психики
Правильность = 2
-

Вопрос № 271

Какой патологии более свойственны нечеткие, полициклические контуры корня легкого?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Первичный туберкулезный комплекс
Правильность = 1
 - 2) Туберкулез внутригрудных лимфоузлов
Правильность = 2
 - 3) Саркоидоз
Правильность = 3
 - 4) Центральный рак
Правильность = 100
 - 5) Пневмокониоз
Правильность = 4
 - 6) Лимфогрануломатоз
Правильность = 5
-

Вопрос № 272

Какие воспалительные реакции преобладают при фиброзно-кавернозном туберкулезе?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Специфические над неспецифическими
Правильность = 100
 - 2) Неспецифические над специфическими
Правильность = 1
 - 3) Специфические и неспецифические реакции выражены одинаково
Правильность = 2
-

Вопрос № 273

Какие патологические состояния исключаются при обнаружении на рентгенограмме нескольких или множественных пятнистых теней в легких?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Первичный туберкулезный комплекс
Правильность = 1
 - 2) Вторичные формы туберкулеза
Правильность = 2
 - 3) Доброкачественные опухоли
Правильность = 100
 - 4) Лимфогрануломатоз
Правильность = 3
 - 5) Пневмокониоз
Правильность = 4
-

Вопрос № 274

Какие изменения гемограммы наиболее характерны в период обострения фиброзно-кавернозного туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Гипохромная анемия и высокий цветной показатель
Правильность = 3
 - 2) Палочкоядерный сдвиг влево, лимфоцитоз, анемия
Правильность = 1
 - 3) Эозинофилия, тромбоцитопения, моноцитопения
Правильность = 2
 - 4) Лимфопения, моноцитоз, токсическая зернистость нейтрофилов
Правильность = 100
-

Вопрос № 275

Какое специфическое осложнение фиброзно-кавернозного туберкулеза встречается наиболее часто?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Туберкулез почек
Правильность = 1
 - 2) Туберкулез гортани
Правильность = 2
 - 3) Туберкулез бронхов
Правильность = 100
 - 4) Туберкулез кишечника
Правильность = 3
-

Вопрос № 276

Чем в первую очередь отличается медиастиноскопия от медиастинотомии?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Расширением показаний и сужением противопоказаний
Правильность = 1
 - 2) Частотой осложнений
Правильность = 2
 - 3) Доступом к средостению
Правильность = 100
 - 4) Разной диагностической эффективностью
Правильность = 3
-

Вопрос № 277

В каком ответе приведен наиболее полный перечень противопоказаний для плевроскопии?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Значительная патология в противоположном легком, облитерация плевральной полости, легочно-сердечная недостаточность
Правильность = 100
- 2) Нагноительные процессы в легких, эмфизема легких, дыхательная недостаточность

Правильность = 1

3) Диссеминированные процессы в легких, общие инфекционные заболевания, нарушение свертывания крови

Правильность = 2

Вопрос № 278

В каких случаях противопоказана трансторакальная игловая биопсия?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

1) При подозрении на аспергилему

Правильность = 1

2) При подозрении на доброкачественную опухоль

Правильность = 2

3) При подозрении на злокачественную опухоль

Правильность = 3

4) При подозрении на ангиому, паразитарную кисту

Правильность = 100

Вопрос № 279

Какой метод диагностики туберкулеза кожи и подкожной клетчатки является наиболее информативным?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

1) Иммунологический

Правильность = 1

2) Лабораторный

Правильность = 2

3) Гистологический

Правильность = 100

4) Туберкулинодиагностика

Правильность = 3

5) Радиологический

Правильность = 4

Вопрос № 280

Какой метод диагностики туберкулеза женских половых органов наиболее достоверен?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

1) Клинический

Правильность = 1

2) Метросальпингография

Правильность = 2

3) Бактериологический

Правильность = 100

4) Туберкулинодиагностика

Правильность = 3

Вопрос № 281

Какая форма туберкулеза почек встречается чаще всего?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Туберкулез почечной паренхимы
Правильность = 60
 - 2) Туберкулез почечных сосочков
Правильность = 100
 - 3) Кавернозная форма
Правильность = 2
 - 4) Фиброзно-склеротическая, фиброзно-кавернозная
Правильность = 3
 - 5) Инфильтративная
Правильность = 4
-

Вопрос № 282

Какая реакция на туберкулин чаще бывает у больных туберкулезом кожи?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Отрицательная
Правильность = 1
 - 2) Положительная
Правильность = 100
 - 3) Гиперергическая
Правильность = 2
 - 4) Сомнительная
Правильность = 3
-

Вопрос № 283

Какой метод диагностики туберкулезного мезаденита наиболее информативный?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Клинический
Правильность = 1
 - 2) Компьютерная томография
Правильность = 2
 - 3) Туберкулинодиагностика
Правильность = 3
 - 4) Гистологический
Правильность = 100
 - 5) Бактериологический
Правильность = 40
-

Вопрос № 284

Какой путь развития туберкулезного перитонита наиболее частый?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Контактный
Правильность = 1
 - 2) Алиментарный
Правильность = 2
 - 3) Лимфогематогенный
Правильность = 100
 - 4) Спυтогенный
Правильность = 3
-

Вопрос № 285

При каком туберкулезе чаще поражаются периферические лимфоузлы?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Первичном
Правильность = 100
 - 2) Вторичном
Правильность = 1
 - 3) В одинаковой степени
Правильность = 2
-

Вопрос № 286

Какие группы периферических лимфоузлов поражаются туберкулезом наиболее часто?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Паховые
Правильность = 1
 - 2) Подчелюстные
Правильность = 2
 - 3) Надключичные и подключичные
Правильность = 3
 - 4) Подмышечные
Правильность = 4
 - 5) Шейные
Правильность = 100
-

Вопрос № 287

Какой метод диагностики туберкулеза наружных лимфоузлов является наиболее информативным?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Клинический
Правильность = 1
- 2) Иммунологический
Правильность = 2
- 3) Гистологический
Правильность = 100
- 4) Рентгенологический
Правильность = 4

5) Туберкулинодиагностика
Правильность = 30

Вопрос № 288

В каких случаях из перечисленных бронхоскопия проводится по жизненным показаниям?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Массивная обтурация бронхиальных ветвей густой мокротой, кровью
Правильность = 100
 - 2) Приступ бронхиальной астмы, ложный круп
Правильность = 1
 - 3) Центральное расположение опухоли бронха
Правильность = 2
 - 4) Все перечисленные случаи
Правильность = 3
-

Вопрос № 289

Какие реакции на туберкулин наиболее характерны при туберкулезе периферических лимфоузлов?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Отрицательные
Правильность = 1
 - 2) Положительные
Правильность = 100
 - 3) Гиперергические
Правильность = 2
 - 4) Любые
Правильность = 3
-

Вопрос № 290

Какие кости и суставы поражаются туберкулезом чаще всего?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Кости и суставы конечностей, позвоночник
Правильность = 100
 - 2) Плоские кости
Правильность = 1
 - 3) Кости и суставы черепа и лица
Правильность = 2
 - 4) Кости и суставы таза
Правильность = 3
-

Вопрос № 291

Какой метод диагностики костно-суставного туберкулеза является ведущим?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Лабораторный
Правильность = 1
 - 2) Радиоизотопный
Правильность = 2
 - 3) Рентгенологический
Правильность = 100
 - 4) Туберкулинодиагностика
Правильность = 3
-

Вопрос № 292

Какое течение туберкулезных лимфаденитов встречается чаще?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Острое
Правильность = 1
 - 2) Подострое
Правильность = 100
 - 3) Хроническое
Правильность = 2
 - 4) Бессимптомное
Правильность = 3
-

Вопрос № 293

В каких сегментах чаще всего локализуется рак легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 1-2-3
Правильность = 1
 - 2) 4-5-6
Правильность = 2
 - 3) 2-3-6
Правильность = 3
 - 4) 2-6-10
Правильность = 4
 - 5) 3-8-10
Правильность = 100
-

Вопрос № 294

Какой рентгенологический признак периферического рака легких размером более 3см наиболее характерен?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Неровные наружные контуры
Правильность = 1
- 2) Четкие бугристые наружные контуры
Правильность = 100

- 3) Наличие отводящей "дорожки" к корню легкого
Правильность = 2
- 4) Нечеткие волнистые наружные контуры
Правильность = 3
-

Вопрос № 295

Что подразумевается под прямым признаком опухоли легких при бронхоскопии?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Выпячивание стенки бронха
Правильность = 1
- 2) Изъязвление и дефицит слизистой бронха
Правильность = 2
- 3) Ограничение подвижности бронха
Правильность = 3
- 4) Наличие опухоли в просвете бронха
Правильность = 100
- 5) Сужение и деформация просвета бронха
Правильность = 4
-

Вопрос № 296

Какая чувствительность к туберкулину чаще бывает при саркоидозе?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Всегда отрицательная
Правильность = 1
- 2) Положительная
Правильность = 2
- 3) Нет зависимости
Правильность = 3
- 4) Чаще положительная
Правильность = 4
- 5) Чаще отрицательная
Правильность = 100
-

Вопрос № 297

Для какого заболевания из перечисленных более характерен симптом сдавления органов при увеличении внутригрудных лимфоузлов?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Саркоидоз
Правильность = 100
- 2) Туберкулез
Правильность = 1
- 3) Пневмония
Правильность = 2
- 4) Кандидомикоз
Правильность = 3

Вопрос № 298

Для какого заболевания наиболее характерно наличие атрофического эндобронхита?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Туберкулез
Правильность = 1
 - 2) Саркоидоз
Правильность = 100
 - 3) Лимфогрануломатоз
Правильность = 2
 - 4) Пневмония
Правильность = 3
-

Вопрос № 299

Какая цитогистологическая находка подтверждает диагноз лимфогрануломатоза?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Обнаружение клеток Ходжкина
Правильность = 1
 - 2) Обнаружение клеток Пальтауера-Штернберга
Правильность = 2
 - 3) Обнаружение клеток Березовского-Штернберга
Правильность = 100
 - 4) Обнаружение клеток Пирогова-Лангханса
Правильность = 3
-

Вопрос № 300

На основании каких данных можно верифицировать диагноз саркоидоза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Рентгенологических
Правильность = 1
 - 2) Бактериологических
Правильность = 2
 - 3) Иммунологических
Правильность = 3
 - 4) Клинических
Правильность = 4
 - 5) Гистологических
Правильность = 100
-

Вопрос № 301

Какая гемограмма типична для саркоидоза?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Лейкопения, лимфопения, моноцитоз и увеличение СОЭ
Правильность = 100
 - 2) Лейкоцитоз, лимфоцитоз, анэозинофилия
Правильность = 1
 - 3) Лейкоцитоз, увеличение СОЭ, палочкоядерный сдвиг влево
Правильность = 2
 - 4) Лейкопения, лимфопения, моноцитоз, анемия, эозинофилия
Правильность = 3
-

Вопрос № 302

Через какие сроки от начала заболевания пневмонию следует считать затяжной?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Через 2-3 недели
Правильность = 1
 - 2) Свыше 6 недель
Правильность = 2
 - 3) Необходимо ориентироваться не на сроки, а на характер течения пневмонии и наличие осложнений
Правильность = 3
 - 4) Свыше 4 недель
Правильность = 100
-

Вопрос № 303

Какая группа внутригрудных лимфоузлов чаще поражается при саркоидозе?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Паратрахеальные
Правильность = 1
 - 2) Парааортальные
Правильность = 2
 - 3) Бифуркационные
Правильность = 3
 - 4) Бронхопульмональные
Правильность = 100
-

Вопрос № 304

Могут ли присутствовать клетки Пирогова-Лангханса в саркоидозной гранулеме?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Не могут
Правильность = 1
 - 2) Могут при сочетании туберкулеза и саркоидоза
Правильность = 2
 - 3) Могут
Правильность = 100
-

Вопрос № 305

Какая чувствительность к туберкулину чаще бывает при лимфогрануломатозе?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Всегда отрицательная
Правильность = 1
 - 2) Положительная
Правильность = 2
 - 3) Чаще положительная
Правильность = 3
 - 4) Чаще отрицательная
Правильность = 100
-

Вопрос № 306

Какие симптомы из перечисленных наиболее характерны для лимфогрануломатоза?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Лихорадка, слабость, потливость, увеличение лимфатических узлов, кожный зуд
Правильность = 100
 - 2) Увеличение печени и селезенки, слабость, потливость, лихорадка
Правильность = 1
 - 3) Частые пневмонии, слабость, потливость, боли в костях и суставах, кахексия
Правильность = 2
 - 4) Признаки амилоидоза внутренних органов, кашель, частые носовые кровотечения
Правильность = 3
-

Вопрос № 307

Какое исследование из перечисленных является основным для верификации лимфогрануломатоза?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Туберкулинодиагностика
Правильность = 1
 - 2) Клиническое
Правильность = 2
 - 3) Функциональное
Правильность = 3
 - 4) Иммунологическое
Правильность = 4
 - 5) Цитогистологическое
Правильность = 100
-

Вопрос № 308

Какая цитологическая картина характерна для лимфогрануломатоза?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Нейтрофилы, эозинофилы, лимфоциты, плазматические клетки, клетки Березовского-Штернберга
Правильность = 100
 - 2) Ретикулярные клетки, макрофаги, клетки Пирогова-Ланханса
Правильность = 1
 - 3) Макрофаги, эпителиоидные клетки, лимфоциты, клетки Березовского-Штернберга
Правильность = 2
-

Вопрос № 309

Для какого заболевания легких из перечисленных не типичен распад ткани?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Округлый туберкулезный инфильтрат
Правильность = 1
 - 2) Периферический рак
Правильность = 2
 - 3) Гемартохондрома
Правильность = 100
 - 4) Туберкулема
Правильность = 3
-

Вопрос № 310

Какая пневмония наиболее похожа по клинико-рентгенологической картине на казеозную пневмонию?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Вызванная вирусом СПИД
Правильность = 1
 - 2) Вирусная
Правильность = 2
 - 3) Пневмококковая
Правильность = 3
 - 4) Стафилококковая
Правильность = 4
 - 5) Фридендеровская
Правильность = 100
 - 6) Вирусно-бактериальная
Правильность = 5
-

Тема 4. Осложнения туберкулеза и его сочетание с другими болезнями

Вопрос № 1

В результате чего, как правило, развивается туберкулез у больных силикозом?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Несвоевременного прохождения флюорографии
Правильность = 1
 - 2) Несвоевременного проведения ревакцинации БЦЖ
Правильность = 2
 - 3) Обилия микобактерий в силикатической пыли
Правильность = 3
 - 4) Экзогенной суперинфекции микобактериями туберкулеза
Правильность = 4
 - 5) Эндогенной реактивации старых очагов туберкулеза
Правильность = 100
-

Вопрос № 2

Какова дальнейшая тактика при установлении рестриктивного типа вентиляционных нарушений у больного туберкулезом легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Консультация и наблюдение у аллерголога
Правильность = 1
 - 2) Подбор и проведение курса бронхолитической терапии
Правильность = 2
 - 3) Назначение эуфиллина, независимо от причин рестрикции
Правильность = 3
 - 4) Уточнение причин рестрикции, назначение антиоксидантов
Правильность = 100
-

Вопрос № 3

Возможно ли сочетание туберкулеза с лимфогрануломатозом?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Да
Правильность = 100
 - 2) Нет
Правильность = 1
 - 3) Только в терминальной стадии лимфогрануломатоза
Правильность = 2
-

Вопрос № 4

Какой дополнительный метод может быть полезен для топической диагностики и лечения легочного кровотечения?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Плевральная пункция
Правильность = 1
 - 2) Торакоскопия
Правильность = 2
 - 3) Фистулография
Правильность = 3
 - 4) Реопульмонография
Правильность = 4
 - 5) Бронхоскопия
Правильность = 100
-

Вопрос № 5

При каком количестве выделенной крови легочное кровотечение называется профузным?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Более 100 мл
Правильность = 1
 - 2) Более 200 мл
Правильность = 2
 - 3) Более 1000 мл
Правильность = 3
 - 4) Более 50 мл
Правильность = 4
 - 5) Более 500 мл
Правильность = 100
-

Вопрос № 6

Какой метод из перечисленных является дополнительным для топической диагностики легочного кровотечения?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Компьютерная томография
Правильность = 1
 - 2) Диагностическая торакоскопия
Правильность = 2
 - 3) Рентгенография
Правильность = 3
 - 4) Бронхиальная ангиография
Правильность = 100
-

Вопрос № 7

Признаками какого осложнения туберкулеза являются следующие симптомы: боли в груди, акроцианоз, нарастание одышки, исчезновение дыхательных шумов при аускультации, коробочный звук при перкуссии с одной стороны грудной клетки?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Закрытого пневмоторакса

- Правильность = 1
- 2) Открытого пневмоторакса
Правильность = 2
- 3) Искусственного пневмоторакса
Правильность = 3
- 4) Пневмоперитонеума
Правильность = 4
- 5) Клапанного пневмоторакса
Правильность = 100
-

Вопрос № 8

Как охарактеризовать ограничительные нарушения дыхания со снижением жизненной емкости легких без существенного снижения скоростей выдоха?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Обструктивный синдром
Правильность = 1
- 2) Синдром гиалиновых мембран
Правильность = 2
- 3) Синдром Хаммена-Рича
Правильность = 3
- 4) Легочно-сердечная недостаточность
Правильность = 4
- 5) Рестриктивный синдром
Правильность = 100
-

Вопрос № 9

Какое определение термина "дыхательная недостаточность" является наиболее полным и правильным?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Нарушение бронхиальной проходимости
Правильность = 1
- 2) Нарушение диффузионной способности альвеол
Правильность = 2
- 3) Расстройство гемодинамики малого круга кровообращения
Правильность = 3
- 4) Нарушение газотранспортной функции крови
Правильность = 4
- 5) Нарушение тканевого метаболизма кислорода
Правильность = 5
- 6) Нарушение вентиляции, транспорта и утилизации кислорода
Правильность = 100
-

Вопрос № 10

Какой метод самый информативный для диагностики спонтанного пневмоторакса?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Исследование функции внешнего дыхания
Правильность = 1
 - 2) Иммунологическое обследование
Правильность = 2
 - 3) Физикальное обследование
Правильность = 50
 - 4) Рентгенологическое обследование
Правильность = 100
-

Вопрос № 11

Возможно ли сочетание туберкулеза и саркоидоза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Да
Правильность = 100
 - 2) Нет
Правильность = 1
 - 3) Только в исключительных случаях
Правильность = 2
-

Вопрос № 12

Какие из патогенетических препаратов не рекомендуется назначать при сочетании туберкулеза с язвенной болезнью желудка и 12-ти перстной кишки?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Тималин
Правильность = 1
 - 2) Туберкулин
Правильность = 2
 - 3) Анаболические гормоны
Правильность = 3
 - 4) Плазмол
Правильность = 4
 - 5) Кортикостероидные гормоны
Правильность = 100
-

Вопрос № 13

Какие пути введения химиопрепаратов предпочтительны при язвенной болезни желудка у больных туберкулезом?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Внутривенный, ректальный
Правильность = 50
- 2) Парентеральный, ректальный, эндобронхиальный
Правильность = 100
- 3) Пероральный, внутривенный, внутримышечный
Правильность = 1
- 4) Не имеет значения

Правильность = 2

Вопрос № 14

Какие формы туберкулеза бронхов принято выделять?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Продуктивная, альтеративная, казеозная
Правильность = 1
 - 2) Язвенная, экссудативная
Правильность = 2
 - 3) Инфильтративная, язвенная
Правильность = 100
-

Вопрос № 15

Какой рак чаще всего присоединяется к туберкулезу легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Периферический
Правильность = 40
 - 2) Периферический, кавернозный
Правильность = 1
 - 3) Медиастинальный
Правильность = 2
 - 4) Внелегочной локализации с метастазами в легкие
Правильность = 3
 - 5) Центральный
Правильность = 100
-

Вопрос № 16

Какая реакция на туберкулин характерна для начального периода развития центрального рака легких у больных с неактивным туберкулезом внутригрудных лимфоузлов?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Отрицательная
Правильность = 1
 - 2) Гиперергическая
Правильность = 2
 - 3) Сомнительная
Правильность = 3
 - 4) Положительная
Правильность = 100
-

Вопрос № 17

Какие три проявления наиболее характерны при развитии рака легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Слабость, утомляемость, парестезии
Правильность = 1
 - 2) Потливость, субфебрилитет, продуктивный кашель
Правильность = 2
 - 3) Сухой кашель, одышка, кровохарканье
Правильность = 100
 - 4) Снижение аппетита, потеря веса, озноб
Правильность = 3
 - 5) Боли в груди, тошнота, фебрильная температура тела
Правильность = 4
-

Вопрос № 18

Оправдана ли выжидательная хирургическая тактика при выявлении центрально расположенной доброкачественной опухоли?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Да, если нет осложнений
Правильность = 1
 - 2) Оправдана, если доказан доброкачественный характер опухоли
Правильность = 2
 - 3) Не оправдана
Правильность = 100
-

Вопрос № 19

Какое отклонение в гемограмме наиболее характерно при развитии злокачественной опухоли у больных туберкулезом легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Лейкоцитоз
Правильность = 1
 - 2) Увеличение тромбоцитов
Правильность = 2
 - 3) Снижение тромбоцитов
Правильность = 3
 - 4) Лимфоцитоз
Правильность = 4
 - 5) Снижение гемоглобина
Правильность = 30
 - 6) Повышение СОЭ
Правильность = 100
-

Вопрос № 20

Какая жалоба наиболее характерна при развитии рака легких у больного туберкулезом?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Боль в груди
Правильность = 1

- 2) Потеря аппетита
Правильность = 2
 - 3) Нарастающая общая слабость
Правильность = 3
 - 4) Субфебрилитет
Правильность = 4
 - 5) Кровохарканье
Правильность = 100
-

Вопрос № 21

При какой форме туберкулеза из перечисленных рак легких развивается наиболее часто?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Диссеминированной
Правильность = 100
 - 2) Очаговой
Правильность = 1
 - 3) Инфильтративной
Правильность = 2
 - 4) Фиброзно-кавернозной
Правильность = 3
 - 5) Туберкулезе внутригрудных лимфоузлов
Правильность = 4
-

Вопрос № 22

Как часто отмечается развитие туберкулеза у больных силикозом III стадии?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) В 10-25% случаев
Правильность = 1
 - 2) В 50-60% случаев
Правильность = 2
 - 3) В 80-90% случаев
Правильность = 100
-

Вопрос № 23

Какая форма туберкулеза чаще развивается на фоне силикоза II стадии?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Очаговая
Правильность = 1
 - 2) Инфильтративная
Правильность = 2
 - 3) Нет закономерности (любая форма одинаково часто)
Правильность = 3
 - 4) Диссеминированная
Правильность = 100
-

Вопрос № 24

Как часто развивается туберкулёз у больных силикозом II стадии?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) В 10-25% случаев
Правильность = 1
 - 2) В 50-60% случаев
Правильность = 100
 - 3) В 80-90% случаев
Правильность = 2
-

Вопрос № 25

Как часто развивается туберкулёз у больных силикозом I стадии?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) В 10-25% случаев
Правильность = 100
 - 2) В 50-60% случаев
Правильность = 1
 - 3) В 80-90% случаев
Правильность = 2
-

Вопрос № 26

Какое определение аспергиллеза наиболее правильное?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Хроническое заболевание, обусловленное различными видами факультативно-патогенных плесневых грибов-аспергиллов
Правильность = 100
 - 2) Заболевание легких, вызванное плесневыми грибами
Правильность = 1
 - 3) Острое заболевание легких, возникшее на фоне иммунодефицита в результате инфицирования возбудителем аспергиллеза
Правильность = 2
-

Вопрос № 27

Является ли обнаружение атипичных клеток в мокроте больного туберкулезом достоверным свидетельством развития рака легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Да
Правильность = 1
- 2) Нет
Правильность = 100
- 3) Только у больных пожилого и старческого возраста
Правильность = 2

Вопрос № 28

В чем заключается причина учащения пневмомикозов в последние годы?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Более широкое применение антибиотиков
Правильность = 100
 - 2) Ухудшение экологической обстановки
Правильность = 1
 - 3) Наличие условно патогенных грибковых возбудителей на слизистых дыхательных путях
Правильность = 2
-

Вопрос № 29

Как изменяется клиническая картина при присоединении к силикозу туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Появляются симптомы интоксикации
Правильность = 100
 - 2) Усиливается кашель с выделением мокроты
Правильность = 1
 - 3) Усиливается одышка, боли в груди при кашле
Правильность = 2
-

Вопрос № 30

Какой наиболее частый этиологический фактор пневмомикоза легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Дрожжеподобные грибы рода Кандида
Правильность = 100
 - 2) Плесневые грибы пенициллы
Правильность = 1
 - 3) Грибы - актиномицеты
Правильность = 2
 - 4) Грибы - аспергиллы
Правильность = 30
-

Вопрос № 31

К какому пневмомикозу относится кандидопневмония, развившаяся у больного туберкулезом легких на фоне длительной антибиотикотерапии?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Первичному
Правильность = 1
- 2) Вторичному
Правильность = 100

Вопрос № 32

Какие изменения показателей при исследовании антитоксической функции печени более характерны для паренхиматозного гепатита?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Повышение содержания непрямого билирубина и трансаминаз
Правильность = 100
 - 2) Повышение уровня прямого билирубина при нормальном уровне трансаминаз
Правильность = 1
 - 3) Нормальное содержание билирубина при сниженной концентрации трансаминаз
Правильность = 2
-

Вопрос № 33

Какие признаки более характерны для легочного кровотечения?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Кровь алая, пенная выделяется с кашлем и мокротой
Правильность = 100
 - 2) Кровь темная, с примесью желудочного содержимого
Правильность = 1
 - 3) Ярко-красная кровь, стекающая по задней стенке носоглотки
Правильность = 2
-

Вопрос № 34

В каких случаях выделение крови из дыхательных путей следует отнести к легочному кровотечению в отличие от кровохаркания?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Одномоментное выделение более 50мл крови
Правильность = 1
 - 2) Выделение крови отдельными плевками на протяжении длительного времени
Правильность = 2
 - 3) Откашливание крови в чистом виде
Правильность = 100
-

Вопрос № 35

Какие патогенетические механизмы играют ведущую роль в возникновении легочного кровотечения при туберкулезе легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Нарушение целостности стенки кровеносных сосудов
Правильность = 100
- 2) Патологические нарушения токсико-аллергического характера
Правильность = 1
- 3) Вазомоторные нарушения в результате дисфункции вегетативной нервной системы

Правильность = 2

4) Нарушение диапедеза сосудистой стенки

Правильность = 3

5) Правильны все ответы

Правильность = 4

Вопрос № 36

При каком генезе диссеминированного туберкулеза легких наиболее часто развиваются внелегочные поражения?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Лимфогенном

Правильность = 1

2) Гематогенном

Правильность = 100

3) Бронхогенном

Правильность = 2

4) Контактном

Правильность = 3

Вопрос № 37

Какой вид пневмоторакса наиболее опасный?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Открытый пневмоторакс

Правильность = 1

2) Закрытый пневмоторакс

Правильность = 2

3) Клапанный пневмоторакс

Правильность = 100

4) Травматический пневмоторакс с переломом ребер

Правильность = 3

Вопрос № 38

Какое осложнение первичного туберкулеза из перечисленных встречается наиболее часто?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Легочное кровотечение

Правильность = 1

2) Плеврит

Правильность = 100

3) Спонтанный пневмоторакс

Правильность = 2

4) Менингоэнцефалит

Правильность = 3

5) Генерализация процесса

Правильность = 4

Вопрос № 39

Какие факторы наиболее часто способствуют возникновению легочных кровотечений?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Повышение давления в системе малого круга кровообращения
Правильность = 100
 - 2) Нарушение свертываемости крови
Правильность = 1
 - 3) Гипертермия
Правильность = 2
 - 4) Гипертоническая болезнь
Правильность = 3
 - 5) Все перечисленные факторы
Правильность = 4
-

Вопрос № 40

Какова частота развития легочного сердца у контингентов больных туберкулезом на современном этапе?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 5% - 10%
Правильность = 1
 - 2) 20% - 30%
Правильность = 100
 - 3) 40% - 60%
Правильность = 2
 - 4) 60% - 70%
Правильность = 3
-

Вопрос № 41

Какие рентгенологические признаки наиболее характерны для пневмоторакса?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Отсутствие легочного рисунка, наличие контура поджатого легкого, смещение органов средостения в противоположную сторону
Правильность = 100
 - 2) Ячеистый легочный рисунок, горизонтальный уровень в нижних отделах грудной клетки, смещение органов средостения в сторону пневмоторакса
Правильность = 1
 - 3) Наличие контура поджатого легкого, отсутствие легочного рисунка, смещение органов средостения в сторону пневмоторакса
Правильность = 2
-

Вопрос № 42

Какие причины из перечисленных чаще вызывают развитие пневмоторакса у больных туберкулезом легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Субплеврально расположенная каверна, буллезная эмфизема
Правильность = 100
 - 2) Крупные казеозные очаги
Правильность = 1
 - 3) Сопутствующие туберкулезу болезни: поликистоз, абсцесс, бронхоэктазы
Правильность = 2
 - 4) Посттуберкулезный плевропневмофиброз
Правильность = 3
-

Вопрос № 43

Какие физикальные признаки наиболее типичны для пневмоторакса?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Тимпанит при перкуссии, отсутствие голосового дрожания, дыхание ослаблено или не прослушивается
Правильность = 100
 - 2) Укорочение перкуторного звука, отсутствие дыхания и голосового дрожания, влажные хрипы
Правильность = 1
 - 3) Дыхание ослаблено или не прослушивается, тимпанит, крепитация, болезненность при пальпации
Правильность = 2
-

Вопрос № 44

Какие клинические симптомы наиболее типичны для пневмоторакса?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Боль в груди, одышка, цианоз
Правильность = 100
 - 2) Одышка, кашель при перемене положения тела, акроцианоз
Правильность = 1
 - 3) Боль в груди только во время физического напряжения, кашель, одышка при физической нагрузке
Правильность = 2
-

Вопрос № 45

Какие проявления являются наиболее патогномичными для аспергиллемы легких?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Повторные кровохарканья, обнаружение в мокроте серовато-зеленых хлопьев
Правильность = 100
- 2) Боли в груди, кашель, одышка
Правильность = 1
- 3) Опухолеподобное затемнение на рентгенограмме
Правильность = 2

4) Обильная жидкая мокрота
Правильность = 3

Вопрос № 46

Для какой формы рака рентгенологически характерно резкое расширение тени средостения?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Саркома легкого
Правильность = 1
 - 2) Полостная форма рака легкого
Правильность = 2
 - 3) Периферический рак с метастазами
Правильность = 3
 - 4) Рак средостения
Правильность = 100
 - 5) Центральный рак легкого
Правильность = 4
-

Вопрос № 47

Какой рак легких из перечисленных по морфологической структуре наиболее неблагоприятный в своем течении?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Железистый
Правильность = 1
 - 2) Плоскоклеточный с ороговением
Правильность = 2
 - 3) Плоскоклеточный без ороговения
Правильность = 3
 - 4) Крупноклеточный
Правильность = 4
 - 5) Мелкоклеточный
Правильность = 100
-

Вопрос № 48

В какой орган чаще всего метастазирует рак легких?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Желудок
Правильность = 1
- 2) Печень
Правильность = 100
- 3) Поджелудочная железа
Правильность = 2
- 4) Надпочечники
Правильность = 3
- 5) Мочевой пузырь

Правильность = 4

6) Кишечник

Правильность = 5

Вопрос № 49

Чем определяется стадия клинического течения периферических доброкачественных опухолей легких?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

1) Степенью сдавления окружающих тканей и органов

Правильность = 100

2) Размером опухоли

Правильность = 1

3) Степенью отграничения опухоли от окружающих тканей и органов

Правильность = 2

4) Выраженностью инвазивного роста

Правильность = 3

Вопрос № 50

Чем определяется стадия клинического течения центральных доброкачественных опухолей легких?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

1) Размером опухоли

Правильность = 1

2) Наличием или отсутствием осложнений

Правильность = 2

3) Степенью нарушения бронхиальной проходимости

Правильность = 100

4) Калибром пораженного бронха

Правильность = 3

5) Гистологическим строением опухоли

Правильность = 4

Вопрос № 51

Какие ХНЗЛ наиболее часто встречаются у больных фибринозно-кавернозным туберкулезом?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Бронхоэктатическая болезнь

Правильность = 1

2) Острые бронхиты, хронические пневмонии, пневмосклероз

Правильность = 2

3) Хронический бронхит, эмфизема

Правильность = 100

4) Затяжные пневмонии, хронические абсцессы

Правильность = 3

Вопрос № 52

Сколько времени необходимо для развития хронического легочного сердца?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Месяцы, годы
Правильность = 100
 - 2) Дни, недели
Правильность = 1
 - 3) Несколько недель
Правильность = 2
-

Вопрос № 53

За какое примерно время может развиваться острое легочное сердце?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) За годы
Правильность = 1
 - 2) За месяцы
Правильность = 2
 - 3) За дни, недели
Правильность = 100
-

Вопрос № 54

Какой физикальный признак более характерен для декомпенсированного легочного сердца?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Пульсация в прекардиальной области
Правильность = 1
 - 2) Одышка при физической нагрузке
Правильность = 2
 - 3) Переход одышки при физической нагрузке в одышку в покое
Правильность = 100
 - 4) Акцент второго тона над легочной артерией
Правильность = 3
-

Вопрос № 55

Какой вид цианоза более характерен для правожелудочковой недостаточности?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Акроцианоз
Правильность = 1
- 2) Диффузный цианоз
Правильность = 100
- 3) Любой из перечисленных
Правильность = 2

Вопрос № 56

Какой вид цианоза более характерен для левожелудочковой недостаточности в отличие от правожелудочковой?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Акроцианоз, холодный цианоз
Правильность = 100
 - 2) Диффузный цианоз, теплый цианоз
Правильность = 1
 - 3) Любой из перечисленных
Правильность = 2
-

Вопрос № 57

Для какого вида сердечной недостаточности более характерно развитие мерцательной аритмии и отечности нижних конечностей?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Для правожелудочковой
Правильность = 1
 - 2) Для левожелудочковой
Правильность = 100
 - 3) Для обоих видов
Правильность = 2
-

Вопрос № 58

Какое специфическое осложнение кавернозного туберкулеза легких из перечисленных встречается чаще?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Туберкулезный плеврит
Правильность = 1
 - 2) Туберкулез бронхов
Правильность = 100
 - 3) Туберкулез гортани
Правильность = 2
 - 4) Туберкулез кишечника
Правильность = 3
 - 5) Бронхогенное обсеменение другого легкого
Правильность = 4
-

Вопрос № 59

Какие осложнения из перечисленных чаще встречаются у больных кавернозным туберкулезом легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Ателектаз
Правильность = 1
 - 2) Спонтанный пневмоторакс
Правильность = 2
 - 3) Легочно-сердечная недостаточность
Правильность = 3
 - 4) Кровохарканье
Правильность = 100
 - 5) Амилоидоз
Правильность = 4
-

Вопрос № 60

Какие изменения в гемограмме типичны для почечной недостаточности?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Анемия, лейкоцитоз, нейтрофильный сдвиг
Правильность = 100
 - 2) Анемия, лейкопения, нарастание СОЭ
Правильность = 1
 - 3) Лейкоцитоз, увеличение СОЭ, тромбоцитопения
Правильность = 2
-

Вопрос № 61

Какое изменение концентрации натрия в крови характерно для почечной недостаточности?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Уменьшение концентрации
Правильность = 100
 - 2) Нормальное содержание натрия
Правильность = 1
 - 3) Увеличение концентрации
Правильность = 2
-

Вопрос № 62

Какое изменение концентрации калия в крови характерно для почечной недостаточности?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Гипокалиемия
Правильность = 1
 - 2) Гиперкалиемия
Правильность = 100
 - 3) Нормальное содержания калия
Правильность = 2
-

Вопрос № 63

Какие показатели креатинина типичны для начинающейся почечной недостаточности?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) 0,050-0,150 ммоль/л
Правильность = 1
 - 2) 0,176-0,440 ммоль/л
Правильность = 100
 - 3) 0,520-0,640 ммоль/л
Правильность = 2
-

Вопрос № 64

Какие показатели мочевины типичны для начинающейся почечной недостаточности?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) 15,0-20,0 ммоль/л
Правильность = 1
 - 2) 8,3-13,3 ммоль/л
Правильность = 100
 - 3) 6,0-8,1 ммоль/л
Правильность = 2
 - 4) 2,0-4,9 ммоль/л
Правильность = 3
-

Тема 5. Лечение туберкулеза, его осложнений и основных нетуберкулезных болезней органов дыхания

Вопрос № 1

Какие препараты растительного происхождения относятся к группе биогенных стимуляторов?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Алоэ, фибс, гумизоль
Правильность = 100
 - 2) Лидаза, метацил, плазмол
Правильность = 1
 - 3) Полиглюкин, реополиглюкин
Правильность = 2
 - 4) Гемодез
Правильность = 3
-

Вопрос № 2

Какие из перечисленных препаратов предпочтительнее включать в комплексное лечение больных туберкулезом старческого возраста?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Инсулин, новокаин, декамевит
Правильность = 100
 - 2) Анаболические гормоны, алоэ, плазмол
Правильность = 1
 - 3) Гемодез, полиглюкин, реополиглюкин
Правильность = 2
-

Вопрос № 3

Какие из нижеприведенных препаратов переливают с целью стимуляции обменных процессов?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Плазма крови, альбумин, аминокровин
Правильность = 100
 - 2) Полиглюкин, реополиглюкин
Правильность = 1
 - 3) Эритроцитарную массу
Правильность = 2
 - 4) Гемодез
Правильность = 3
-

Вопрос № 4

Какие методы искусственной физиотерапии получили наиболее широкое применение во фтизиатрической клинике при лечении туберкулеза легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Солюкс, ультрафиолетовое облучение, УВЧ
Правильность = 1
 - 2) Диадинамик, УФО
Правильность = 2
 - 3) Лекарственный электрофорез, ультразвук, тканевой электрофорез
Правильность = 100
-

Вопрос № 5

К какой группе, в соответствии с их действием на организм относятся альдостерон и дезоксикортикостерон?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Минералокортикоиды
Правильность = 100
 - 2) Глюкокортикоиды
Правильность = 1
 - 3) Анаболические гормоны
Правильность = 2
-

Вопрос № 6

На каком этапе лечения показана кортикостероидная терапия?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) В начале лечения при выраженной экссудативной реакции
Правильность = 100
 - 2) В фазе рассасывания, когда организм начинает справляться с тубинфекцией
Правильность = 1
 - 3) При замедлении положительной динамики процесса
Правильность = 2
-

Вопрос № 7

Каков основной механизм воздействия кортикостероидной терапии на патологический процесс?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Уменьшение воспаления
Правильность = 100
 - 2) Усиление вялотекущего воспаления
Правильность = 1
 - 3) Стимуляция репаративных процессов в тканях
Правильность = 2
-

Вопрос № 8

Каков механизм воздействия на нормализацию окислительно-восстановительных процессов в тканях лечения с применением АТФ?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Прямой
Правильность = 1
 - 2) Опосредованный путем стимулирования синтеза кокарбоксилазы
Правильность = 100
 - 3) Прямой и опосредованный
Правильность = 2
-

Вопрос № 9

По какой методике применяется туберкулин с целью стимуляции в комплексном лечении туберкулеза у взрослых больных?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) По методике Мирзояна
Правильность = 100
 - 2) По методике Буниной
Правильность = 1
 - 3) По методике Эпштейна
Правильность = 2
-

Вопрос № 10

Какой препарат относится к специфическим стимуляторам, применяемым в комплексном лечении туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Пирогенал
Правильность = 1
 - 2) Туберкулин
Правильность = 100
 - 3) Алоэ
Правильность = 2
 - 4) Продигиозан
Правильность = 3
 - 5) Фибс
Правильность = 4
-

Вопрос № 11

Какой вид воздействия на организм больного оказывает применение инсулина в комплексном лечении туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Повышает утилизацию глюкозы в тканях
Правильность = 100
- 2) Стимулирует процессы тканевого метаболизма
Правильность = 1
- 3) Благоотворно влияет на различные отделы ЦНС и вегетативной

нервной системы и тем самым повышает желудочную секрецию и кислотность желудочного сока, снижая побочные реакции химиотерапии

Правильность = 2

Вопрос № 12

С какой целью используются гемотрансфузии одногруппной крови во фтизиатрии?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Десенсибилизирующей

Правильность = 1

2) Стимулирующей

Правильность = 2

3) Заместительной, гемостатической

Правильность = 100

Вопрос № 13

Какие лекарственные средства из перечисленных относятся к препаратам тканевой терапии, применяемым в комплексном лечении туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Плазмол, взвесь плаценты

Правильность = 100

2) Экстракт алоэ, фибс

Правильность = 1

3) Пирогенал, продигиозан

Правильность = 2

Вопрос № 14

На каком этапе комплексного лечения туберкулеза легких следует применять биогенные стимуляторы?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) В начале лечения при выраженных экссудативных проявлениях

Правильность = 1

2) На заключительном этапе химиотерапии

Правильность = 2

3) После двухмесячной предварительной химиотерапии при замедленной рентгенодинамике

Правильность = 100

Вопрос № 15

Каковы наиболее значимые, контролируемые лабораторией, противопоказания к назначению гепарина в комплексном лечении туберкулеза?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

1) Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки

- Правильность = 1
- 2) Острый гепатит, острый нефрит
Правильность = 2
- 3) Апластическая и гипопластическая анемия
Правильность = 3
- 4) Все перечисленные
Правильность = 4
- 5) Кровохарканье
Правильность = 5
- 6) Изменения коагулограммы, свидетельствующие о пониженной свертываемости крови
Правильность = 100
-

Вопрос № 16

На каком этапе основного курса химиотерапии рекомендуется применение гепарина в комплексном лечении туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) На этапе рассасывания туберкулезных бугорков
Правильность = 1
- 2) На этапе рубцевания
Правильность = 2
- 3) Первые два месяца химиотерапии
Правильность = 100
-

Вопрос № 17

Какие основные свойства гепарина обуславливают показания к его назначению в комплексном лечении туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Антигистаминное, антикоагуляционное
Правильность = 1
- 2) Потенцирующее действие антибиотиков
Правильность = 2
- 3) Потенцирующее действие химиопрепаратов
Правильность = 3
- 4) Противовоспалительное, улучшает микроциркуляцию, десенсибилизирующее
Правильность = 100
-

Вопрос № 18

Какой вид воздействия оказывают в организме больного препараты кокаборсилазы, АТФ и липоевой кислоты?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Стимулируют белковый обмен
Правильность = 1
- 2) Стимулируют жировой обмен
Правильность = 2
- 3) Стимулируют углеводный обмен

Правильность = 3

4) Стимулируют энергетический обмен

Правильность = 100

Вопрос № 19

Каковы должны быть сроки лечения в местных санаториях после стационарного этапа больных туберкулезом легких без распада?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) 1 - 2 мес.

Правильность = 100

2) 3 - 4 мес.

Правильность = 1

3) 5 - 6 мес.

Правильность = 2

4) 6 - 7 мес.

Правильность = 3

Вопрос № 20

Каким гормональным препаратам отдается предпочтение при лечении туберкулеза в сочетании с сахарным диабетом?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

1) Гидрокортизон, преднизолон, преднизон

Правильность = 1

2) Урбазон, метипред

Правильность = 100

Вопрос № 21

Какому гормональному препарату отдается предпочтение при лечении туберкулеза, сочетающегося с сердечно-сосудистой декомпенсацией, так как он потенцирует диурез?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

1) Преднизолон

Правильность = 1

2) Триамцинолон

Правильность = 100

3) Дексаметазон

Правильность = 2

4) Ретаболил

Правильность = 3

Вопрос № 22

Какие препараты из нижеперечисленных относятся к глюкокортикоидам?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Альдостерон
Правильность = 1
 - 2) Дезоксикортикостерон
Правильность = 2
 - 3) Кортизон, кортизол
Правильность = 100
-

Вопрос № 23

При каких формах туберкулеза из перечисленных наиболее показана кортикостероидная терапия глюкокортикоидами?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Очаговый туберкулез легких
Правильность = 1
 - 2) Фиброзно-кавернозный туберкулез легких
Правильность = 2
 - 3) Хр. диссеминированный туберкулез легких
Правильность = 3
 - 4) Туберкулез внутригрудных лимфоузлов
Правильность = 100
-

Вопрос № 24

Какие состояния и сопутствующие заболевания относятся к противопоказаниям для назначения кортикостероидной терапии?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Эндокринные и психические заболевания
Правильность = 1
 - 2) Туберкулезная эмпиема
Правильность = 2
 - 3) Декомпенсация сердечной деятельности, болезнь Иценко-Кушинга
Правильность = 100
-

Вопрос № 25

При лечении каких форм туберкулеза назначение кортикостероидов является обязательным даже при наличии противопоказаний?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Менингоэнцефалит
Правильность = 100
- 2) Лимфаденит
Правильность = 1
- 3) Острые деструктивные формы туберкулеза легких
Правильность = 2
- 4) Цирротический туберкулез легких
Правильность = 3
- 5) Первичные формы туберкулеза у детей и подростков
Правильность = 4

Вопрос № 26

Какие аэрозольные установки позволяют получить высокодисперсную, однородную аэрозоль?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Турбоингаляторы
Правильность = 1
 - 2) Пневматические
Правильность = 2
 - 3) Ингаляторы индивидуального пользования
Правильность = 3
 - 4) Все перечисленные
Правильность = 4
 - 5) Ультразвуковые
Правильность = 100
-

Вопрос № 27

В каких случаях из перечисленных нецелесообразно назначать протеолитические ферменты в комплексном местном лечении туберкулеза бронхов?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) При язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки
Правильность = 100
 - 2) При свищевых формах туберкулеза бронхов
Правильность = 1
 - 3) При стенозах бронхов 1-2 степени
Правильность = 2
-

Вопрос № 28

Какой противотуберкулезный препарат предпочтительно включать в схему лечения больных туберкулезом с массивным казеозным поражением лимфоузлов?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Рифампицин
Правильность = 1
 - 2) Изониазид
Правильность = 2
 - 3) Протионамид
Правильность = 3
 - 4) Этамбутол
Правильность = 4
 - 5) Тибон
Правильность = 5
 - 6) Пиразинамид
Правильность = 100
-

Вопрос № 29

Каково действие кортикостероидных гормонов?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Противовоспалительное, иммуностимулирующее
Правильность = 1
 - 2) Иммуностимулирующее, анаболическое
Правильность = 2
 - 3) Иммуномодулирующее, анаболическое, противовоспалительное
Правильность = 3
 - 4) Противовоспалительное, десенсибилизирующее, иммунодепрессивное
Правильность = 100
-

Вопрос № 30

Какова средняя терапевтическая доза гидрокортизона в комплексном лечении туберкулеза у взрослых?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 5 - 10 мг
Правильность = 1
 - 2) 25 - 75 мг
Правильность = 100
 - 3) 75 - 100 мг
Правильность = 1
 - 4) 100 - 150 мг
Правильность = 2
-

Вопрос № 31

Какова средняя терапевтическая доза преднизолона в комплексном лечении туберкулеза легких у взрослых?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 10-15 мг
Правильность = 1
 - 2) 40-60 мг
Правильность = 2
 - 3) 60-80 мг
Правильность = 3
 - 4) 20-40 мг
Правильность = 100
-

Вопрос № 32

Каковы показания (из перечисленных) для назначения кортикостероидных гормонов при туберкулезе легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Хронически текущий туберкулез

- Правильность = 1
- 2) Деструктивный туберкулез
Правильность = 2
- 3) Плохая переносимость химиотерапии (токсические реакции)
Правильность = 3
- 4) Выраженная экссудативная реакция, сопутствующие аллергические реакции
Правильность = 100
-

Вопрос № 33

Действие каких противотуберкулезных препаратов потенцирует пиразинамид?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Рифампицина, ПАСК
Правильность = 1
- 2) Рифампицина, циклосерина
Правильность = 2
- 3) Этамбулона, тибона
Правильность = 3
- 4) ГИНК, стрептомицина, этионамида
Правильность = 100
-

Вопрос № 34

Каким преимущественно действием на МБТ обладает пиразинамид?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Преимущественно внеклеточным действием
Правильность = 1
- 2) Вне- и внутриклеточным действием в одинаковой степени
Правильность = 2
- 3) Преимущественно внутриклеточным действием
Правильность = 100
-

Вопрос № 35

Какова суточная доза пиразинамида (пирафата) взрослым больным туберкулезом среднего возраста и средней массы тела (60-70кг)?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 1,0
Правильность = 1
- 2) 1,0 - 1,25
Правильность = 2
- 3) 1,5 - 2,5
Правильность = 100
- 4) 3,0
Правильность = 3
-

Вопрос № 36

Какое побочное действие пиразинамида встречается чаще других?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Ототоксичное
Правильность = 1
 - 2) Нефротоксичное
Правильность = 2
 - 3) Нейротоксичное
Правильность = 3
 - 4) Гепатотоксичное
Правильность = 100
-

Вопрос № 37

Каким преимущественно действием на МБТ обладает этамбутол?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Внутриклеточным
Правильность = 1
 - 2) Внеклеточным
Правильность = 2
 - 3) Внутриклеточным и внеклеточным
Правильность = 100
-

Вопрос № 38

Какие препараты предупреждают развитие осложнений при лечении пиразинамидом?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Тиамин, рибофлавин, токоферол
Правильность = 1
 - 2) Но-шпа, аллахол, пипольфен
Правильность = 2
 - 3) Пантотенат кальция, холензим, аллохол
Правильность = 3
 - 4) Пиридоксин, цианокобаламин, витамин С
Правильность = 100
-

Вопрос № 39

Каковы противопоказания для назначения пиразинамида?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Выраженный атеросклероз, нарушения мозгового кровообращения
Правильность = 1
- 2) Невриты, психические нарушения
Правильность = 2
- 3) Алкоголизм, эпилепсия
Правильность = 3
- 4) Нарушение функции печени и почек, мочекислый диатез

Правильность = 100

Вопрос № 40

Через какое время от начала химиотерапии деструктивных свежих ограниченных форм туберкулеза наиболее целесообразно накладывать искусственный пневмоторакс при неэффективности лечения?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) 2 - 3 недели

Правильность = 1

2) 8 - 9 недель

Правильность = 100

3) 4 - 5 месяцев

Правильность = 2

4) 6 - 8 месяцев

Правильность = 3

Вопрос № 41

Почему лечение больных туберкулезом должно быть комплексным?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Туберкулез - заболевание инфекционное

Правильность = 1

2) Имеется выраженная тубинтоксикация

Правильность = 2

3) Имеется высокая сенсбилизация организма

Правильность = 3

4) Резко снижены защитные силы организма

Правильность = 4

5) Туберкулез - заболевание всего организма

Правильность = 100

Вопрос № 42

Какое самое опасное осложнение может развиваться при наложении искусственного пневмоторакса или пневмоперитонеума?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Подкожная эмфизема

Правильность = 1

2) Ателектаз легкого

Правильность = 2

3) Профузное кровотечение

Правильность = 3

4) Анафилактический шок

Правильность = 4

5) Пневмоплеврит, пневмоперитонит

Правильность = 5

6) Газовая эмболия

Правильность = 100

Вопрос № 43

Какое место прокола брюшной стенки при наложении пневмоперитонеума наиболее безопасно?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Левый верхний квадрат живота на 2-3 см ниже реберного края
Правильность = 1
 - 2) Правый верхний квадрат на 2-3 см ниже реберного края
Правильность = 2
 - 3) Левый край прямой мышцы живота на 2-3 см ниже пупка
Правильность = 100
 - 4) Правый край прямой мышцы живота на 2-3 см ниже пупка
Правильность = 3
-

Вопрос № 44

Является ли сахарный диабет противопоказанием для наложения искусственного пневмоторакса при кавернозном туберкулезе?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Да
Правильность = 1
 - 2) Да, только при тяжелых формах сахарного диабета
Правильность = 2
 - 3) Нет
Правильность = 100
-

Вопрос № 45

Является ли беременность противопоказанием для наложения искусственного пневмоторакса при ограниченном инфильтративном туберкулезе в фазе распада?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Да
Правильность = 1
 - 2) Да, только с шестого месяца беременности
Правильность = 2
 - 3) Нет
Правильность = 100
-

Вопрос № 46

При какой форме туберкулеза из перечисленных наиболее показано наложение искусственного пневмоторакса?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Казеозная пневмония

- Правильность = 1
- 2) Диссеминированная в фазе распада
Правильность = 2
- 3) Инфильтративная с поражением бронхов
Правильность = 3
- 4) Туберкулома с распадом
Правильность = 3
- 5) Инфильтративная в фазе распада
Правильность = 100
-

Вопрос № 47

Показано ли назначение туберкулина при анергии?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Да
Правильность = 1
- 2) Показано в отдельных случаях
Правильность = 2
- 3) Нет
Правильность = 100
-

Вопрос № 48

К какой группе патогенетических средств относится туберкулин?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Иммуномодулятор
Правильность = 50
- 2) Иммунодепрессант
Правильность = 1
- 3) Специфический иммуномодулятор
Правильность = 100
- 4) Неспецифический иммунодепрессант
Правильность = 2
-

Вопрос № 49

Каким действием обладает преднизолон?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Катаболическим
Правильность = 100
- 2) Анаболическим
Правильность = 1
- 3) Смешанным
Правильность = 2
-

Вопрос № 50

Как вводят туберкулин при туберкулинотерапии?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Внутримышечно
Правильность = 1
 - 2) Подкожно
Правильность = 100
 - 3) Внутрикожно
Правильность = 2
-

Вопрос № 51

Каковы противопоказания к назначению кумыса?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Туберкулез в сочетании с сахарным диабетом, гастритом
Правильность = 1
 - 2) Остро протекающий туберкулез, обострение хронических распространенных деструктивных форм, активный туберкулез глаз, экссудативные плевриты, кровохарканье
Правильность = 100
 - 3) Туберкулез органов дыхания в период заживления
Правильность = 2
-

Вопрос № 52

Каковы показания к лечению кумысом?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Активный туберкулез легких, костей и суставов, лимфоузлов
Правильность = 1
 - 2) Все формы туберкулеза легких в период умеренного обострения или затихания, при сопутствующих туберкулезу сахарном диабете, гастритах, хронических неспецифических болезнях легких
Правильность = 100
 - 3) Плохая переносимость противотуберкулезных препаратов, кахексия, легочно-сердечная недостаточность
Правильность = 2
-

Вопрос № 53

Какими лечебными свойствами обладает кумыс?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Противовоспалительное, анаболическое действие, стимулирует гемопоез
Правильность = 1
- 2) Стимулирует деятельность желез пищеварительного тракта, повышает концентрацию гемоглобина, повышает тонус сосудов, усиливает окислительные процессы, нормализует кислотно-щелочное равновесие
Правильность = 100
- 3) Задерживает развитие соединительной ткани, стимулирует синтез

белков, улучшает усвоение углеводов

Правильность = 2

4) Антибактериальное действие

Правильность = 3

Вопрос № 54

Каким побочным реакциям на химиотерапию свойственна стереотипность клинических проявлений?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Токсическим

Правильность = 1

2) Дисбактериозу

Правильность = 2

3) Идиосенкразии

Правильность = 3

4) Аллергическим

Правильность = 100

Вопрос № 55

Каким побочным реакциям на химиотерапию свойственна органоспецифичность?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Токсическим

Правильность = 100

2) Аллергическим

Правильность = 1

3) Дисбактериозу

Правильность = 2

4) Идиосенкразии

Правильность = 3

Вопрос № 56

Какой критерий чаще всего определяет длительность стационарного этапа лечения впервые выявленных больных туберкулезом в фазе распада?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Прекращение бактериовыделения

Правильность = 1

2) Шестимесячный срок стационарного лечения

Правильность = 2

3) Переносимость препаратов

Правильность = 3

4) Заживление каверны

Правильность = 100

Вопрос № 57

При использовании какого противотуберкулезного препарата наиболее часто поражаются почки?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Этамбутола
Правильность = 1
 - 2) Этионамида
Правильность = 2
 - 3) Пиразинамида
Правильность = 3
 - 4) Изониазида
Правильность = 4
 - 5) Стрептомицина
Правильность = 100
-

Вопрос № 58

Какой препарат ГИНК является наиболее эффективным?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Рифампицин
Правильность = 1
 - 2) Фтивазид
Правильность = 2
 - 3) Метазид
Правильность = 3
 - 4) Ларусан
Правильность = 4
 - 5) Изониазид
Правильность = 100
-

Вопрос № 59

Какие показания к резекциям легкого являются жизненными?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Ограниченные деструктивные процессы и туберкулома при неэффективной химиотерапии
Правильность = 1
 - 2) Распространенный туберкулез при лекарственной устойчивости и побочном действии химиопрепаратов
Правильность = 2
 - 3) Прогрессирование туберкулеза, казеозная пневмония, легочное кровотечение
Правильность = 100
-

Вопрос № 60

Какие противопоказания из перечисленных являются наиболее значимыми для резекции легкого?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Активный туберкулез бронхов в противоположном легком
Правильность = 100
 - 2) Легочно-сердечная недостаточность 1 степени
Правильность = 1
 - 3) Амилоидоз внутренних органов с функциональной недостаточностью почек 1 степени
Правильность = 2
 - 4) Инсулинозависимый диабет средней тяжести
Правильность = 3
 - 5) Все перечисленные
Правильность = 4
-

Вопрос № 61

Какой курортно-климатической зоне соответствуют следующие метеорологические данные: малая годовая и суточная амплитуда температуры, теплая зима, солнечная осень, постоянные ветры-бризы?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Высокогорной
Правильность = 1
 - 2) Горноклиматической
Правильность = 2
 - 3) Приморской
Правильность = 100
 - 4) Приморско-степной
Правильность = 3
 - 5) Степной
Правильность = 4
 - 6) Горно-приморской
Правильность = 50
-

Вопрос № 62

Какими должны быть сроки лечения в местных тубсанаториях лиц III группы диспансерного учета?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 1-2 месяца
Правильность = 100
 - 2) 2,5-3 месяца
Правильность = 1
 - 3) 3-4 месяца
Правильность = 2
 - 4) 2 недели
Правильность = 3
-

Вопрос № 63

Какие причины чаще приводят к осложнениям при гелиотерапии?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Неправильный отбор больных для лечения
Правильность = 1
 - 2) Неправильная поза пациента во время процедуры
Правильность = 2
 - 3) Халатность медперсонала
Правильность = 3
 - 4) Передозировка солнечных лучей
Правильность = 100
-

Вопрос № 64

Какова минимальная рекомендуемая продолжительность стационарного этапа лечения впервые выявленного больного деструктивным туберкулезом?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 2 месяца
Правильность = 1
 - 2) 3 - 4 месяца
Правильность = 2
 - 3) 5 - 6 месяцев
Правильность = 100
 - 4) 8 - 9 месяцев
Правильность = 2
 - 5) 10 - 12 месяцев
Правильность = 3
-

Вопрос № 65

К какой курортно-климатической зоне относится тубсанаторий "Шафраново"?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Высокогорной
Правильность = 1
 - 2) Горно-климатической
Правильность = 2
 - 3) Горно-приморской
Правильность = 3
 - 4) Приморской
Правильность = 4
 - 5) Приморско-степной
Правильность = 5
 - 6) Степной
Правильность = 100
-

Вопрос № 66

Какова минимальная продолжительность основного курса химиотерапии легочного туберкулеза у взрослых?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 12 месяцев
Правильность = 1
 - 2) 2 года
Правильность = 2
 - 3) 3 месяца
Правильность = 3
 - 4) 18 месяцев
Правильность = 4
 - 5) 6-9 месяцев
Правильность = 100
-

Вопрос № 67

При назначении какого препарата из перечисленных имеется риск серьезных нарушений функции центральной нервной системы ?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Стрептомицина
Правильность = 1
 - 2) Канамицина
Правильность = 2
 - 3) Пиразинамида
Правильность = 3
 - 4) ПАСК
Правильность = 4
 - 5) Циклосерина
Правильность = 100
-

Вопрос № 68

Каким патогенетическим средством из перечисленных целесообразно дополнить химиотерапию вялотекущего туберкулезного процесса?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Туберкулином
Правильность = 100
 - 2) Преднизолоном
Правильность = 1
 - 3) Димедролом или тавегилом
Правильность = 2
 - 4) Кокарбоксилазой
Правильность = 3
-

Вопрос № 69

Какой метод лечения из перечисленных является методом выбора при прогрессировании туберкулеза легких с большими и гигантскими кавернами?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Туберкулинотерапия
Правильность = 1
 - 2) Физиотерапия
Правильность = 2
 - 3) Пирогеналотерапия
Правильность = 3
 - 4) Ингаляции туберкулоstaticов
Правильность = 4
 - 5) Торакопластика
Правильность = 100
-

Вопрос № 70

Какой вариант лечения абсцедирующего туберкулезного лимфаденита предпочтительнее?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Два химиопрепарата и физиопроцедуры
Правильность = 1
 - 2) Два-три химиопрепарата и местное лечение
Правильность = 50
 - 3) Два-три химиопрепарата и хирургическое лечение
Правильность = 100
-

Вопрос № 71

У каких антибиотиков широкого спектра действия из перечисленных установлена туберкулоstaticическая активность?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Гентамицин
Правильность = 1
 - 2) Эритромицин и мономицин
Правильность = 2
 - 3) Полимиксин
Правильность = 3
 - 4) Фортум и септрим
Правильность = 4
 - 5) Таривид и цефалоспорины
Правильность = 100
-

Вопрос № 72

Какую комбинацию препаратов из перечисленных следует признать рациональной?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Изониазид, метаизид и рифампицин
Правильность = 1
- 2) Изониазид, стрептомицин и канамицин
Правильность = 2

- 3) Изониазид, этионамид и протионамид
Правильность = 3
- 4) Изониазид, канамицин и фтивазид
Правильность = 4
- 5) Изониазид, стрептомицин и рифампицин
Правильность = 100
-

Вопрос № 73

Какие туберкулостатики из перечисленных наименее эффективные?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Рифампицин и изониазид
Правильность = 1
- 2) Пиразинамид и стрептомицин
Правильность = 2
- 3) Этионамид и тизамид
Правильность = 3
- 4) Солютизон и солюзид
Правильность = 4
- 5) Тиоацетазон и Паск
Правильность = 100
-

Вопрос № 74

Каким расчетом определяют среднетерапевтическую дозу тубазида?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 5 мг/кг массы тела
Правильность = 1
- 2) 1 - 2,5 мг/кг массы тела
Правильность = 2
- 3) 2,5 - 5 мг/кг массы тела
Правильность = 3
- 4) 12 - 15 мг/кг массы тела
Правильность = 4
- 5) 10 мг/кг массы тела
Правильность = 100
-

Вопрос № 75

Какую комбинацию препаратов из перечисленных следует признать нерациональной?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Изониазид, стрептомицин и ПАСК
Правильность = 1
- 2) Изониазид, рифампицин и этамбутол
Правильность = 2
- 3) Изониазид, рифампицин и тизамид
Правильность = 3
- 4) Изониазид, этамбутол и этионамид

Правильность = 4

5) Изониазид, стрептомицин и флоримицин

Правильность = 100

Вопрос № 76

Какой протектор следует добавить, если в схему лечения включен циклосерин?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Витамин В6

Правильность = 1

2) Аскорбиновую кислоту

Правильность = 2

3) Никотиновую кислоту

Правильность = 3

4) Эпсилон-аминокапроновую кислоту

Правильность = 4

5) Глютаминовую кислоту

Правильность = 100

Вопрос № 77

Какое побочное действие из перечисленных чаще возникает при лечении пиразинамидом (тизамидом, пирафатом)?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Снижение остроты зрения

Правильность = 1

2) Снижение памяти

Правильность = 2

3) Нарушение слуха и чувства равновесия

Правильность = 3

4) Повышение артериального давления

Правильность = 4

5) Нарушение функции печени

Правильность = 100

Вопрос № 78

Какой препарат из перечисленных наиболее часто влияет на VIII пару черепно-мозговых нервов?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Изониазид

Правильность = 1

2) Циклосерин

Правильность = 2

3) Пиразинамид

Правильность = 3

4) ПАСК

Правильность = 4

5) Стрептомицин
Правильность = 100

Вопрос № 79

Какова суточная доза амикацина взрослым больным туберкулезом среднего возраста и средней массы тела (60-70кг)?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 0,5 г
Правильность = 1
 - 2) 1,0 г
Правильность = 100
 - 3) 1,5 г
Правильность = 2
 - 4) 0,25-0,5 г
Правильность = 3
-

Вопрос № 80

Какова минимальная длительность комплексной химиотерапии первичного туберкулеза легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 2-3 года
Правильность = 1
 - 2) 6 месяцев
Правильность = 2
 - 3) 9 - 10 месяцев
Правильность = 3
 - 4) 1-1,5 года
Правильность = 100
-

Вопрос № 81

Какие сочетания АБП наиболее оптимальны в начале лечения больных инфильтративным туберкулезом легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Рифадин, тизамид, этамбутол
Правильность = 1
 - 2) Рифадин, стрептомицин, этамбутол
Правильность = 2
 - 3) ГИНК, рифадин, этионамид
Правильность = 3
 - 4) ГИНК, рифадин, тизамид
Правильность = 4
 - 5) ГИНК, рифадин, стрептомицин
Правильность = 100
-

Вопрос № 82

С какой целью определяют инактивацию препаратов ГИНК в организме больного туберкулезом?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Для предупреждения развития побочных реакций
Правильность = 1
 - 2) Для уточнения степени бактериостатической активности крови
Правильность = 2
 - 3) Для установления оптимальности дозировки препаратов ГИНК
Правильность = 100
 - 4) Для определения чувствительности МБТ к препаратам ГИНК
Правильность = 3
-

Вопрос № 83

Чем дополнить курацию больного туберкулезом органов дыхания, если обнаружилось, что легкое поджато наполовину, имеется уровень свободной жидкости?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Периодическими пункциями плевральной полости
Правильность = 50
 - 2) Регулярным рентгенологическим контролем за динамикой расправления легкого, противовоспалительным лечением
Правильность = 1
 - 3) Дренированием плевральной полости с активной аспирацией содержимого
Правильность = 100
-

Вопрос № 84

Чем целесообразно дополнить химиотерапию при наличии у больного эластической туберкулезной каверны в легком?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Ингаляциями туберкулостатика
Правильность = 1
 - 2) Парентеральным введением изониазида
Правильность = 2
 - 3) Назначением биостимулятора
Правильность = 3
 - 4) Наложением ИП
Правильность = 100
 - 5) Туберкулинотерапией
Правильность = 50
-

Вопрос № 85

Назначением какого препарата целесообразно дополнить химиотерапию тубплеврита, если выпот поддерживает интоксикацию и одышку?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Преднизолон
Правильность = 100
 - 2) Туберкулин
Правильность = 1
 - 3) Этазол
Правильность = 2
 - 4) Продигиозан
Правильность = 3
 - 5) Фибс
Правильность = 4
-

Вопрос № 86

Какой принцип был положен в основу классификации противотуберкулезных препаратов Международного противотуберкулезного союза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Химическое строение
Правильность = 1
 - 2) Способность действовать внутриклеточно
Правильность = 2
 - 3) Проницаемость в очаги воспаления
Правильность = 3
 - 4) Механизм действия
Правильность = 4
 - 5) Выраженность туберкулоостатического действия
Правильность = 100
-

Вопрос № 87

О какой фармакологической несовместимости при одновременном внутривенном назначении необходимо помнить при лечении больного с легочно-сердечной недостаточностью?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Сердечные гликозиды и физиологический раствор
Правильность = 1
 - 2) Адреномиметики и холиноблокаторы
Правильность = 2
 - 3) Бета-адреномиметики и интал
Правильность = 3
 - 4) Эуфиллин и физиологический раствор
Правильность = 4
 - 5) Сердечные гликозиды и эуфиллин
Правильность = 100
-

Вопрос № 88

Что необходимо уточнить прежде чем приступать к коррекции одышки при патологии органов дыхания?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Форму туберкулеза легких
Правильность = 1
 - 2) Уровень иммуноглобулинов крови
Правильность = 2
 - 3) Кислотно-щелочное равновесие крови
Правильность = 3
 - 4) Гематокрит
Правильность = 4
 - 5) Тип вентиляционных нарушений
Правильность = 100
-

Вопрос № 89

Какова оптимальная суточная доза изониазида (в миллиграммах на 1 кг массы тела)?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 3 - 5
Правильность = 1
 - 2) 15 - 18
Правильность = 2
 - 3) 9 - 12
Правильность = 100
-

Вопрос № 90

Показано ли применение сердечных гликозидов для лечения хронического легочного сердца?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Противопоказано, как неэффективное
Правильность = 1
 - 2) Является единственным эффективным средством
Правильность = 2
 - 3) Допустимо только в лекарственной смеси с эуфиллином
Правильность = 3
 - 4) Допустимо только при интенсивной мочегонной терапии
Правильность = 4
 - 5) Показано, но в сочетании с препаратами калия
Правильность = 100
-

Вопрос № 91

На каком механизме действия эpsilon-аминокапроновой кислоты основано ее использование для купирования легочного кровотечения?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Ингибитор фибринолиза
Правильность = 100
- 2) Стимулятор фибринолиза

- Правильность = 1
- 3) Стимулятор тромбообразования
Правильность = 2
- 4) Ингибитор тромбообразования
Правильность = 3
- 5) Антагонист гепарина
Правильность = 4
-

Вопрос № 92

Чем обеспечивается депонирование крови при лечении легочного кровотечения?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Вливанием эpsilon-аминокапроновой кислоты
Правильность = 1
- 2) Наложением венозных жгутов и инъекцией атропина
Правильность = 100
- 3) Наложением искусственного пневмоторакса
Правильность = 2
- 4) Наложением пневмоперитонеума
Правильность = 3
-

Вопрос № 93

К чему может привести длительное бесконтрольное применение бета2-адренометиков (анаприлина, обзидана)?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) К чрезмерному расширению бронхов
Правильность = 1
- 2) К сухости бронхов и нарушению мукоцилиарного клиренса
Правильность = 2
- 3) К железодефицитной анемии
Правильность = 3
- 4) К парадоксальному бронхоспазму
Правильность = 100
-

Вопрос № 94

Какие препараты являются бронхоселективными холиноблокаторами?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Астмопент и альбутерол
Правильность = 1
- 2) Анаприллин и обзидан
Правильность = 2
- 3) Аспаркам и панангин
Правильность = 3
- 4) Беротек, сальбутамол и астмопент
Правильность = 4
- 5) Атровент и тровентол

Правильность = 100

Вопрос № 95

Какие препараты являются бронхоселективными бета-адреномиметиками?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Беротек, сальбутамол, астмопент
Правильность = 100
 - 2) Атровент, тровентол, атропин
Правильность = 1
 - 3) Эуфиллин, теопек, теofilлин
Правильность = 2
 - 4) Адреналин, норадреналин, эфедрин
Правильность = 3
-

Вопрос № 96

Какой препарат в группе ГИНК наиболее эффективный?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Фтивазид
Правильность = 1
 - 2) Метазид
Правильность = 2
 - 3) Ларусан
Правильность = 3
 - 4) Изониазид
Правильность = 100
-

Вопрос № 97

Какова суточная доза фтивазида для взрослых среднего веса (60-70кг)?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 0,5 - 1,0
Правильность = 1
 - 2) 0,5
Правильность = 2
 - 3) 1,0 - 1,5
Правильность = 100
 - 4) 1,5 - 2,0
Правильность = 3
-

Вопрос № 98

Какова суточная доза изониазида для взрослых среднего веса (60-70кг)?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 0,15 - 0,45

- Правильность = 1
2) 0,3 - 0,45
Правильность = 2
3) 0,6 - 0,9
Правильность = 100
4) 0,9 - 1,2
Правильность = 3
-

Вопрос № 99

Какой бактериостатической и бактерицидной активностью обладает рифадин?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Внутриклеточной
Правильность = 1
2) Внеклеточной
Правильность = 2
3) Внутриклеточной и внеклеточной
Правильность = 100
-

Вопрос № 100

Какие пути введения рифампицина используются?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Пероральный, внутримышечный, эндобронхиальный
Правильность = 1
2) Эндобронхиальный, внутримышечный, внутривенный
Правильность = 2
3) Пероральный, внутривенный, эндобронхиальный
Правильность = 100
-

Вопрос № 101

Какова суточная доза рифампицина для взрослых больных туберкулезом средней массы тела (60-70 кг)?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 0,15 - 0,3
Правильность = 1
2) 0,3 - 0,45
Правильность = 1
3) 0,6
Правильность = 100
4) 0,9 - 1,2
Правильность = 3
-

Вопрос № 102

Каково побочное действие ПАСК?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Нефрит, агранулоцитоз, нейродермит
Правильность = 1
 - 2) Нарушения зрения и слуха
Правильность = 2
 - 3) Периферические невриты
Правильность = 3
 - 4) Диспепсия, гепатит, нефрит, аллергические реакции,
Правильность = 100
-

Вопрос № 103

Какие пути введения ПАСК наиболее эффективны?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Внутривенно, внутримышечно
Правильность = 1
 - 2) Внутримышечно, местно
Правильность = 2
 - 3) Перорально, внутривенно
Правильность = 100
-

Вопрос № 104

Какова суточная доза ПАСК?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 3,0 - 6,0
Правильность = 1
 - 2) 9,0 - 12,0
Правильность = 100
 - 3) 15,0 - 18,0
Правильность = 2
-

Вопрос № 105

Какое наиболее частое противопоказание к назначению ПАСК?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Выраженный атеросклероз, нарушения мозгового кровообращения
Правильность = 1
 - 2) Нервно-психические расстройства
Правильность = 2
 - 3) Патология желудочно-кишечного тракта
Правильность = 100
-

Вопрос № 106

Какой препарат предупреждает развитие осложнений при лечении изониазидом?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Мепробамат
Правильность = 1
 - 2) Витамин В1
Правильность = 2
 - 3) Глютаминовая кислота
Правильность = 3
 - 4) Пиридоксин
Правильность = 100
-

Вопрос № 107

Какие противотуберкулезные препараты составляют группу ТИНК?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Пиразинамид, морфазинамид
Правильность = 1
 - 2) Тиоацетазон, солютизон
Правильность = 2
 - 3) Изониазид, метагид, фтивазид
Правильность = 3
 - 4) Этионамид, протионамид
Правильность = 100
-

Вопрос № 108

Какие противотуберкулезные препараты были включены в группу А по международной классификации?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Изониазид, метагид, фтивазид
Правильность = 1
 - 2) Этамбутол, тизамид
Правильность = 2
 - 3) Стрептомицин, канамицин
Правильность = 3
 - 4) Этамбутол, рифадин
Правильность = 4
 - 5) Изониазид, рифампицин
Правильность = 100
-

Вопрос № 109

Какой препарат назначают для предупреждения побочного действия стрептомицина?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Витамин В6
Правильность = 1
- 2) Оротат калия

Правильность = 2

3) Преднизолон

Правильность = 3

4) Пантотенат кальция

Правильность = 100

Вопрос № 110

Какие осложнения при применении стрептомицина наиболее часты?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Невриты

Правильность = 1

2) Спазм коронарных сосудов

Правильность = 2

3) Депрессия, галлюцинации

Правильность = 3

4) Вестибулярные и слуховые расстройства

Правильность = 100

Вопрос № 111

При каком туберкулезном процессе по течению наиболее эффективен стрептомицин?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Подостром

Правильность = 1

2) Хроническом

Правильность = 2

3) Остром

Правильность = 100

Вопрос № 112

Какова средняя суточная доза канамицина взрослым больным туберкулезом среднего возраста и массы тела (60-70кг)?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) 0,5

Правильность = 1

2) 1,0

Правильность = 100

3) 1,5

Правильность = 3

Вопрос № 113

Какие пути введения амикацина используют?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Внутримышечно, в полость эмпием, перорально
Правильность = 1
 - 2) Внутримышечно, местно, перорально
Правильность = 40
 - 3) Внутримышечно, местно, интратрахеально
Правильность = 100
-

Вопрос № 114

Каковы основные противопоказания для назначения канамицина?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Атеросклероз, инфаркт и инсульт в анамнезе
Правильность = 1
 - 2) Заболевания печени и крови
Правильность = 2
 - 3) Невриты, психические нарушения
Правильность = 3
 - 4) Неврит слухового нерва, заболевания почек с нарушением выделительной функции
Правильность = 100
-

Вопрос № 115

На какие МБТ действует преимущественно канамицин?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Внутриклеточно расположенные МБТ
Правильность = 1
 - 2) Внутриклеточно и внеклеточно расположенные МБТ
Правильность = 2
 - 3) Внеклеточно расположенные МБТ
Правильность = 100
-

Вопрос № 116

Какова суточная доза стрептомицина для больных туберкулезом среднего возраста и средней массы тела (60-70кг)?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 0,5
Правильность = 1
 - 2) 0,75
Правильность = 2
 - 3) 1,0
Правильность = 100
 - 4) 1,5
Правильность = 3
-

Вопрос № 117

Какие побочные действия рифампицина встречаются наиболее часто?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Нефротоксичное
Правильность = 1
 - 2) Ототоксичное
Правильность = 2
 - 3) Аллергические реакции
Правильность = 3
 - 4) Гепатотоксическое, диспепсии
Правильность = 100
-

Вопрос № 118

Как лучше принимать рифадин?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Интермиттирующим методом
Правильность = 1
 - 2) Первые три месяца ежедневно, затем три раза в неделю
Правильность = 2
 - 3) Ежедневно
Правильность = 100
-

Вопрос № 119

Каковы противопоказания к назначению рифампицина?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Заболевания желудочно-кишечного тракта
Правильность = 1
 - 2) Выраженный атеросклероз
Правильность = 2
 - 3) Инсульты, инфаркт в анамнезе
Правильность = 3
 - 4) Астеновегетативный синдром, психические расстройства
Правильность = 4
 - 5) Заболевания печени, почек, крови
Правильность = 100
-

Вопрос № 120

Какие пути введения стрептомицина используются?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Перорально, внутримышечно, внутривенно, орошение верхних дыхательных путей
Правильность = 1
- 2) Внутримышечно, внутривенно, эндолюмбально, эндобронхиально
Правильность = 2

3) Местно, внутримышечно, эндолюмбально, внутривентрикулярно, эндобронхиально

Правильность = 100

Вопрос № 121

Какой бактериостатической активностью преимущественно обладает стрептомицин?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Внутриклеточной

Правильность = 1

2) Внутриклеточной и внеклеточной

Правильность = 2

3) Внеклеточной

Правильность = 100

Вопрос № 122

Какие антибиотики из перечисленных относятся к группе стрептомицина?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Рифампицин, циклосерин

Правильность = 1

2) Канамицин, рифампицин

Правильность = 2

3) Канамицин, амикацин

Правильность = 100

Вопрос № 123

Какое сочетание туберкулостатиков из перечисленных относится к наиболее эффективному для большинства случаев?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Этионамид, пиразинамид, циклосерин

Правильность = 1

2) Флоримицин, пиразинамид, циклосерин

Правильность = 2

3) Изониазид, пиразинамид, стрептомицин

Правильность = 100

Вопрос № 124

Какова последовательность назначения перечисленных антибиотиков с учетом возможной частичной односторонней устойчивости к ним МБТ?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Стрептомицин, амикацин, канамицин

Правильность = 1

2) Канамицин, стрептомицин, амикацин

- Правильность = 2
- 3) Канамицин, амикацин, стрептомицин
Правильность = 3
- 4) Амикацин, стрептомицин, канамицин
Правильность = 4
- 5) Амикацин, канамицин, стрептомицин
Правильность = 5
- 6) Стрептомицин, канамицин, амикацин
Правильность = 100
-

Вопрос № 125

Какова оптимальная суточная доза тибона (в мг/кг массы тела)?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 1,0 - 1,5
Правильность = 1
- 2) 2,0 - 2,5
Правильность = 100
- 3) 3,0 - 3,5
Правильность = 2
- 4) 3,5 - 4,0
Правильность = 3
-

Вопрос № 126

В чем наиболее часто проявляется побочное действие туберкулостатиков при внутривенном их введении?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Артралгии
Правильность = 1
- 2) Эозинофилия
Правильность = 2
- 3) Головокружение
Правильность = 3
- 4) Боли в животе
Правильность = 4
- 5) Анафилактический шок
Правильность = 5
- 6) Ознобы
Правильность = 100
-

Вопрос № 127

Что должно обязательно предшествовать внутривенному введению туберкулостатиков?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Определение бактериостатической активности крови с выбранными препаратами
Правильность = 1

- 2) Определение скорости инактивации ГИНК
Правильность = 2
- 3) Лечение больного выбранными препаратами в течение 7 дней по классической методике
Правильность = 100
-

Вопрос № 128

Какой из препаратов не используется для внутривенной химиотерапии?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Изониазид
Правильность = 1
- 2) Этионамида гидрохлорид
Правильность = 2
- 3) Натрия парааминосалицилат
Правильность = 3
- 4) Рифампицин
Правильность = 4
- 5) Солютизон
Правильность = 100
-

Вопрос № 129

Какова правильная тактика устранения перфузионных осложнений при внутривенной химиотерапии?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Замедленные темпы инфузии
Правильность = 1
- 2) Дополнительное введение антигистаминных препаратов
Правильность = 2
- 3) Дополнительное введение глюкокортикоидов
Правильность = 3
- 4) Прекращение манипуляции
Правильность = 100
-

Вопрос № 130

К какой группе препаратов по классификации Международного противотуберкулезного союза относится рифампицин?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Группа А
Правильность = 100
- 2) Группа В
Правильность = 1
- 3) Группа С
Правильность = 2
-

Вопрос № 131

Какова оптимальная суточная доза рифампицина (в мг/кг массы тела)?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) 2,0 - 2,5

Правильность = 1

2) 3,5 - 5,0

Правильность = 2

3) 8,0 - 10,0

Правильность = 100

4) 12,0 - 15,0

Правильность = 3

Вопрос № 132

Какова оптимальная суточная доза стрептомицина, канамицина, амикацина (в мг/кг массы тела)?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) 2,5 - 5,0

Правильность = 1

2) 5,0 - 8,0

Правильность = 2

3) 15,0 - 20,0

Правильность = 100

4) 8,0 - 10,0

Правильность = 3

Вопрос № 133

Какова оптимальная суточная доза пиперазина в мг/кг массы тела?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) 2,5 - 5,0

Правильность = 1

2) 5,0 - 10,0

Правильность = 2

3) 10,0 - 15,0

Правильность = 3

4) 15,0 - 20,0

Правильность = 4

5) 25,0 - 30,0

Правильность = 100

Вопрос № 134

Какова оптимальная суточная доза этионамида и протионамида в мг/кг массы тела?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) 2,5 - 5,0

- Правильность = 1
2) 5,0 - 8,0
Правильность = 2
3) 10,0 - 15,0
Правильность = 100
4) 18,0 - 20,0
Правильность = 3
-

Вопрос № 135

Какова оптимальная суточная доза этамбутола (в мг/кг массы тела)?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 35
Правильность = 1
2) 5 - 10
Правильность = 2
3) 10 - 15
Правильность = 3
4) 25 - 30
Правильность = 100
-

Вопрос № 136

Назначением каких препаратов предупреждают побочное действие этионамида?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Рибофлавин, тиамин
Правильность = 1
2) Токоферол, желчегонные препараты
Правильность = 2
3) Рибофлавин, токоферол
Правильность = 3
4) Никотинамид, пиридоксин
Правильность = 100
-

Вопрос № 137

В чем наиболее часто выражается побочное действие этионамида?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Неврит слухового нерва, вестибулярные расстройства
Правильность = 1
2) Нефрит, агранулоцитоз
Правильность = 2
3) Диспепсия, признаки дефицита витамина РР, гепатит
Правильность = 100
-

Вопрос № 138

Каковы методы введения этионамида?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Пероральный или внутримышечный
Правильность = 1
 - 2) Пероральный или местный
Правильность = 2
 - 3) Пероральный или внутривенный
Правильность = 100
-

Вопрос № 139

Какова суточная доза тибона больному средней массы тела (70 кг)?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 0,01
Правильность = 1
 - 2) 0,05
Правильность = 2
 - 3) 0,1 - 0,15
Правильность = 100
 - 4) 0,25 - 0,5
Правильность = 3
-

Вопрос № 140

Каковы противопоказания для назначения тибона?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
Правильность = 1
 - 2) Инфаркты и инсульты в анамнезе
Правильность = 2
 - 3) Нарушение слуха, вестибулярные расстройства
Правильность = 3
 - 4) Заболевания печени и почек, сахарный диабет
Правильность = 100
-

Вопрос № 141

Каковы методы введения солютизона?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Внутримышечно, местно
Правильность = 1
 - 2) Внутримышечно, перорально
Правильность = 2
 - 3) Местно, эндобронхиально
Правильность = 100
-

Вопрос № 142

К какой химической группе химиопрепаратов относится солютизон?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

1) Группа ГИНК

Правильность = 1

2) Тиоурены

Правильность = 2

3) Тиоамиды

Правильность = 100

Вопрос № 143

Какова оптимальная суточная доза изониазида (в мг/кг массы тела) для внутривенного введения?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) 2,5 - 5,0

Правильность = 1

2) 10,0 - 12,0

Правильность = 100

3) 15,0 - 18,0

Правильность = 3

Вопрос № 144

Какова должна быть оптимальная температура растворов антибактериальных препаратов для внутривенного введения?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) 20-22 градусов Цельсия

Правильность = 100

2) 31-36 градусов Цельсия

Правильность = 1

3) 37-40 градусов Цельсия

Правильность = 2

Вопрос № 145

Какой должна быть средняя скорость введения раствора противотуберкулезного препарата внутривенно в минуту?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) 10- 20 капель

Правильность = 1

2) 20- 60 капель

Правильность = 100

3) 70-120 капель

Правильность = 2

Вопрос № 146

Какой преимущественно активностью обладает этионамид?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Внутриклеточной антибактериальной активностью
Правильность = 1
 - 2) Внеклеточной антибактериальной активностью
Правильность = 2
 - 3) Внутриклеточной и внеклеточной антибактериальной активностью
Правильность = 100
-

Вопрос № 147

Какова суточная доза этионамида для больного среднего веса (70 кг)?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 0,25 - 0,5
Правильность = 1
 - 2) 0,75 - 1,0
Правильность = 100
 - 3) 1,25 - 1,5
Правильность = 2
 - 4) 1,5 - 1,75
Правильность = 3
-

Вопрос № 148

Какие имеются противопоказания к назначению этамбутола?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Нарушение слуха и функции вестибулярного аппарата
Правильность = 1
 - 2) Заболевания желудочно-кишечного тракта
Правильность = 2
 - 3) Гипертоническая болезнь, выраженный атеросклероз
Правильность = 3
 - 4) Нарушение зрения, беременность
Правильность = 100
-

Вопрос № 149

Какова терапевтическая суточная доза этамбутола для взрослого больного среднего веса (60-70 кг массы тела)?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 0,4 - 0,8
Правильность = 1
- 2) 0,8 - 1,2
Правильность = 2

- 3) 1,6 - 2,0
Правильность = 100
- 4) 2,4
Правильность = 3
-

Вопрос № 150

Каковы абсолютные противопоказания к назначению глюкокортикоидов для лечения тубменингита?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Сахарный диабет, язвенная болезнь желудка, гипертоническая болезнь, декомпенсация сердечной деятельности
Правильность = 100
- 2) Гепатит в острой фазе, злокачественные новообразования, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, Аддисонова болезнь
Правильность = 1
- 3) Поражение черепно-мозговых нервов, Аддисонова болезнь, несахарный диабет
Правильность = 2
- 4) Осложненное течение менингита
Правильность = 3
-

Вопрос № 151

Какой метод введения химиопрепаратов кроме перорального обязателен при осложненном течении первичного туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Внутривенный
Правильность = 1
- 2) Внутримышечный
Правильность = 2
- 3) Любой парентеральный
Правильность = 3
- 4) Эндотрахеобронхиальный или ингаляционный
Правильность = 100
-

Вопрос № 152

Какой вид патогенетической терапии при лечении опухолевой формы туберкулеза внутригрудных лимфоузлов является обязательным?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Терапия глюкокортикоидами
Правильность = 100
- 2) Туберкулинотерапия
Правильность = 1
- 3) Стимулирующая терапия
Правильность = 2
-

Вопрос № 153

Когда можно закончить основной курс химиотерапии у больных кавернозным туберкулезом легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Через 6-9 месяцев с момента прекращения бактериовыделения и заживления полости распада

Правильность = 100

2) Спустя 3-6 месяцев с момента затихания процесса

Правильность = 1

3) При достижении стабилизации процесса

Правильность = 2

4) Спустя 6 месяцев с момента абацилирования

Правильность = 3

Вопрос № 154

Когда необходимо ставить вопрос о хирургическом лечении у больных с кавернозным туберкулезом легких?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

1) Когда заболевание осложнилось туберкулезом бронхов

Правильность = 1

2) При угрозе развития амилоидоза

Правильность = 2

3) У больных с сопутствующими заболеваниями

Правильность = 3

4) При отсутствии эффекта от проводимой химиотерапии

Правильность = 100

Вопрос № 155

Какие патогенетические средства оправдано включить в план лечения больных кавернозным туберкулезом легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Ингибиторы протеолиза

Правильность = 1

2) Глюкокортикоиды

Правильность = 2

3) Рассасывающие и стимулирующие средства

Правильность = 100

Вопрос № 156

Какой принцип из перечисленных должен обязательно использоваться при лечении всех больных фиброзно-кавернозным туберкулезом?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Полихимиотерапия с учетом ранее принятых препаратов и чувствительности МБТ к АБП

Правильность = 100

2) Рациональное присоединение патогенетической терапии

Правильность = 1

3) Своевременное использование хирургического лечения и применение препаратов внутривенно

Правильность = 2

Вопрос № 157

К каким препаратам из приведенных быстрее развивается вторичная лекарственная устойчивость МБТ

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Стрептомицину и рифампицину

Правильность = 100

2) ПАСКу и тизамиду

Правильность = 1

3) Тубазиду и пиразинамиду

Правильность = 2

4) Этамбутолу и протионамиду

Правильность = 3

Вопрос № 158

При какой форме туберкулеза легких чаще отмечается вторичная лекарственная устойчивость МБТ?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Инфильтративной

Правильность = 1

2) Фиброзно-кавернозной

Правильность = 100

3) Диссеминированной

Правильность = 2

4) Кавернозной

Правильность = 3

5) Туберкулема

Правильность = 4

Вопрос № 159

Из-за какой опасности следует направлять больных на хирургическое лечение в случае абациллированной, но не закрывшейся за 6 месяцев основного курса химиотерапии каверны?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) Высокий риск обострения, аспергиллеза, легочного кровотечения

Правильность = 100

2) Опасность инфицирования и заражения туберкулезом окружающих людей

Правильность = 1

3) Высокая вероятность формирования конгломератной туберкулемы

Правильность = 2

4) Большой риск развития фиброзно-кавернозного туберкулеза

Правильность = 3

5) Высокий риск развития легочно-сердечной недостаточности

Правильность = 4

Вопрос № 160

Какие препараты относятся к фторхинолонам?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

1) Авелокс, таривид, максаквин

Правильность = 100

2) Капреомицин, амикацин

Правильность = 1

3) Циклосерин, протионамид, майрин-п

Правильность = 2

4) Тибинекс, феназид

Правильность = 3

Вопрос № 161

Каковы показания к назначению фторхинолонов при лечении туберкулеза?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

1) Плохая переносимость противотуберкулезных препаратов

Правильность = 1

2) Профилактика и лечение вторичных иммунодефицитных состояний

Правильность = 2

3) Препараты выбора при сопутствующих поражениях печени

Правильность = 3

4) Остро прогрессирующие формы туберкулеза, наличие лекарственной устойчивости МБТ, сопутствующие неспецифические болезни органов дыхания

Правильность = 100

Вопрос № 162

Какие побочные эффекты возможны при приеме максаквина?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

1) Ототоксические реакции, обострение подагры, сужение полей зрения

Правильность = 1

2) Фотосенсибилизация, диспепсия, парестезии, нарушение сна

Правильность = 100

3) Гепатотоксические реакции, лейкопения, субфебрильная температура

Правильность = 2

Вопрос № 163

Сколько стандартных режимов химиотерапии предусмотрено приказом МЗ РФ №109 от 21.03.2003 г.?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) 2
Правильность = 1
 - 2) 3
Правильность = 2
 - 3) 4
Правильность = 3
 - 4) 5
Правильность = 100
 - 5) 6
Правильность = 4
-

Вопрос № 164

В каких стандартных режимах химиотерапии туберкулеза назначают фторхинолоны (по приказу МЗ РФ №109 от 21.03.2003 г.)?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) II а и II б
Правильность = 1
 - 2) II а и III
Правильность = 2
 - 3) I и II а
Правильность = 3
 - 4) II б и IV
Правильность = 100
-

Вопрос № 165

Каковы противопоказания к назначению максаквина?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Больные пожилого и старческого возраста
Правильность = 1
 - 2) Заболевания желудочно-кишечного тракта, поражения печени
Правильность = 2
 - 3) Заболевания ЦНС, беременность, возраст до 14 лет
Правильность = 100
 - 4) Анепии, лейкопении, неврит зрительного нерва
Правильность = 3
-

Вопрос № 166

С каким препаратом из перечисленных нельзя применять максаквин?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Протионамид
Правильность = 1
- 2) Пиразинамид

Правильность = 2

3) Изониазид

Правильность = 3

4) Рифампицин

Правильность = 100

Вопрос № 167

На какие группы подразделяются противотуберкулезные препараты по приказу МЗ РФ №109 от 21.03.2003 г.?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) I и II ряда

Правильность = 1

2) А, В, С

Правильность = 2

3) Основные и резервные

Правильность = 100

Вопрос № 168

На какие МБТ (по их локализации) действует максаквин?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

1) Только на внутриклеточно расположенные

Правильность = 1

2) Только на внеклеточно расположенные

Правильность = 2

3) На расположенные и вне- и внутриклеточно

Правильность = 100

Вопрос № 169

Какой должна быть суточная доза капреомицина (в мг/кг массы тела)?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

1) 3-5

Правильность = 1

2) 5-10

Правильность = 2

3) 15-17

Правильность = 100

4) 20 в два приема

Правильность = 3

Вопрос № 170

Какой должна быть суточная доза максаквина (в мг/кг массы тела)?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 3-5
Правильность = 1
 - 2) 5-10
Правильность = 2
 - 3) 13-14 в два приема
Правильность = 100
-

Вопрос № 171

Можно ли применять максаквин и авелокс для лечения туберкулеза у детей?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Можно
Правильность = 1
 - 2) Можно только в половинных дозах
Правильность = 2
 - 3) Нельзя
Правильность = 100
-

Вопрос № 172

Какой должна быть суточная доза микобутина (в мг/кг массы тела)?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) 0,5-1
Правильность = 1
 - 2) 2-3
Правильность = 2
 - 3) 5
Правильность = 100
 - 4) 6-7
Правильность = 3
-

Вопрос № 173

С каким препаратом из перечисленных микобутинов обладает синергидным действием?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Протионамид
Правильность = 100
 - 2) Пиразинамид
Правильность = 1
 - 3) Изониазид
Правильность = 2
 - 4) Рифампицин
Правильность = 3
-

Вопрос № 174

На чем основано назначение интермиттирующей химиотерапии туберкулеза?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Лучшая контролируемость приема АБП
Правильность = 1
 - 2) "Последствие" туберкулостатиков
Правильность = 100
 - 3) Лучшая переносимость туберкулостатиков
Правильность = 2
-

Вопрос № 175

Каковы показания к сегментэктомии при туберкулезе легких?

Вопрос: для второй (для всех) категории.

Ответы:

- 1) Изолированные полости или туберкулемы в одном-двух сегментах без явных признаков прогрессирования
Правильность = 100
 - 2) Большая изолированная каверна в одной доле
Правильность = 1
 - 3) Периферически расположенные казеомы без распада
Правильность = 2
 - 4) Цирротический туберкулез захватывающий не более двух сегментов
Правильность = 3
 - 5) Правильны все варианты ответов
Правильность = 4
-

Вопрос № 176

Каковы показания к лобэктомии?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

- 1) Фиброзно-кавернозный туберкулез с большой полостью или поликавернозом в одной доле
Правильность = 100
 - 2) Кавернозный туберкулез в пределах одной доли легкого
Правильность = 1
 - 3) Изолированные полости в пределах двух-трех сегментов
Правильность = 2
 - 4) Периферически расположенные казеомы без распада
Правильность = 3
 - 5) Правильны все варианты ответов
Правильность = 4
-

Вопрос № 177

Каковы показания к пульмонэктомии?

Вопрос: для высшей категории.

Ответы:

- 1) Тотальное поражение легкого (казеозная пневмония, поликаверноз, каверна с обширным бронхогенным обсеменением)
Правильность = 100
- 2) Эмпиема плевры

Правильность = 1

3) Рецидив кавернозного туберкулеза после частичной резекции легкого

Правильность = 2

4) Правильны все варианты ответов

Правильность = 3

Вопрос № 178

Каковы показания к кавернотомии?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

1) Остаточная пострезекционная плевральная полость

Правильность = 1

2) Фиброзно-кавернозный туберкулез в одном легком при невозможности произвести резекцию

Правильность = 2

3) "Свежий" деструктивный туберкулезный процесс при неэффективной химиотерапии

Правильность = 3

4) Изолированная большая или гигантская каверна при распространенном поражении легких

Правильность = 100

Вопрос № 179

Каковы основные показания к торакопластике при туберкулезе легких?

Вопрос: для первой категории.

Ответы:

1) Фиброзно-кавернозный процесс в одном легком, когда противопоказана резекция легкого

Правильность = 100

2) Рецидив кавернозного туберкулеза после частичной резекции легкого

Правильность = 1

3) Изолированная большая или гигантская каверна при распространенном поражении легких

Правильность = 2

4) Правильны все варианты ответов

Правильность = 3
