

## 5 ЗАБОЛЕВАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГЛАЗА И ГЛАЗНИЦЫ

Вопрос

1 Изменения век при воспалительном отеке включают:

- 1) гиперемию кожи век
- 2) повышение температуры кожи
- 3) болезненность при пальпации
- 4) крепитация
- 5) гематома век

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 9)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 0)

2 Клинические признаки рожистого воспаления век включают:

- 1) выраженную гиперемию
- 2) чувство зуда, жара
- 3) отек век
- 4) резкую границу с нормальной тканью
- 5) увеличение региональных лимфатических узлов

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

3 Чешуйчатый блефарит характеризуется:

- 1) мучительным зудом в веках
- 2) трихиазом
- 3) корни ресниц покрыты сухими чешуйками
- 4) мейбомеитом
- 5) отеком век

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 9)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 0)

4 При лагофтальме возможно возникновение:

- 1) эрозии роговицы из-за трихиаза
- 2) увеита
- 3) экзофтальма
- 4) ксероза роговицы
- 5) неврита

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 9)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 0)

5 Для каротидно-кавернозного соустья характерно:

- 1) развитие пульсирующего экзофтальма
- 2) расширение эпibuльбарных сосудов
- 3) сосудистый шум над глазом
- 4) развитие конъюнктивита
- 5) перикорнеальная инъекция

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 9)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 0)

6 Различают следующие виды заворота век:

- 1) спастический
- 2) рубцовый
- 3) возрастной
- 4) врожденный
- 5) бульбарный

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

7 Виды приобретенного птоза:

- 1) нейротенный
- 2) миогенный
- 3) апоневротический
- 4) врожденный
- 5) пульсирующий

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 9)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 0)

8 Рубцовый выворот век развивается в следствие:

- 1) травмы

- 2) ожогов век
- 3) сибирской язвы
- 4) туберкулезной волчанки
- 5) хирургического вмешательства на веке

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

9 К доброкачественным вторичным опухолям орбиты относятся:

- 1) остеома
- 2) фиброма
- 3) липома
- 4) хондрома
- 5) папиллома

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

10 Атонический выворот век проявляется:

- 1) снижением эластичности кожи
- 2) отвисанием века книзу
- 3) гипертрофией конъюнктивы
- 4) блефароспазмом
- 5) ретракцией верхнего века

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 9)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 0)

11 При аденовирусной инфекции глаза наблюдается:

- 1) конъюнктивит является фолликулярным
- 2) конъюнктивит почти всегда поражает нижний свод
- 3) могут быть поверхностные и глубокие помутнения роговицы
- 4) древовидный кератит
- 5) дисковидный кератит

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 9)

- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 0)

12 При флегмоне орбиты наблюдается:

- 1) отек и гиперемия век
- 2) хемоз конъюнктивы
- 3) офтальмоплегия
- 4) крепитация под кожей века
- 5) пульсирующий экзофтальм

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 9)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 0)

13 К первичным доброкачественным опухолям орбиты относятся:

- 1) ангиома
- 2) менингиома
- 3) глиома
- 4) смешанная опухоль слезной железы
- 5) нейрофиброма

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

14 Показанием к энуклеации является:

- 1) абсолютно болящий слепой глаз
- 2) меланома хориоидеи
- 3) симпатическая офтальмия
- 4) слепой глаз, разможенный травмой
- 5) ретинобластома

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

15 Основной признак эмфиземы век:

Варианты ответов

- 1 крепитация (балл - 9)
- 2 отек (балл - 0)
- 3 гематома (балл - 0)
- 4 инфильтрация (балл - 0)

5 гиперемия (балл - 0)

16 При аллергическом дерматите наблюдаются:

Варианты ответов

- 1 герпетические высыпания (балл - 0)
- 2 сосудистые «звездочки» (балл - 0)
- 3 зуд, отек, гиперемия (балл - 9)
- 4 петехиальные кровоизлияния (балл - 0)
- 5 шелушение (балл - 0)

17 Травматический отек век сопровождается:

Варианты ответов

- 1 обширными подкожными кровоизлияниями с синюшным оттенком (балл - 9)
- 2 блефароспазмом и слезотечением (балл - 0)
- 3 зудом (балл - 0)
- 4 крепитация (балл - 0)
- 5 гиперемия (балл - 0)

18 К клиническим признакам абсцесса века относятся:

Варианты ответов

- 1 кожные покровы обычной окраски (балл - 0)
- 2 гематома век (балл - 0)
- 3 разлитая гиперемия и инфильтрация век (балл - 9)
- 4 крепитация (балл - 0)
- 5 отсутствие флюктуации (балл - 0)

19 Показаниями к вскрытию абсцесса века является:

Варианты ответов

- 1 появление флюктуации (балл - 9)
- 2 выраженная гиперемия век (балл - 0)
- 3 уплотнение ткани века (балл - 0)
- 4 болезненность при пальпации (балл - 0)
- 5 температурная реакция (балл - 0)

20 При абсцессе века необходимо:

Варианты ответов

- 1 консервативная терапия (балл - 0)
- 2 магнитотерапия (балл - 0)
- 3 при наличии симптома «флюктуации» – вскрыть и дренировать гнойник (балл - 9)
- 4 динамическое наблюдение (балл - 0)
- 5 введение стероидов (балл - 0)

21 Хроническое воспаление мейбомиевых желез - это:

Варианты ответов

- 1 ячмень (балл - 0)
- 2 халазион (балл - 9)
- 3 абсцесс века (балл - 0)
- 4 внутренний ячмень (балл - 0)
- 5 папиллома (балл - 0)

22 При халазионе века необходимо:

Варианты ответов

- 1 проводить лечение токами УВЧ, электрофорез (балл - 0)

- 2 ввести кеналог в патологический процесс или провести хирургическое лечение (балл - 9)
- 3 проводить инстилляциии дезинфицирующих капель (балл - 0)
- 4 заложить гидрокортизоновую мазь (балл - 0)
- 5 витаминотерапия (балл - 0)

23 При поражении кожи век простым герпесом наблюдается:

Варианты ответов

- 1 гиперемия и отек век (балл - 0)
- 2 появление резко гиперемированных участков кожи и пузырьков, отека века на фоне повышения температуры тела (балл - 0)
- 3 на фоне повышения температуры тела появление нескольких рядом лежащих пузырьков с прозрачной жидкостью (балл - 9)
- 4 пузырьвидные высыпания, занимающие одну половину лба, расположенные в один ряд (балл - 0)
- 5 шелушение (балл - 0)

24 При поражении кожи век опоясывающим герпесом наблюдается:

Варианты ответов

- 1 гиперемия и отек век (балл - 0)
- 2 появление резко гиперемированных участков и пузырьков, отека века на фоне повышения температуры тела (балл - 0)
- 3 на фоне повышения температуры тела появление нескольких рядом лежащих пузырьков с прозрачной жидкостью (балл - 0)
- 4 пузырьвидные высыпания, занимающие одну половину лба, расположенные в один ряд (балл - 9)
- 5 гематома век (балл - 0)

25 При язвенном блефарите изменения век носят характер:

Варианты ответов

- 1 кровоточащих язвочек с гнойным налетом (балл - 9)
- 2 заворота век (балл - 0)
- 3 выворота века (балл - 0)
- 4 пузырьвидных высыпаний (балл - 0)
- 5 гематомы век (балл - 0)

26 Эпикантус - это:

Варианты ответов

- 1 опущение верхнего века (балл - 0)
- 2 кожная складка, соединяющая верхнее и нижнее веко (балл - 9)
- 3 узкая глазная щель (балл - 0)
- 4 плотное образование на верхнем веке (балл - 0)
- 5 симблефарон (балл - 0)

27 При лагофтальме необходимо проводить:

Варианты ответов

- 1 кератопластику (балл - 0)
- 2 использование глазных мазей (балл - 9)
- 3 в некоторых случаях - блефароррафию (балл - 0)
- 4 парабальбарные инъекции (балл - 0)
- 5 физиотерапию (балл - 0)

28 Спастический заворот век развивается при:

Варианты ответов

- 1 блефароспазме (балл - 9)

- 2 трахоме (балл - 0)
- 3 экзофтальме (балл - 0)
- 4 блефарите (балл - 0)
- 5 конъюнктивите (балл - 0)

29 Старческий заворот развивается при:

Варианты ответов

- 1 растяжении кожи век (балл - 9)
- 2 энофтальме (балл - 0)
- 3 конъюнктивите (балл - 0)
- 4 халазионе (балл - 0)
- 5 трихиазе (балл - 0)

30 Последствием трахомы и ожога конъюнктивы век являются:

Варианты ответов

- 1 спастический заворот (балл - 0)
- 2 рубцовый заворот (балл - 9)
- 3 бульбарный заворот (балл - 0)
- 4 старческий (балл - 0)
- 5 врожденный (балл - 0)

31 Врожденный заворот век возникает:

Варианты ответов

- 1 при растяжении кожи век (балл - 0)
- 2 при недоразвитии или отсутствии хряща (балл - 0)
- 3 при гипертрофии ресничной части круговой мышцы (балл - 9)
- 4 у взрослых (балл - 0)
- 5 при травме (балл - 0)

32 Ксантоматоз может быть вызван:

Варианты ответов

- 1 травмой (балл - 0)
- 2 нарушением трофики (балл - 0)
- 3 нарушением обмена веществ (балл - 9)
- 4 ожогом (балл - 0)
- 5 операциями на веках (балл - 0)

33 При блефарохалазисе наблюдается:

Варианты ответов

- 1 заворот (балл - 0)
- 2 снижение зрения из-за опущения века (балл - 9)
- 3 выворот (балл - 0)
- 4 трихиаз (балл - 0)
- 5 рубец на веке (балл - 0)

34 При трихиазе необходимо проводить:

Варианты ответов

- 1 биопокрывание роговицы (балл - 0)
- 2 физиотерапию (балл - 0)
- 3 пластику века (балл - 9)
- 4 инсталляцию антибиотиков (балл - 0)
- 5 закладывание актовегина (балл - 0)

35 Врожденный птоз обусловлен:

Варианты ответов

- 1 спазмом аккомодации (балл - 0)
- 2 неполноценностью развития мышцы, поднимающей верхнее веко (балл - 9)
- 3 парезом ветвей тройничного нерва (балл - 0)
- 4 спазмом круговой мышцы век (балл - 0)
- 5 колобомой века (балл - 0)

36 Спастический выворот век развивается при:

Варианты ответов

- 1 трахоме (балл - 0)
- 2 поражении тройничного нерва (балл - 0)
- 3 снижении эластичности кожи (балл - 0)
- 4 хроническом блефароконъюнктивите (балл - 9)
- 5 трихиазе (балл - 0)

37 Атонический выворот возникает при:

Варианты ответов

- 1 конъюнктивите (балл - 0)
- 2 парезе ветвей лицевого нерва (балл - 0)
- 3 старческой атрофии круговой мышцы век (балл - 9)
- 4 грыже нижнего века (балл - 0)
- 5 халазионе (балл - 0)

38 При параличе лицевого нерва развивается:

Варианты ответов

- 1 спастический выворот века (балл - 0)
- 2 паралитический выворот века (балл - 9)
- 3 атонический выворот века (балл - 0)
- 4 рубцовый выворот века (балл - 0)
- 5 врожденный выворот века (балл - 0)

39 Ожоги век могут быть причиной:

Варианты ответов

- 1 рубцового выворота век (балл - 9)
- 2 паралитического выворота век (балл - 0)
- 3 атонического выворота век (балл - 0)
- 4 спастического выворота век (балл - 0)
- 5 врожденного выворота век (балл - 0)

40 При подозрении на меланому конъюнктивы необходимо проводить:

Варианты ответов

- 1 биопсию опухоли с морфологическим исследованием биоптата (балл - 0)
- 2 биопсию опухоли с иммуногистохимическим исследованием биоптата (балл - 0)
- 3 аспирационная биопсия с цитологическим исследованием пунктата (балл - 0)
- 4 аспирационная биопсия с цитоиммунохимическим исследованием пунктата (балл - 0)
- 5 радиоизотопное исследование опухоли (балл - 9)

41 При общем обследовании пациента с увеальной меланомой для исключения метастазирования необходимо проводить:

Варианты ответов

- 1 ультразвуковое исследование печени (балл - 9)
- 2 сцинтиграфию костей скелета (балл - 0)



- 3 стерильную пункцию (балл - 0)
- 4 термографию периферических лимфоузлов (балл - 0)
- 5 трепанобиопсию бедренной кости (балл - 0)

42 Ложный экзофтальм наблюдается при:

Варианты ответов

- 1 ретробульбарной гематоме (балл - 0)
- 2 односторонней высокой миопии (балл - 9)
- 3 псевдотуморе (балл - 0)
- 4 эндокринной офтальмопатии (балл - 0)
- 5 лимфоме (балл - 0)

43 Пониженное зрение при экзофтальме может быть вследствие:

Варианты ответов

- 1 непосредственного давления на зрительный нерв (балл - 9)
- 2 давления на кровеносные сосуды (балл - 0)
- 3 хемоза конъюнктивы (балл - 0)
- 4 отека век (балл - 0)
- 5 покраснения кожи век (балл - 0)

44 Причинами билатерального экзофтальма являются:

Варианты ответов

- 1 тромбоз кавернозного синуса (балл - 0)
- 2 эндокринная офтальмопатия (балл - 9)
- 3 аневризма глазничной артерии (балл - 0)
- 4 рак слезной железы (балл - 0)
- 5 абсцесс орбиты (балл - 0)

45 Односторонний экзофтальм характерен для:

Варианты ответов

- 1 миопия слабой степени (балл - 0)
- 2 острый приступ глаукомы (балл - 0)
- 3 менингиома (балл - 9)
- 4 дакриоцистит (балл - 0)
- 5 птоз (балл - 0)

46 Пульсирующий экзофтальм наблюдается при:

Варианты ответов

- 1 артерио-венозном соустье между внутренней сонной артерией и кавернозным синусом (балл - 9)
- 2 мукоцеле (балл - 0)
- 3 абсолютно болящей глаукоме (балл - 0)
- 4 дакриоадените (балл - 0)
- 5 остеосаркоме (балл - 0)

47 Неотложная помощь при флегмоне:

Варианты ответов

- 1 вскрытие и дренирование орбиты (балл - 9)
- 2 тепло (балл - 0)
- 3 местно - кортикостероиды (балл - 0)
- 4 динамическое наблюдение (балл - 0)
- 5 ограничится пункцией орбиты (балл - 0)

48 Диффузное острое воспаление орбитальной клетчатки - это:

Варианты ответов

- 1 остеопериостит (балл - 0)
- 2 флегмона (балл - 9)
- 3 абсцесс (балл - 0)
- 4 фурункул (балл - 0)
- 5 ячмень (балл - 0)

49 Ретракция верхнего века наблюдается при:

Варианты ответов

- 1 каротидно-кавернозном соустье (балл - 0)
- 2 менингиоме (балл - 0)
- 3 эндокринном экзофтальме (балл - 9)
- 4 флегмоне орбиты (балл - 0)
- 5 абсцесс верхнего века (балл - 0)