Блок. Кишечные инфекции

1. УКАЖИТЕ СОЧЕТАНИЕ СИМПТОМОВ, ХАРАКТЕРНОЕ ДЛЯ ХОЛЕРЫ
   А) обильный водянистый стул без запаха, отсутствие болей в животе и тошноты, без лихорадки
   Б) тошнота, рвота
   В) водянистый зловонный стул
   Г) жидкий, зеленоватой окраски стул, диффузные боли в животе
2. УКАЖИТЕ СИМПТОМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ПРИЗНАКОМ ДЕКОМПЕНСИРОВАННОГО ОБЕЗВОЖИВАНИЯ
   А) гипотермия
   Б) генерализованные судороги
   В) гипертермия
   Г) анурия
3. КАКОВ ПРОЦЕНТ ПОТЕРИ МАССЫ ТЕЛА ПРИ АЛГИДНОЙ ФОРМЕ ХОЛЕРЫ
   А) 3%
   Б) 6%
   В) 9%
   Г) 10% и более
4. УКАЖИТЕ ПРЕПАРАТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОГО ХОЛЕРОЙ 3 СТЕПЕНИ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ
   А) регидрон
   Б) цитроглюкосолан
   В) 5% раствор глюкозы
   Г) «Трисоль»
5. УКАЖИТЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДИАРЕИ ПРИ ХОЛЕРЕ
   А) проникновение вибриона в энтероциты
   Б) слущивание эпителия слизистой оболочки тонкой кишки
   В) поражение вегетативной иннервации тонкой кишки
   Г) воздействие токсических субстанций на ферментные системы энтероцитов
6. УКАЖИТЕ ХАРАКТЕР СТУЛА ПРИ ХОЛЕРЕ
   А) обильный, водянистый, зловонный
   Б) обильный, водянистый, без калового запаха и окраски
   В) обильный, водянистый, зеленоватой окраски
   Г) водянистый, с примесью крови
7. КАКОЕ ЗВЕНО ПАТОГЕНЕЗА ОПРЕДЕЛЯЕТ ТЯЖЕСТЬ ТЕЧЕНИЯ ХОЛЕРЫ
   А) интоксикация
   Б) изотоническая дегидратация
   В) инвазия возбудителя в слизистую оболочку кишечника
   Г) генерализация инфекционного процесса
8. В КАКОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ СУБСТРАТЕ ОТ БОЛЬНОГО МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ ВОЗБУДИТЕЛЯ ХОЛЕРЫ?
   А) кровь
   Б) моча

В) кал
Г) слюна

9. УКАЖИТЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХОЛЕРОЙ I СТЕПЕНИ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ
   А) трисоль
   Б) дисоль
   В) хлосоль
   Г) регидрон
10. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ БОТУЛИЗМА
   А) нарушение синтеза холинацетилтрансферазы
   Б) снижение уровня ацетилхолина в нервных синапсах
   В) развитие параличей и парезов
   Г) воздействие токсина на парасимпатическую нервную систему
   Д) все перечисленное
11. ПРОЯВЛЕНИЯМИ ГАСТРОЭНТЕРИТИЧЕСКОГО ВАРИАНТА НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА БОТУЛИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ, КРОМЕ
   А) схваткообразных болей в эпигастральной области
   Б) однократной или двукратной рвотой съеденной пищей, послабления стула
   В) сухости слизистых оболочек рта
   Г) затруднения прохождения пищи по пищеводу («комок в горле»)
   Д) высокой температуры с ознобом
12. ПРОЯВЛЕНИЯМИ ГЛАЗНОГО ВАРИАНТА НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА БОТУЛИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ, КРОМЕ
   А) «острая дальнозоркость»
   Б) сужение зрачков, близорукость
   В) диплопия
   Г) мидриаз
   Д) анизокория
13. ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПИЩЕВОЙ ТОКСИКОИНФЕКЦИЕЙ II СТЕПЕНИ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ:
   А) тетрациклин
   Б) ципрофлоксацин
   В) физиологический раствор
   Г) цитроглюкосолан
14. ПРИ НЕИЗВЕСТНОМ ТИПЕ ТОКСИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОТУЛИЗМА ИСПОЛЬЗУЮТ:
   А) моновалентную сыворотку соответствующего типа
   Б) смесь моновалентных сывороток или поливалентную сыворотку
   В) только антибиотики
   Г) иммуноглобулин человека нормальный
15. КАКОВ ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ИЕРСИНИОЗОВ
   А) аэрозольный
   Б) фекально-оральный
   В) трансмиссивный
   Г) контактный

16. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ ФОРМЫ ИЕРСИНИОЗОВ
    А) секреторная диарея
    Б) воспалительный процесс в кишечнике
    В) токсико-аллергические реакции
    Г) эндотоксемия
    Д) все вышеперечисленное верно
17. ДЛЯ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ФОРМЫ ИЕРСИНИОЗОВ ХАРАКТЕРНО
    А) длительная лихорадка
    Б) миалгия и артралгия
    В) гепатолиенальный синдром
    Г) экзантема
    Д) все вышеперечисленное верно
    Е) все вышеперечисленное неверно
18. УКАЖИТЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ИЕРСИНИОЗОВ
    А) абдоминальная
    Б) катаральная
    В) гастроинтестинальная
    Г) вторично-очаговая
    Д) верны ответы 2, 3, 4
    Е) верны ответы 1, 3, 4
19. ДЛЯ ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ ИЕРСИНИОЗОВ ИСПОЛЬЗУЮТ
    А) фторхинолоны
    Б) аминогликозиды
    В) цефалоспорины III поколения
    Г) все вышеперечисленное верно
    Д) все вышеперечисленное неверно
20. ОСНОВНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ПАТОГЕНЕЗА БРЮШНОГО ТИФА ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ, КРОМЕ
    А) бактериемии
    Б) интоксикации
    В) сенсибилизации лимфатического аппарата тонкой кишки
    Г) стадийного образования язв в стенке кишки: мозговидное набухание — некроз — формирование язв — период чистых язв — заживление
    Д) секреторной диареи
21. МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ НЕКРОЗА ПЕЙЕРОВЫХ БЛЯШЕК И СОЛИТАРНЫХ ФОЛЛИКУЛОВ
    А) сенсибилизация лимфатических образований, развитие реакции гиперчувствительности замедленного типа
    Б) токсическое воздействие желчи при заболевании
    В) активизация и воздействие условно-патогенной флоры
    Г) отсутствие щадящей диеты на 1-й неделе заболевания
    Д) усиленная перистальтика кишечника
22. ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА БРЮШНОГО ТИФА ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ, КРОМЕ

А) лихорадки
Б) скудной петехиальной сыпи
В) слабости, вялости, адинамии
Г) гепатолиенального синдрома
Д) отечного языка со свободными от налета краями и кончиком

23. УКАЖИТЕ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ШИГЕЛЛЕЗА (ДИЗЕНТЕРИИ)
А) обильный водянистый стул без патологических примесей
Б) скудный стул с примесью слизи и крови, тенезмы
В) рвота, не приносящая облегчения
Г) длительная лихорадка волнообразного характера
24. КАКОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО ПРИ ТЯЖЕЛОМ ТЕЧЕНИИ ШИГЕЛЛЕЗА?
А) инфекционно-токсический шок
Б) кишечная непроходимость
В) перфорация кишечника
Г) токсический гепатит
25. ВОЗБУДИТЕЛЬ ПАРАТИФА А ОТНОСИТСЯ К РОДУ:
А) Shigella
Б) Salmonella
В) Escherichia
Г) Yersinia
26. КАКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ ПАРАТИФА А ПО СРАВНЕНИЮ С БРЮШНЫМ ТИФОМ?
А) более легкое течение и более короткий инкубационный период
Б) отсутствие гепатоспленомегалии
В) обильная розеолезная сыпь с первых дней болезни
Г) преимущественное поражение толстого кишечника
27. КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ СИНДРОМЫ ПРИ БОТУЛИЗМЕ? (укажите несколько вариантов ответов)
А) Интоксикационный
Б) Менингеальный
В) Гастроинтестинальный
Г) Паралитический