# Блок. Воздушно-капельные инфекции

ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

1. ВЫБЕРИТЕ ВЕРНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ О ВОЗБУДИТЕЛЕ ГРИППА (укажите несколько вариантов ответов)
   А. Является ДНК-содержащим вирусом
   Б. Относится к семейству Orthomyxoviridae
   В. Избирательно поражает эпителиальные клетки респираторного тракта (преимущественно трахеи)
   Г. Основными поверхностными белками вируса являются гемагглютинин, нейраминидаза, VP1, VP2, VP3
2. В КАЧЕСТВЕ ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ ГРИППА ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ (укажите несколько вариантов ответов)
   А. Риамиловира
   Б. Занамивира
   В. Молнупиравира
   Г. Балоксавира марбоксила
3. ВЫБЕРИТЕ ВЕРНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ О БАЛОКСАВИРЕ МАРБОКСИЛЕ
   А. Воздействует на кэп-зависимую эндонуклеазу (CEN)
   Б. Активен в отношении резистентных к ингибитору нейраминидазы штаммов
   В. Применяется внутрь однократно, вне зависимости от приема пищи
   Г. Является «первой линией» лечения гриппа у беременных
4. К ЛОКАЛИЗОВАННЫМ ФОРМАМ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ В.И. ПОКРОВСКОГО ОТНОСЯТСЯ
   А. Острый ринит
   Б. Острый отит
   В. Острый назофарингит
   Г. Менингококковое носительство
5. К РЕДКИМ ФОРМАМ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ В.И. ПОКРОВСКОГО ОТНОСЯТСЯ (укажите несколько вариантов ответов)
   А. Пневмония
   Б. Менингит
   В. Энцефалит
   Г. Неврит зрительного нерва
6. КРИТЕРИЯМИ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 ЯВЛЯЮТСЯ
   А. Стойкая фебрильная лихорадка
   Б. СРБ сыворотки крови более 10 мг/л
   В. Лактат артериальной крови более 2 ммоль/л
   Г. qSOFA более 2 баллов
7. КРИТЕРИЯМИ СРЕДНЕТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 ЯВЛЯЮТСЯ (укажите несколько вариантов ответов)
   А. Индекс оксигенации ($PaO_2/FiO_2$) ≤ 300 мм рт. ст.

Б. ЧДД более 22 в минуту
В. Нестабильная гемодинамика
Г. SpO2 менее 95%

8. ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ РЕАКЦИЯ
А. ПЦР
Б. РТГА
В. РНГА
Г. ИФА
9. ПРИ ТИПИЧНОМ ТЕЧЕНИИ АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НАБЛЮДАЮТ
А. Реактивный артрит
Б. Терминальный илеит
В. Скудные катаральные явления
Г. Пленчатый конъюнктивит
10. ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЙ ЛИМФАДЕНИТ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ИНФЕКЦИИ
А. Аденовирусной
Б. Энтеровирусной
В. Респираторно-синцитиальной
Г. Герпетической
11. КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ
А. Пневмония, респираторный дистресс-синдром
Б. Трахеобронхит, бронхиолит
В. Ларингит, ринофарингит
Г. Конъюнктивит, фарингит
12. ПРИ ОРВИ ГЕПАТОСПЛЕНОМЕГАЛИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ
А. Аденовирусной инфекции
Б. Респираторно-синцитиальной инфекции
В. Риновирусной инфекции
Г. Пикорновирусной инфекции
13. К ТЯЖЕЛЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ОТНОСЯТ
А. Атипичную аденовирусную пневмонию
Б. Атипичный аденовирусный сепсис
В. Атипичный аденовирусный перитонит
Г. Атипичную аденовирусную лихорадку
14. ИНТОКСИКАЦИОННЫЙ СИНДРОМ ПРИ ОРЗ ОБУСЛОВЛЕН
А. Возбуждением мотонейронов коры головного мозга
Б. Адаптационной реакцией на вирусную агрессию
В. Аутоиммунным ответом
Г. Специфическим действием микробных токсинов
15. ОДНИМ ИЗ ХАРАКТЕРНЫХ СИМПТОМОВ АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ
А. Образование гнойных наложений на слизистой миндалин
Б. Увеличение околоушных желез
В. Пленчатый конъюнктивит
Г. Диарея с примесью крови

16. ДЛЯ ТЕРАПИИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ У ВЗРОСЛЫХ ИСПОЛЬЗУЮТ АЦИКЛОВИР В ДОЗЕ ____ МГ ____ В СУТКИ
    А. 400; 5 раз
    Б. 800; 5 раз
    В. 400; 3 раза
    Г. 800; 4 раза
17. ВИРУС ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ ОТНОСИТСЯ К СЕМЕЙСТВУ
    А. Парамиксовирусов
    Б. Герпесвирусов
    В. Ортомиксовирусов
    Г. Пикорнавирусов
18. ПРИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ ОБЫЧНО НЕ БЫВАЕТ ВЫСЫПАНИЙ НА
    А. Лице
    Б. Ладонях и подошвах
    В. Волосистой части головы
    Г. Туловище и конечностях
19. ПРИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ ВЫСЫПАНИЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ
    А. Толчкообразно с промежутками в 3–4 дня
    Б. Одномоментно
    В. Толчкообразно с промежутками в 1–2 дня
    Г. Этапно: в первые сутки на лице, во вторые сутки на туловище и руках, в третьи сутки на ногах
20. ПРИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ ПОЯВИВШИЕСЯ ВЕЗИКУЛЫ ПРИ ПРОКОЛЕ
    А. Многокамерные, спадаются
    Б. Однокамерные, не спадаются
    В. Однокамерные, спадаются
    Г. Многокамерные, не спадаются
21. ДЛЯ ВЕТРЯНОЧНЫХ ЭНЦЕФАЛИТОВ ХАРАКТЕРНО
    А. Выраженная ригидность затылочных мышц
    Б. Отсутствие вестибуляторных нарушений
    В. Поражение мозжечка
    Г. Выраженность симптомов Кернига и Брудзинского
22. СЫПЬ ПРИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ
    А. По всему телу, со сгущением элементов сыпи на сгибательных поверхностях конечностей, в естественных складках
    Б. По всему телу, исключая волосистую часть головы, ладони и подошвы
    В. По всему телу беспорядочно, не исключая волосистую часть головы
    Г. Преимущественно на спине, ягодицах, по задней поверхности бедер, вокруг суставов
23. ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОВОДЯТ ОДНОКРАТНО ОДНОЙ ДОЗОЙ ВАКЦИНЫ ПОСЛЕ КОНТАКТА С БОЛЬНЫМ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ
    А. 4 часов
    Б. 7 дней

В. 24 часов
Г. 72 часов

24. ВИРУС, ВЫЗЫВАЮЩИЙ ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАЙ, ИДЕНТИЧЕН
    А. Вирусу простого герпеса 2 типа
    Б. Цитомегаловирусу
    В. Вирусу ветряной оспы
    Г. Вирусу простого герпеса 1 типа
25. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОПОЯСЫВАЮЩЕГО ЛИШАЯ ПРИМЕНЯЮТ
    А. Рибавирин
    Б. Фамцикловир
    В. Ганцикловир
    Г. Цидофовир
26. ЭЛЕМЕНТАМИ СЫПИ, ХАРАКТЕРНЫМИ ДЛЯ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ, ЯВЛЯЮТСЯ
    А. Папула, везикула
    Б. Везикула, корочка, белый рубчик
    В. Петехии, некроз, рубчик
    Г. Розеола, уртикария, пустула
27. СЕРОЛОГИЧЕСКИМ МАРКЕРОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ОСТРОЙ ФАЗЫ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ, ЯВЛЯЕТСЯ
    А. IgM
    Б. IgG
    В. IgA
    Г. IgE
28. ИНАППАРАНТНЫЕ ФОРМЫ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ
    А. Очень тяжелым течением
    Б. Отсутствием клинических симптомов
    В. Внезапным самопроизвольным прекращением инфекционного процесса
    Г. Быстрым развитием характерных клинических симптомов
29. ПРИ ОПОЯСЫВАЮЩЕМ ЛИШАЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОРАЖАЮТСЯ УЧАСТКИ КОЖИ, ИННЕРВИРУЕМЫЕ НЕРВАМИ
    А. Пояснично-крестцовыми
    Б. Шейными
    В. Тройничным и спинальными
    Г. Грудными
30. ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ГЕРПЕС МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ У ЧЕЛОВЕКА, ПЕРЕНЕСШЕГО
    А. Ветряную оспу
    Б. Цитомегаловирусную инфекцию
    В. Простой герпес
    Г. Инфекционный мононуклеоз
31. БОЛЬНОЙ ВЕТРЯНОЙ ОСПОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ ДО
    А. 9 дня с момента появления последнего элемента сыпи
    Б. Дня появления сыпи
    В. Дня «отпадения корочек»
    Г. 5 дня с момента появления последнего элемента сыпи

32. ВИРУС ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ И ОПОЯСЫВАЮЩЕГО ЛИШАЯ ОТНОСИТСЯ К ПОДСЕМЕЙСТВУ
    А. Gammaherpesvirinae
    Б. Betaherpesvirinae
    В. Alphaherpesvirinae
    Г. Deltaherpesvirinae
33. ЛЕВОСТОРОННЯЯ МЕЖРЕБЕРНАЯ НЕВРАЛГИЯ ПРИ HERPES ZOSTER ТРЕБУЕТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ С
    А. Бруцеллезом
    Б. Лептоспирозом
    В. Трихинеллезом
    Г. Инфарктом миокарда
34. НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЖЕГОДНОЙ ИММУНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ГРИППА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
    А. Изменчивостью циркулирующих штаммов вируса гриппа и непродолжительностью формирующегося иммунитета
    Б. Недостаточным охватом населения профилактическими прививками и ежегодными эпидемиями гриппа
    В. Несвоевременной иммунизацией и высокой заболеваемостью гриппом
    Г. Низкой иммуногенностью вакцин
35. ГЕМАГГЛЮТИНИН ПРИСУТСТВУЕТ У ВИРУСА
    А. Гриппа
    Б. Цитомегаловируса
    В. Полиомиелита
    Г. Респираторно-синцитиального
36. ПРОТИВОГРИППОЗНЫМ ПРЕПАРАТОМ, ВВОДИМЫМ ПУТЕМ ПЕРОРАЛЬНОЙ ИНГАЛЯЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ
    А. Занамивир
    Б. Умифеновир
    В. Триазавирин
    Г. Осельтамивир
37. К РНК-СОДЕРЖАЩИМ ВИРУСАМ ОТНОСЯТ
    А. Вирус гриппа
    Б. Аденовирус
    В. Герпесвирус
    Г. Вирус гепатита В
38. ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫХ ВТОРИЧНЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ГРИППА ЯВЛЯЕТСЯ
    А. Стрептодермия
    Б. Тубоотит
    В. Менингизм
    Г. Гломерулонефрит
39. ПРИ ВЫРАЖЕННОЙ ОДЫШКЕ (ЧДД БОЛЕЕ 28–30 В МИНУТУ У ВЗРОСЛЫХ) БОЛЬНОМУ ГРИППОМ НЕОБХОДИМО СРОЧНО ВЫПОЛНИТЬ
    А. Пульсоксиметрию

Б. Спирографию
В. МРТ легких (исследование с контрастом)
Г. Мазок из носоглотки методом ПЦР на вирус гриппа H1N1 Swine

40. ПОКАЗАНИЯМИ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ ПРИ ГРИППЕ ЯВЛЯЮТСЯ
А. Обильная пятнисто-папуллезная зудящая сыпь на теле, кровоизлияние в склеру глаза, лейкоцитоз в клиническом анализе крови
Б. Температура тела 39°С, ознобы, головокружение, выраженные миалгии и артралгии, СРБ более 50 мг/л
В. Сильные головные боли, заложенность и гнойные выделения из носа, рентгенологически — затемнение верхнечелюстных пазух
Г. Шок (мраморность кожи, холодные конечности, акроцианоз, систолическое АД менее 90 мм рт. ст., лактат более 2 ммоль/л)
41. ПОКАЗАНИЯМИ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ ПРИ ГРИППЕ ЯВЛЯЮТСЯ
А. Обильные гнойные выделения из носа с 1 дня болезни, нарушение носового дыхания, на ЭКГ — синусовая тахикардия с ЧСС = 106 в 1 минуту
Б. Частый надсадный кашель, иногда до рвоты, боли в грудной клетке, появление гнойной мокроты, в клиническом анализе крови лейкоцитоз 15,0 × $10^9$/л
В. Нарастающая и выраженная одышка, ЧДД более 30 в минуту, SpO2 менее 90%
Г. Температура тела 40°С и более, выраженные миалгии и артралгии первые три дня болезни, уровень глюкозы в крови выше 8,5 ммоль/л
42. ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ОТ ГРИППА НА РАННЕМ СРОКЕ БОЛЕЗНИ (1–3 ДЕНЬ) МОЖЕТ БЫТЬ
А. Абсцедирующая двусторонняя пневмония с развитием дыхательной недостаточности
Б. Тяжелая токсикодермия с развитием анафилактического шока
В. Молниеносная форма с развитием инфекционно-токсического шока и геморрагического отека легких
Г. Острый гастроэнтерит с развитием гиповолемического шока
43. К ОСЛОЖНЕНИЯМ ГРИППА НЕ ОТНОСЯТ
А. Миокардит
Б. Ринофарингит
В. Вирусную пневмонию
Г. Стеноз гортани
44. К ОСЛОЖНЕНИЯМ ГРИППА СО СТОРОНЫ РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА НЕ ОТНОСЯТ
А. Острую пневмонию
Б. Острый фарингит
В. Острый стенозирующий ларинготрахеит
Г. Острый бронхит
45. ВЫСОКОМУ РИСКУ ОСЛОЖНЕНИЙ ОТ ГРИППА ПОДВЕРЖЕНЫ В ТОМ ЧИСЛЕ ПАЦИЕНТЫ
А. С хронической почечной недостаточностью, находящиеся на гемодиализе
Б. Хирургических стационаров, находящиеся в раннем послеоперационном периоде

В. С хроническими сердечно-легочными заболеваниями
Г. С хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта в анамнезе

46. К КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ, МАРКИРУЮЩИМ ТЯЖЕЛЫЕ И ОСЛОЖНЕННЫЕ ФОРМЫ ГРИППА, ОТНОСЯТ
А. Высокую температуру тела до 38,5–39,0°С с ознобами в 1–2 день болезни, головную боль
Б. Сильные миалгии и артралгии, кашель со слизисто-гнойной мокротой, насморк, недомогание
В. Появление генерализованной лимфаденопатии и тяжелого афтозного стоматита
Г. Спутанность сознания или возбуждение, обмороки, судороги, бред, галлюцинации
47. К ИССЛЕДОВАНИЯМ, РЕКОМЕНДОВАННЫМ ПРИ РАЗВИТИИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ ГРИППА, ОТНОСЯТ
А. Протеинограммы и липидограммы
Б. Коагулограммы и уровень тромбоцитов
В. Мазок из носоглотки методом ПЦР на вирус гриппа H1N1 Swine
Г. Биохимический анализ крови на СРБ, КФК, ЛДГ, АСТ
48. НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫМ, ИНОГДА СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ, ОСЛОЖНЕНИЕМ ГРИППА ЯВЛЯЕТСЯ
А. Острый полирадикулоневрит
Б. Отек-набухание головного мозга
В. Острый гнойный трахеобронхит
Г. Бактериальная очаговая пневмония
49. К НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ГРИППА ОТНОСИТСЯ СИНДРОМ
А. Нефротический
Б. Диспептический
В. Астено-вегетативный
Г. Геморрагический
50. СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ГРИППА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
А. Наличием миалгии в анамнезе
Б. Осложненным преморбидным фоном
В. Постепенным началом заболевания
Г. Выраженностью интоксикации
51. АНТИГЕННЫЙ «ДРЕЙФ» ВИРУСА ГРИППА ОБУСЛОВЛИВАЕТ
А. Периодичность эпидемий гриппа
Б. Продолжительность эпидемий
В. Периодичность вспышек гриппа
Г. Сезонную заболеваемость
52. АНТИГЕННЫЙ «ШИФТ» ВИРУСА ГРИППА ОБУСЛОВЛИВАЕТ
А. Продолжительность пандемий гриппа
Б. Периодичность эпидемий гриппа
В. Устойчивость штамма вируса гриппа А
Г. Возникновение пандемий гриппа
53. ЕСТЕСТВЕННЫМ РЕЗЕРВУАРОМ ВИРУСА ГРИППА А (H5N1) ЯВЛЯЮТСЯ
А. Рептилии
Б. Млекопитающие

В. Земноводные
Г. Водоплавающие птицы

54. В ПРОШЛОМ ГРИПП НАЗЫВАЛИ
А. Средиземноморская лихорадка
Б. Мальтийская лихорадка
В. Инфлюэнца
Г. Сибирка

55. ПАНДЕМИЯ ГРИППА 2009–2010 ГГ. ОБУСЛОВЛЕНА
А. Сезонным штаммом вируса гриппа А (H1N1)
Б. Вирусом гриппа А (H1N1)-pdm-09
В. Вирусом гриппа F (H2N2)
Г. Вирусом гриппа (H5N2)

56. ВИРУС ГРИППА ОТНЕСЕН К ГРУППЕ
А. Пневмотропных ДНК-содержащих
Б. Пневмотропных РНК-содержащих
В. Гепатотропных РНК-содержащих
Г. Гепатотропных ДНК-содержащих

57. ВОСПАЛЕНИЯ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ ГРИППЕ ИМЕЮТ _____ ХАРАКТЕР
А. Фибринозно-геморрагический
Б. Катаральный
В. Фибринозно-некротический
Г. Фибринозный

58. ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ЧАЩЕ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ
А. Цитомегаловирусной инфекции
Б. Гриппе
В. Парагриппе
Г. Аденовирусной инфекции

59. К МЕТОДАМ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ ГРИППА ОТНОСЯТ
А. Вирусологический
Б. Молекулярно-генетический
В. Кожно-аллергическую пробу
Г. Бактериологический

60. ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ ГРИППЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕЙКОПЕНИЯ,
А. Умеренный моноцитоз, нормальная или сниженная СОЭ
Б. Нейтрофиллез, ускоренная СОЭ
В. Тромбоцитопения, нормальная или сниженная СОЭ
Г. Эозинофилия, ускоренная СОЭ

61. АНТИГЕННЫЙ «ДРЕЙФ» ВИРУСА ГРИППА А ОБУСЛОВЛЕН
А. Полной заменой антигенных детерминант нейраминидазы на структурные белки вируса в пределах штамма вируса
Б. Точечными мутациями в сайтах генома в пределах штамма вируса
В. Полным изменением структуры антигена с образованием нового штамма

Г. Утратой антигенных детерминант гемагглютинина или нейраминидазы в пределах одного подтипа

62. ПОД АНТИГЕННЫМ «ШИФТОМ» ВИРУСА ГРИППА А ПОНИМАЮТ
    А. Точечные мутации в сайтах генома в пределах штамма вируса
    Б. Полную замену антигенных детерминант нейраминидазы на структурные белки вируса в пределах штамма вируса
    В. Полное изменение структуры антигена с образованием нового штамма
    Г. Утрату антигенных детерминант гемагглютинина или нейраминидазы в пределах одного подтипа
63. ВИРУС ГРИППА ОТНЕСЕН К СЕМЕЙСТВУ
    А. Ретровирусов
    Б. Парамиксовирусов
    В. Коронавирусов
    Г. Ортомиксовирусов
64. РЕПЛИКАЦИЯ ВИРУСА ГРИППА ПРОИСХОДИТ В
    А. Миокардиоцитах
    Б. Гепатоцитах
    В. Эндотелиоцитах
    Г. Эпителиоцитах
65. К ОСНОВНЫМ ЗВЕНЬЯМ ПАТОГЕНЕЗА ГРИППА ОТНОСЯТ
    А. Внедрение и репродукцию вируса в лимфоидных образованиях кишечника
    Б. Развитие внутрисосудистого свертывания в сосудах почек
    В. Внедрение и репродукцию вируса в эпителии трахеи с последующей вирусемией, токсемией
    Г. Поражение мотонейронов спинного мозга
66. К НАЧАЛЬНЫМ СИМПТОМАМ ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКОГО ШОКА ПРИ ГРИППЕ ОТНОСЯТ
    А. Сильную головную боль, гиперемию лица и возбуждение больного
    Б. Снижение артериального давления, уменьшение мочеотделения
    В. Появление симптомов менингизма
    Г. Появление тошноты, многократной рвоты, диареи