Блок. ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ

1. ОСНОВНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦИТОЛИЗА ГЕПАТОЦИТОВ
   А. Повышение уровня билирубина сыворотки крови
   Б. Повышение активности АлАТ и АсАТ
   В. Гипоальбуминемия
   Г. Гипопротромбинемия
   Д. Все перечисленное
2. МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А
   А. Капельный
   Б. Фекально-оральный
   В. Парентеральный
   Г. Половой
   Д. Перинатальный
3. ОСТРЫЙ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А ВЕРИФИЦИРУЕТСЯ
   А. Повышением активности АлАТ
   Б. Повышением уровня билирубина сыворотки крови
   В. Обнаружением антител к вирусу гепатита А класса IgM
   Г. Обнаружением антител к вирусу гепатита А класса IgG
   Д. Повышением уровня иммуноглобулинов основных классов
4. ВИРУС ГЕПАТИТА В
   А. РНК-содержащий гепаднавирус
   Б. ДНК-содержащий гепаднавирус
   В. ДНК-содержащий энтеровирус
   Г. РНК-содержащий пикорнавирус
   Д. РНК-содержащий энтеровирус
5. МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В
   А. Капельный
   Б. Контактный
   В. Парентеральный
   Г. Трансмиссивный
   Д. Фекально-оральный
6. ОСОБЕННОСТЯМИ ДЕЛЬТА-ВИРУСА ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ
   А. Парентеральной передачи инфекции
   Б. Возможности естественного пути передачи вируса
   В. Вирус может размножаться самостоятельно
   Г. Характерно течение процесса в виде коинфекции и суперинфекции
   Д. Для репродукции вируса необходимо наличие HBs-антигена
7. УКАЖИТЕ, КАКОЙ ИЗ СЕРОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ НЕ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ ГЕПАТИТА В
   А. HBsAg
   Б. anti-HBcor IgM
   В. anti-HAV IgM
   Г. anti-HBe IgM

8. УКАЖИТЕ ТИПИЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ БИЛИРУБИНА И ЕГО ФРАКЦИЙ ПРИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ
   А. Повышение связанной фракции
   Б. Повышение связанной и свободной фракций в одинаковой мере
   В. Повышение свободной фракции
   Г. Повышение связанной фракции при умеренном повышении свободного билирубина
9. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЙ ИСХОД ОСТРОГО ГЕПАТИТА С
   А. Фульминантная форма
   Б. Хронизация процесса
   В. Выздоровление
   Г. Летальный исход
10. ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ А
   А. Заболеваемость нередко имеет групповой характер
   Б. Болеют преимущественно лица пожилого возраста
   В. Максимальная контагиозность больных — в желтушном периоде
   Г. Наиболее вероятный исход — хронизация
11. ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ В
   А. Заражение происходит алиментарным путем
   Б. Заражение половым путем представляет казуистическую редкость
   В. Возможно интранатальное заражение
   Г. Заражение происходит водным путём
12. СИНДРОМУ ХОЛЕСТАЗА ПРИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ СООТВЕТСТВУЕТ
   А. Повышение активности АЛТ
   Б. Повышение показателя тимоловой пробы
   В. Повышение уровня ГГТП
   Г. Повышение уровня непрямого билирубина
13. ОСНОВНЫМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ ПРИ ОСТРОМ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ В ЯВЛЯЕТСЯ
   А. Иммуноопосредованный цитолиз гепатоцитов
   Б. Прямой цитопатический эффект HBV в отношении гепатоцитов
   В. Формирование аллергических реакций
   Г. Все перечисленное
14. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИНКУБАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПРИ ОСТРОМ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ А СОСТАВЛЯЕТ
   А. 10–14 дней
   Б. 7–50 дней
   В. до 6 месяцев
   Г. 1–3 месяца
15. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИНКУБАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПРИ ОСТРОМ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ В СОСТАВЛЯЕТ
   А. 7–50 дней
   Б. 1–3 месяца
   В. до 6 месяцев
   Г. 10–14 дней

16. КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ЦИТОЛИЗА ПРИ ОСТРЫХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ ЯВЛЯЕТСЯ
    А. Интоксикационный синдром
    Б. Гепатоспленомегалия
    В. Иктеричность кожных покровов и склер
    Г. Кожный зуд
17. КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ХОЛЕСТАЗА ПРИ ОСТРЫХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ ЯВЛЯЕТСЯ
    А. Геморрагическая сыпь
    Б. Гепатомегалия
    В. Кожный зуд
    Г. Интоксикационный синдром
18. ДЛЯ ОСТРОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А ХАРАКТЕРНО
    А. Улучшение состояния больных в начале желтушного периода
    Б. Тяжелое течение болезни
    В. Частое формирование хронизации инфекционного процесса
    Г. Ухудшение состояния больных в начале желтушного периода
19. ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ОСТРОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА D ЯВЛЯЕТСЯ
    А. Преобладание в структуре заболеваемости безжелтушного варианта
    Б. Двухволновое течение с клинико-ферментативным обострением на 15–32 сутки от начала желтухи
    В. Тяжелое течение с быстрым развитием острой печеночной недостаточности
    Г. Чаще бессимптомное течение
20. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ БИОХИМИЧЕСКИМ ТЕСТОМ В ПРЕДЖЕЛТУШНОМ ПЕРИОДЕ ОСТРЫХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ ЯВЛЯЕТСЯ
    А. Определение активности АЛТ и АСТ
    Б. Определение уровня общего билирубина
    В. Определение содержания белковых фракций крови
    Г. Определение уровня ГГТП
21. ОСНОВНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ МАРКЕРОМ ОСТРОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А ЯВЛЯЕТСЯ
    А. HAAg
    Б. Анти-HA IgM
    В. Анти-HA IgG
    Г. HBsAg
22. ДЛИТЕЛЬНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ HBsAg ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ОСТРОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ЯВЛЯЕТСЯ КРИТЕРИЕМ
    А. Развитие фиброза печени
    Б. Хронизации процесса
    В. Активной репликации вируса
    Г. Развития цирроза печени
23. ПРИЗНАК АКТИВНОЙ РЕПЛИКАЦИИ HBV — НАЛИЧИЕ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
    А. HBsAg
    Б. HBeAg

В. HBcAg
Г. Anti-HBcor IgM

24. КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ ЯВЛЯЮТСЯ СОВРЕМЕННЫМ «ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С
    А. Пегилированные интерфероны в комбинации с рибавирином
    Б. Препараты прямого противовирусного действия (ППРД) (софосбувир, ледипасвир, велпатасвир)
    В. Глюкокортикостероиды
    Г. Аналоги нуклеозидов (ламивудин, телбивудин)
25. КАКИЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШАЮТ РИСК ПЕРЕХОДА ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА В В ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ (укажите несколько вариантов ответов)
    А. Употребление алкоголя
    Б. Ко-инфекция с гепатитом D
    В. Молодой возраст на момент инфицирования
    Г. Ко-инфекция с ВИЧ
    Д. Мужской пол
26. ДЛЯ КАКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ ХАРАКТЕРНО РАЗВИТИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ (укажите несколько вариантов ответов)
    А. Гепатит А
    Б. Гепатит В
    В. Гепатит С
    Г. Гепатит D
    Д. Гепатит Е (у иммуносупрессированных лиц)
27. КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С (укажите несколько вариантов ответов)
    А. Софосбувир
    Б. Энтекавир
    В. Ледипасвир
    Г. Даклатасвир
    Д. Тенофовир
28. КАКИЕ ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ВИРУСА ГЕПАТИТА В (укажите несколько вариантов ответов)
    А. Фекально-оральный
    Б. Парентеральный
    В. Вертикальный
    Г. Половой
    Д. Воздушно-капельный
29. КАКИЕ МЕРЫ ОТНОСЯТСЯ К СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ (укажите несколько вариантов ответов)
    А. Вакцинация против гепатита В
    Б. Тщательное мытьё рук и контроль качества воды
    В. Использование стерильных инструментов в медицине и косметологии
    Г. Вакцинация против гепатита А (в группах риска)
    Д. Безопасный секс и отказ от инъекционного употребления наркотиков

30. КАКИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ СУПЕРИНФЕКЦИИ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА D (укажите несколько вариантов ответов)
    А. Одновременное заражение вирусами B и D
    Б. Присоединение HDV к уже существующей хронической инфекции HBV
    В. Более высокий риск тяжёлого течения и быстрого прогрессирования в цирроз
    Г. Частое развитие фульминантного (молниеносного) гепатита
    Д. Обычно благоприятный прогноз и быстрое выздоровление