Блок. ГЕЛЬМИНТОЗЫ

1. ИСТОЧНИКОМ ИНВАЗИИ И ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ ХОЗЯИНОМ ПРИ ТОКСОКАРОЗЕ ЯВЛЯЮТСЯ
   А. Грызуны
   Б. Собаки
   В. Свиньи
   Г. Люди

2. ТОКСОКАРОЗ ЧЕЛОВЕКА ОТНОСИТСЯ К
   А. Тканевым простейшим
   Б. Тканевым гельминтозам
   В. Кишечным гельминтозам
   Г. Кишечным простейшим

3. У ЧЕЛОВЕКА ПРИ ТОКСОКАРОЗЕ ПРОИСХОДИТ
   А. Миграция личинок, высвободившихся из яиц в кишечнике
   Б. Оплодотворение в кишечнике и отрождение живых личинок самками
   В. Развитие в кишечнике половозрелых особей
   Г. Оплодотворение в кишечнике и яйцекладка самками

4. ПРИ МИГРАЦИИ ЛИЧИНОК ТОКСОКАР В ТКАНЯХ ФОРМИРУЮТСЯ
   А. Эозинофильные гранулемы
   Б. Многочисленные кисты
   В. Кальцинаты
   Г. Обширные некрозы

5. ТЯЖЕСТЬ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ТОКСОКАРОЗА ЗАВИСИТ ОТ
   А. Состояния и реакции иммунной системы
   Б. Состояния желудочно-кишечного тракта
   В. Наличия стресса
   Г. Фактора переохлаждения

6. КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ТОКСОКАРОЗА МЕТОДОМ ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕКАЛИЙ ПОСЛЕ ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИИ
   А. Проводится через 7 дней
   Б. Проводится через 14 дней
   В. Проводится через 30 дней
   Г. Не проводится

7. СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ТОКСОКАРОЗА ПРОВОДИТСЯ
   А. Хлоксилом
   Б. Метронидазолом
   В. Альбендазолом

Г. Празиквантелем

8. ГЕЛЬМИНТОМ, ВЫЗЫВАЮЩИМ СИНДРОМ «LARVA MIGRANS» ИЛИ СИНДРОМ «БЛУЖДАЮЩЕЙ ЛИЧИНКИ», ЯВЛЯЕТСЯ
А. Острица
Б. Бычий цепень
В. Широкий лентец
Г. Токсокара

9. ДИАГНОЗ ТОКСОКАРОЗА МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН НА ОСНОВАНИИ
А. Повышения гемоглобина в крови и результатов ИФА (менее 1:800)
Б. Эозинофилии крови и результатов ИФА (менее 1:800)
В. Эозинофилии крови и результатов ИФА (1:800 и выше)
Г. Повышения гемоглобина в крови и результатов ИФА (1:800 и выше)

10. В ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ ТОКСОКАРОЗЕ ГРАНУЛЕМАХ, ТОКСОКАРЫ
А. Репродуцируются
Б. Сохраняются длительное время
В. Отсутствуют
Г. Гибнут

11. Какое животное является единственным окончательным хозяином Ascaris lumbricoides?
· А) Домашние животные
· Б) Крупный рогатый скот
· В) Человек
· Г) Рыбы

12.К какой группе заболеваний относится аскаридоз?
· А) Биогельминтозы
· Б) Контактные гельминтозы
· В) Геогельминтозы
· Г) Протозоозы

13.Сколько времени занимает миграция личинок в организме человека до их повторного попадания в ЖКТ?
· А) Около 7 дней
· Б) Около 14 дней
· В) Около 30 дней
· Г) Около 70-75 суток

14. Какое содержание эозинофилов в периферической крови характерно для ранней (миграционной) фазы аскаридоза при высокой интенсивности инвазии?
· А) 5% и более

· Б) 10% и более
· В) 20% и более
· Г) 50% и более

15. Какой синдром, выявляемый на рентгенограммах легких, связан с развитием «летучих» эозинофильных инфильтратов вокруг личинок аскарид?
· А) Синдром Лёффлера
· Б) Синдром Квинке
· В) Бронхо-обструктивный синдром
· Г) Синдром раздражения брюшины

16. Какой метод диагностики является наиболее информативным и абсолютным критерием подтверждения аскаридоза?
· А) Обнаружение антител к аскаридам методом ИФА
· Б) Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов
· В) Выявление эозинофилии в клиническом анализе крови
· Г) ПЦР-диагностика фекалий

17. Через какой промежуток времени после окончания терапии рекомендуется проводить контрольное микроскопическое исследование кала для оценки эффективности лечения?
· А) Через 7 дней
· Б) Через 14 дней
· В) Через 1 месяц
· Г) Через 3 месяца

18. Какая схема приема альбендазола рекомендована для взрослых и детей старше 2 лет с массой тела более 60 кг при аскаридозе?
· А) 200 мг однократно
· Б) 400 мг однократно
· В) 400 мг в сутки в течение 3 дней
· Г) 15 мг/кг в 2 приема

19. Требуется ли изоляция больного аскаридозом?
· А) Да, обязательно в стационаре
· Б) Да, на дому в течение 14 дней
· В) Нет, изоляция не требуется
· Г) Да, только в детских коллективах

20. Какой препарат НЕ входит в перечень рекомендованных клиническими рекомендациями РФ антигельминтных средств для лечения аскаридоза ?
· А) Албендазол
· Б) Мебендазол
· В) Пирантел
· Г) Празиквантель

21.Какие пути передачи характерны для аскаридоза? (укажите несколько вариантов ответов)
· А) Пищевой
· Б) Трансмиссивный
· В) Водный
· Г) Парентеральный

22. Какие клинические проявления характерны для ранней (миграционной) фазы аскаридоза? (укажите несколько вариантов ответов)
· А) Сухой или влажный кашель
· Б) Уртикарная экзантема, зуд кожи
· В) Субфебрильная температура, слабость
· Г) Выраженный абдоминальный болевой синдром в околопупочной области

23. Какие осложнения относятся к внекишечным осложнениям аскаридоза? (укажите несколько вариантов ответов)
· А) Гнойный холангит
· Б) Абсцессы печени
· В) Кишечная непроходимость
· Г) Синуситы

24. Какие препараты рекомендованы для эрадикации гельминтов при аскаридозе? (укажите несколько вариантов ответов)
· А) Албендазол
· Б) Метронидазол
· В) Мебендазол
· Г) Пирантел

25. Какие инструментальные и лабораторные исследования проводятся по показаниям для диагностики осложнений аскаридоза? (укажите несколько вариантов ответов)
· А) Рентгенография легких при поражении дыхательной системы
· Б) УЗИ органов брюшной полости при выраженном болевом синдроме
· В) Микроскопическое исследование мокроты в раннюю фазу
· Г) Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) в качестве основного метод

26. Какие методы обогащения кала указаны в клинических рекомендациях для микроскопической диагностики аскаридоза? (укажите несколько вариантов ответов)
· А) Метод эфир-формалиновой седиментации
· Б) Метод флотации
· В) ПЦР-исследование фекалий
· Г) Иммуноферментный анализ крови

27. Какие утверждения о применении ИФА верны? (укажите несколько вариантов ответов)

· А) Серологический тест может давать как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты
· Б) Положительный результат ИФА не является основанием для подтверждения диагноза «аскаридоз» и назначения антигельминтной терапии
· В) Положительный результат ИФА должен быть подтверждён микроскопическим обнаружением яиц гельминта в фекалиях
· Г) ИФА является абсолютным критерием диагностики аскаридоза

28. ПРЕДЕЛЬНЫЙ СРОК ЖИЗНИ ВОЗБУДИТЕЛЯ ОПИСТОРХОЗА В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ

А. До 30 лет
Б. До 10 лет
В. 1 месяц
Г. 1 год

29. ЗАРАЖЕНИЕ ОПИСТОРХОЗОМ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ

А. Немытых овощей и фруктов
Б. Карповых пород рыб (язь, плотва, лещ, пескарь)
В. Мяса крупного рогатого скота
Г. Хищных пород рыб (щука, окунь, ерш)

30. ОПИСТОРХОЗ ОТНОСИТСЯ К

А. Трематодозам
Б. Нематодозам
В. Цестодозам
Г. Контактным гельминтозам

31. ОПИСТОРХОЗ – ЭТО

А. Геогельминтоз
Б. Трансмиссивный гельминтоз
В. Пероральный биогельминтоз
Г. Контактных гельминтоз

32. ВОЗБУДИТЕЛЕМ ОПИСТОРХОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

А. Бычий цепень
Б. Свиной цепень
В. Рыбий цепень
Г. Кошачья двуустка

33. ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ХОЗЯИНОМ ПРИ ОПИСТОРХОЗЕ ЯВЛЯЮТСЯ

А. Комары рода Anopheles
Б. Пресноводные моллюски рода Bithynia
В. Москиты рода Phlebotomus
Г. Клещи рода Ixodes

34. ФАКТОРА ПЕРЕДАЧИ ОПИСТОРХОЗА ЯВЛЯЮТСЯ

А. Загрязненные овощи и ягоды
Б. Свинина, мясо диких животных
В. Рыбы карповых пород
Г. Говядина сыровяленая, яйца кур

35. ПРИ ОПИСТОРХОЗЕ ПОРАЖАЕТСЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА

А. Мочевыделительная
Б. Дыхательная
В. Гепатобилиарная
Г. Опорно-двигательная

36. ВАЖНЫМ КРИТЕРИЕМ ДИАГНОСТИКИ ОПИСТОРХОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

А. Нейтропения
Б. Анэозинофилия
В. Лимфомоноцитоз
Г. Гиперэозинофилия

37. ХРОНИЧЕСКИЙ ОПИСТОРХОЗ ПРОТЕКАЕТ В ВИДЕ

А. Кардиопатии
Б. Нефропатии
В. Артропатии
Г. Холицистопатии

38. Невооруженный цепень вызывает заболевание:
А. Фасциолез
Б. Тениоз
В. Парагонимоз
Г. Тениаринхоз
Д. Описторхоз

39. Вооруженный цепень вызывает заболевание:
А. Описторхоз
Б. Фасциолез
В. Тениоз
Г. Тениаринхоз
Д. Парагонимоз

40. Личинки свиного цепня являются возбудителями:

А. Тениоза
Б. Тениаринхоза
В. Парагонимоза
Г. Цистицеркоза
Д. Гименолепидоза

41. Инвазионная стадия невооруженного цепня для человека:
А. Яйцо
Б. Цистицерк
В. Цистицеркоид
Г. Эхинококк
Д. Плероцеркоид

42. Лабораторная диагностика тениоза:
А. Выявление яиц в перианальной слизи
Б. Проглоттид в фекалиях
В. Серологическое исследование Q
Г. Исследования крови
Д. Биопсия мышц

43. Профилактика тениаринхоза:
А. Ветеринарная экспертиза свинины
Б. Кипячение воды
В. Соблюдение правил личной гигиены
Г. Употребление хорошо прожаренной рыбы
Д. Не употреблять сырую и полусырую говядину

44. При исследовании фекалий больного выявлены членики гельминта белого цвета размером около 2,0 В 0,7 см , матка имеет большое число ответвлений (20-34). О каком гельминте идет речь:
А. Фасциоле
Б. Описторхе
В. Бычьем цепне
Г. Свином цепне
Д. Карликовом цепне

45. При микроскопии фекалий больного обнаружены членики цепня длиной 1-2 см ; матка в членике образует 7-12 боковых ответвлений. Членики какого цепня были обнаружены:
А. Вооруженного
Б. Невооруженного
В. Карликового
Г. Эхинококка
Д. Альвсококка

46. Заражение человека тениозом происходит при:

А. Разделке туш животных
Б. Употреблении зараженной говядины
В. Контакте с больными
Г. Контакте с собаками
Д. Употреблении зараженной свинины

47. При дегельминтизации больного выделился гельминт длиной до 2 м , белого цвета, с членистым телом, длина члеников превышает ширину. Обнаружена маленькая головка с 4 присосками и венчиком крючьев. Определите вид гельминта:

А. Бычий цепень
Б. Фасциола
В. Свиной цепень
Г. Эхинококк
Д. Карликовый цепень

48. Больной доставил в лабораторию несколько члеников гельминта, которые обнаружил утром на постельном белье. Какой гельминтоз можно предположить:

А. Описторхоз
Б. Фасциолез
В. Тениоз
Г. Тениаринхоз
Д. Гименолепидоз

49. Цистицеркоз человека может возникнуть в результате паразитирования:

А. Эхинококка
Б. Карликового цепня
В. Свиного цепня
Г. Бычьего цепня
Д. Фасциолы

50. При употреблении человеком свинины не прошедшей ветеринарного контроля можно заразиться:

А. Тениаринхозом
Б. Эхинококкозом
В. Тениозом
Г. Фасциолезом
Д. Описторхозом

51. Осложнением тениоза является:

А. Разрушение ткани легких
Б. Злокачественная анемия
В. Цистицеркоз
Г. Желтуха

Д. Абсцесс печени

52. Человек заражается тениаринхозом при:
А. Контакте с кошкой
Б. Употреблении раков, крабов
В. Контакте с собакой
Г. Употреблении зараженной свинины
Д. Употреблении зараженной говядины

53. Инвазионная стадия цепня вооруженною для человека:
А. Яйцо
Б. Цистицерк
В. Цистицеркоид
Г. Эхинококк
Д. Плероцеркоид

54. Лабораторная диагностика тениаринхоза:
А. Выявление яиц в моче
Б. Биопсия мыши
В. Выявление проглоттид в фекалиях
Г. Иммунологические реакции
Д. Исследование крови

55. К мерам профилактики тениоза относится:
А. Кипячение воды
Б. Употребление хорошо проваренной рыбы
В. Ветеринарная экспертиза свинины
Г. Ветеринарная экспертиза говядины
Д. Соблюдение правил личной гигиены

56. К профилактике цистицеркоза относится:
А. Ветеринарная экспертиза говядины
Б. Соблюдение правил личной гигиены
В. Ветеринарная экспертиза свинины
Г. Употребление хорошо термически обработанной рыбы
Д. Изолирование больных от здоровых

57. В тонкой кишке человека паразитирует:
А. Фасциола
Б. Описторх
В. Бычий цепень
Г. Легочной сосальщик
Д. Эхинококк